

지역사회획득폐렴

역대 기출문제 | 2025, 2016년 | 총 2문제

2025년 Q36 [김미애] 지역사회획득폐렴

Q36. 36. 52세 남성. 의식 명료. 혈압 115/80? 정상이었습니다

혈액요소질소 18. 치료는?

- 1) 외래에서 cefepime
- 2) 외래에서 amoxicillin
- 3) ~ 5)는 입원 후 항생제를 사용하는 선이었습니다.
- 1) 중증도 평가

CURB-65 - 0~1점: 외래, 2점: 입원치료, 3~5점: ICU

CRB-65 - 0점: 외래, 1~2점: 입원치료, 3~4점: ICU

- 2) 경험적 항생제 사용

외래 및 입원치료: beta-lactam 또는 respiratory fluoroquinolone 단독투여

ICU 치료: beta-lactam + azithromycin/fluoroquinolone 병용

비정형 폐렴이 의심되는 경우: beta-lactam + macrolide 병용

→ 위 문제의 환자는 CURB-65 0점으로 입원을 요하지 않으므로

외래에서 amoxicillin(beta-lactam)이 답이 됩니다.

cf) cefepime: pseudomonas 감염이 의심되는 중증 폐렴에서 주로 사용

정답: 2)

해설

** 지역사회획득폐렴(CAP)의 치료

- 1) 중증도 평가

CURB-65 - 0~1점: 외래, 2점: 입원치료, 3~5점: ICU

CRB-65 - 0점: 외래, 1~2점: 입원치료, 3~4점: ICU

- 2) 경험적 항생제 사용

외래 및 입원치료: beta-lactam 또는 respiratory fluoroquinolone 단독투여

ICU 치료: beta-lactam + azithromycin/fluoroquinolone 병용

비정형 폐렴이 의심되는 경우: beta-lactam + macrolide 병용

→ 위 문제의 환자는 CURB-65 0점으로 입원을 요하지 않으므로

외래에서 amoxicillin(beta-lactam)이 답이 됩니다.

cf) cefepime: pseudomonas 감염이 의심되는 중증 폐렴에서 주로 사용

2016년 Q21 [장정희 교수님] 호흡기계 약물 : 폐렴 항생제

Q21. 약물A는 3개월 이내 동일 계열 항생제 투약 이력이 없는 경우, 지역사회획득폐렴에 단독 요법으로 사용될 수 있으나 중환자의 경우 단독 요법이 선호되지 않는다. 약물A는 비교적 지용성이 높아 염증 유무와 상관없이 폐내 침투가 용이하고 농도-의존적으로 작용하는 특징을 가진다. 다음 설명에 해당하는 약물을 고르시오.

- 1) Amoxicillin
- 2) Imipenem
- 3) Ceftriaxone
- 4) Azithromycin
- 5) Moxifloxacin

정답: 5

해설

지용성이 높아 염증 유무와 상관없이 침투가 용이한 항생제: Fluoroquinolone, New macrolides, Tetracycline, Clindamycin, TMP/SMX. 농도 의존적 항생제: Fluoroquinolone. 지역사회획득폐렴의 치료에 사용하는 항생제: β -lactam $\pm$ macrolide, Respiratory fluoroquinolone. 해당 내용에 모두 만족하는 항생제는 Respiratory fluoroquinolone에 해당하는 Moxifloxacin이다. Azithromycin(④)은 New macrolide로 지용성은 높으나 시간-의존적으로 작용하여 농도-의존적이라는 조건을 만족하지 않는다.