

폐결핵의 치료

역대 기출문제 | 2020년 | 총 1문제

2020년 Q7 [] 결핵 치료 - 틀린 설명 찾기

Q7. 폐결핵의 치료에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- 1) 단독 요법보다 병합 요법을 사용하여 내성 발현을 줄인다.
- 2) 약을 불규칙하게 복용하면 내성균이 출현할 확률이 증가한다.
- 3) 섬유화된 병변에는 rifampin이 가장 효과적이다.
- 4) 치료 도중 임상 증상 및 방사선 소견(흉수 증가 등)이 악화되면 약제 감수성 검사를 다시 시행한다.
- 5) 표준 치료 기간은 최소 6개월 이상 장기간 복용이 필요하다.

정답: 4

해설

결핵 치료 중 임상 증상 및 방사선 소견의 일시적 악화는 역설적 반응(paradoxical reaction)으로 나타날 수 있으며, 이 경우 즉시 약제 감수성 검사를 재시행하는 것이 원칙은 아닙니다. 역설적 반응은 면역 회복 염증 반응(IRIS)의 일종으로, 치료약을 그대로 유지하면서 경과를 관찰하거나 스테로이드를 추가 고려합니다. 약제 감수성 검사 재시행은 치료 실패(2개월 이후에도 도말/배양 양성 지속)나 내성 결핵이 의심될 때 시행합니다. 3번의 섬유화된 병변에는 혈류 공급이 부족하여 어떤 항생제도 효과가 제한적이며, rifampin이 특별히 더 효과적이라는 근거는 없습니다.