

기관지천식 — 진단 및 치료

역대 기출문제 | 2022, 2021, 2019, 2016년 | 총 5문제

2022년 Q43 [김현정 교수님] 천식

Q43. 43. 46세 남자가 2주 전부터 운동을 하면 숨이 찬다며 병원에 왔다. 10년전 천식을 진단받고 현재 단기 작용 베타2작용제를 간헐적으로 흡입 중이라고 한다. 증상은 일주일에 한두번 정도 빨리 움직일 때 나타나고, 수면 장애는 없었다. 혈압 120/70mmHg, 맥박 76회/분, 호흡 17회/분, 체온 36.8°C이다. 가슴 청진에서 호흡음은 정상이다. 치료는?

- 1) 현재 치료 유지
- 2) 흡입 장기작용 항콜린제
- 3) 흡입 장기작용 베타2작용제
- 4) 흡입 저용량 글루코코르티코이드 + 포모테롤 복합제
- 5) 흡입 장기작용 항콜린제 + 장기작용 베타2작용제 복합제

정답: 4

해설

환자가 1주일 1-2회 정도 증상을 보인다. -> 즉, 1달에 두번 이상 증상이 나타난다. 이는 Selecting initial controller의 STEP2에 해당하며 치료로 daily low dose ICS or as-needed low dose ICS-formoterol을 선택해야 한다.

2021년 Q35 [김현정] 천식

Q35. 50세 여자가 2주 전부터 운동 중 숨이 찬다며 병원에 왔다. 5년 전 천식을 진단받고 현재 단기작용 베타2작용제를 간헐적으로 흡입 중이라고 한다. 증상은 1주에 1회 정도 계단을 오르거나 빠르게 걸으면 나타난다. 혈압 120/70 mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.5°C이다. 가슴 청진에서 호흡음은 정상이다. 치료는?

- 1) 흡입 장기작용 항콜린제
- 2) 흡입 장기작용 베타2작용제
- 3) 흡입 장기작용 항콜린제 + 장기작용 베타2작용제 복합제
- 4) 흡입 저용량 글루코코르티코이드 + 포모테롤(formoterol) 복합제
- 5) 항면역글로불린E 항체

정답: 4

해설

천식 환자가 1주에 1회 정도 증상을 보입니다. 즉 한 달에 두 번 이상 증상이 있네요. 이는 STEP 2에 해당되어 치료로는 daily low dose ICS or as-needed low dose ICS-formoterol이 되겠습니다.

이 사진은 무조건 알아야 하는 부분입니다. 어떤 상황에서는 어떤 STEP이 되어 어떤 치료를 하는지 꼭 외우세요.

KMLE 천식 파트에 있는 문제가 글자 토시 하나 안 틀리고 똑같이 나왔습니다.

2021년 Q37 [김현정] 천식

Q37. 45세 남자가 6개월 전부터 숨쉬기가 불편하다며 병원에 왔다. 3년 전부터 자동차수리 공장에서 일하고 있는데, 자동차 도장작업을 한 후에는 숨차는 것이 심해지고 일을 쉴 때는 좋아진다고 한다. 혈압 130/70 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.5℃이다. 가슴 X선사진은 정상이다. 폐기능검사 결과는 다음과 같다. 진단은?

- 1) 폐렴
- 2) 폐색전증
- 3) 직업천식
- 4) 과민성폐장염
- 5) 간질성폐질환

정답: 3

해설

단기작용 베타2작용제 흡입 후 FEV1이 정상치로 올라온 것으로 봐서 천식입니다. 힌트는 자동차수리 공장이에요. 이렇게 쉬운 문제는 거저 먹읍시다.

2019년 Q36 [이혜원 교수님] 기도질환의 병리

Q36. 천식에서 관찰할 수 있는 병리 소견이 아닌 것을 고르시오.

- 1) 기관지의 과도한 확장으로 인해 팽창된 폐의 육안 소견을 보인다.
- 2) 절제된 폐의 기관지 내부에서는 진하고 끈적한 점액 플러그를 관찰할 수도 있다.
- 3) 현미경 소견에서 기관지 상피의 기저막이 매우 얇아진 소견이다.

"Charcot-Leyden crystals"은 호산구 세포막의 단백질 결정성 구조로 천식 환자의 기관지 세포 도

- 4) 말 소견에서 관찰할 수 있다.
- 5) 기관지벽 주변으로 부종과 호산구를 비롯한 여러 염증 세포들이 침윤한 소견이 보인다.

20190617 의학과2 호흡기학

정답: 1

2016년 Q12 [최원일] 천식의 병태생리

Q12. 천식의 중증도에 영향을 미치는 인자는?

- 1) 기도개형(airway remodeling)
- 2) 아토피 유무
- 3) 혈청 IgE level
- 4) 혈액 내 호산구 수
- 5) 부비동염의 중증도

정답: 1

해설

2015 천식 진료지침에 따르면 천식 환자에서 기도염증과 함께 기도의 특징적인 구조적 변화인 기도개형(airway remodeling)이 발생하며, 기도개형은 질환의 중증도와 연관이 있고 비가역적 기도협착을 가져오기도 한다. 아토피, IgE, 호산구, 부비동염은 천식의 위험인자 또는 악화인자이지만 중증도와 직접적으로 연관된 인자는 기도개형이다.