

4. 만성 기관지염을 앓고 있는 59세 남자가 호흡곤란이 심해져서 병원에 왔다. 동맥혈 가스 검사에서 이산화탄소 분압 60 mmHg, 산소 분압 55 mmHg, pH 7.35였다. 산소 공급 후 호흡이 약해지고 의식이 저하되었다. 이 사람에서 가장 중요한 호흡 자극 인자는?

- ① 낮은 pH
- ② 낮은 산소 분압
- ③ 높은 산소 분압
- ④ 낮은 이산화탄소 분압
- ⑤ 높은 이산화탄소 분압

답: ②

8. 폐암으로 입원 중인 65세 여자에서 분당 호흡수가 22회에서 10회로 감소하였다고 병동에서 연락이 왔다. 혈압은 110/70mmHg, 맥박은 78/분, 체온은 36.7°C로 호흡수 감소 이외에는 특이 소견은 없었다. 산소 포화도는 94%로 측정되었다. 의식은 명료하지 못했고 강한 자극에만 반응을 했다. 청진에서는 특이 소견이 없었다. 이 환자에서 필요한 조치는?

- ① 산소를 공급한다.
- ② 뇌 MRI를 촬영한다.
- ③ 투여 약제를 확인한다.
- ④ Aminophylline을 투여한다.
- ⑤ 호흡수의 변화가 있는지 경과를 관찰한다.

답: ③

14. 2세 여아가 쉼 목소리로 킁킁거리는 기침을 하여 밤 11시경 응급실로 왔다. 금일 낮부터 39도의 고열과 함께 목이 아프다고 하였다고 한다. 청진에서 흡기시 협착음이 들렸고 흉부 함몰이 심하였다. 응급실 진료의사가 하여서는 안 되는 처치는?

- ① 항생제를 투여한다.
- ② 스테로이드제를 투여한다.
- ③ 입원하여 경과를 살펴본다.
- ④ 에피네프린 흡입을 시켜준다.
- ⑤ 후두경으로 인후와 후두를 확인한다.

답: ⑤

16. 7세 남아가 발열과 호흡곤란으로 병원에 왔다. 5일전부터 발열과 기침을 보였고, 1일전부터 기침이 심해지면서 가슴 답답함을 호소했다. 심박수 105회/분, 호흡 38회/분, 체온 39.1°C, 경피 산소포화도 95%였다. 호흡시 늑간 함몰이 있었고, 가슴 청진에서 산재된 수포음과 함께 우측 하부에 호흡음이 감소되어 있었다. 가슴 X-선 사진과 (사진 2) 혈액 및 흉

수 검사는 다음과 같았다. 원인은?

혈색소 12.7 g/dL, 백혈구 32,500/mm³ (중성구 92%, 림프구 5%), 혈소판 279,000/mm³
적혈구침강속도 81 mm/시간(참고치, <10)
C-반응단백질 7.1mg/L (참고치, <1.8)
홍맥액 : 혼탁한 양상, 다핵구 2,000 / μ l, 단백 3.5 g, 당 62 mg/dl

- ① 포도알균
- ② 폐렴사슬알균
- ③ 아데노바이러스
- ④ 마이코플라즈마
- ⑤ 호흡기융합세포바이러스



답:①

31. 51세 여자가 3일 전부터 기침할 때 목에서 피가 나와 병원에 왔다. 어려서부터 기침, 가래가 자주 있었고 수년 전부터 기침을 하면 가끔 가래에 피가 묻어 나오기도 하였다. 담배를 피우지 않았고

결핵 병력은 없었다. 혈압 124/82 mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 16회/분, 체온 36.3°C였다. 청진 시 왼쪽 아랫가슴에서 거품소리가 들렸다. 혈액검사 결과와 가슴 X선 사진은 다음과 같았다. 진단은?


혈색소 13.0 g/dL, 백혈구 8,300/mm³ (중성구 63%, 림프구 20%, 호산구 2%),
혈소판 350,000/mm³, C-반응단백질 0.5 mg/L (참고치, <10)



- 1) 폐렴
- 2) 폐암
- 3) 폐색전증
- 4) 기관지확장증
- 5) 특발폐섬유증

답: 4

34. 55세 여자가 한 달 전부터 기침, 가래가 있어 병원에 왔다. 가래는 흰색으로 소량 있었고 간헐적인 미열이 있어 해열제를 복용하였다. 혈압 110/60 mmHg, 맥박 75회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.8°C였다. 청진 시 오른쪽 가슴에서 거품소리가 들렸다. 가슴 X선 사진 및 가슴 컴퓨터단층촬영 사진은 다음과 같다. 검사는?



- 1) 가래 그람염색
- 2) 가래 진균배양
- 3) 가래 세포검사
- 4) 소변 폐렴알균항원검사
- 5) 가래 항산막대균 펠바른표본

답: 5

36. 3세 환자의 경부 연부조직 X-선 소견이다.
가장 관계 깊은 임상 소견은?

1. High fever
2. Chocking
3. Barking cough
4. Wheezing
5. Rale



답: 3

41. 52세 남자가 갑작스런 호흡곤란을 호소하여 본원 응급실로 전원되었다. 3개월전 좌측 대퇴골 골절로 정형외과에 입원하여 total hip replacement 수술을 시행받았다. 수술후 통증으로 인하여 제대로 재활을 하지 못하고 주로 누워 지냈다고 한다. 응급실 도착 당시 혈압은 70/40 mmHg, 맥박 150/분, 호흡수 32/분, 체온 37.1도이었다. 흉부CT 소견은 다음과 같았다(좌측 그림 참조). 응급으로 시행한 심장 초음파 결과는 다음과 같았다(우측 그림 참조). 현재 이 환자에서 가장 우선적으로 고려해야 할 치료방법을 하나만 고르시오.



- ① IVC filter
- ② Rivaroxabn
- ③ Graduated compression stocking
- ④ Catheter embolectomy
- ⑤ Tissue plasminogen activator (tPA)
- ⑥ Low molecular heparin
- ⑦ Pulmonary thromboendarterectomy
- ⑧ Warfarin

답: ⑤

42. 다음 중 폐색전증의 항응고 치료에 관한 내용이다. 맞는 항목을 하나 고르시오.

- ① 헤파린은 저분자량헤파린에 비해 헤파린유발혈소판감소증(HIT) 빈도가 낮다.
- ② 헤파린을 1~2주일간 충분히 사용한 이후 경구용인 와파린으로 교체한다.
- ③ 헤파린 투여량은 INR 2.0~3.0 범위로 조절해야 한다.
- ④ 임신시에도 와파린을 안전하게 투여할 수 있다.
- ⑤ 최근 factor Xa 저해제인 Rivaroxaban이 와파린을 대체하고 있는 중이다.

답: ⑤

48. 천식 병력을 가진 임신 6주의 32세 여자가 심한 호흡곤란으로 응급실에 내원하였다. 평소에 증상이 있을 때에만 ventolin(albuterol) 흡입제를 사용하여 왔으나 전날부터는 잦은 ventolin 사용에도 증상 호전이 없었다. 식은 땀을 흘리며 말을 할 때 한 단어씩 끊어 이야기 할 정도로 심한 호흡곤란이 있고 청진상 호흡음이 감소되어 있었다. 동맥혈 가스분석 상 PaCO_2 43mmHg, PaO_2 55mmg Hg이었다. 이 환자에 산소투여와 ventolin 흡입제 사용 외에 가장 필요한 조치는?

- 1) 흡입용 부신피질 스테로이드 + 지속성 베타2 항진 복합제 흡입
- 2) 정맥용 부신피질 스테로이드 주사
- 3) 류코트리엔 길항제 복용
- 4) 아미노필린 주사
- 5) 항 콜린제 흡입

답 2)