


2015 호흡기학 2차 문제 및 풀이

선배로부터 받은 야마가 100% 복원이 안 된 야마라서 일부 문제밖에 남아있지 않다.

8. 흡연을 장기간 하는 사람에서 흡연 먼지(dusts) 침착을 흔히 볼 수 있는 부위는?

- ① 종말세기관지(terminal bronchioles) 주위 폐실질
- ② 호흡세기관지(respiratory bronchioles) 주위 폐실질
- ③ 기관지 점막세포(bronchial mucosal cells)
- ④ 폐포벽의 Type II 세포
- ⑤ 클라라 세포

문제번호	8	교수님	권건영
해설자	신나일	감수자	
주제	기도질환 병리		
답	1		
해설	1.마이크로 미터 이하의 먼지들은 alveoli까지 도달한다		




11. 폐결핵에 관련된 사항에서 틀린 것은?

- ① Ghon complex는 결핵의 초기에서 볼 수 있는 소견이다.
- ② 괴사를 광범위하게 보이는 육아종성 병변일 때 환자의 면역상태가 좋은 편이다.
- ③ 괴사성 육아종성 병변이 있을 때 진균 감염 가능성을 배제해야 한다.
- ④ 환자의 면역이 저하된 경우 속립성 결핵(miliary tuberculosis) 양상을 보인다.
- ⑤ 결핵 결절이 오래될 경우 섬유성 또는 석회화 결절로 남는다.

문제번호	11	교수님	권건영
해설자	신나일	감수자	
주제	폐결핵의 병리		
답	2		
해설	. 강의록, 수업 내용에서 확인할 수 있다. 1. Ghon complex는 early TB에서 나타난다. 2. 환자의 면역이 약하면 Multiple progressing TB로 진행하여 광범위한 괴사를 보이는 육아종 병변이 관찰된다. 3. 괴사성 육아종이 보이면 확진 이전에 진균 감염 가능성을 배제해야 한다. 4. 환자의 면역이 약하면 Miliary TB로 진행 가능하다. 5. 결핵이 오래되면 Healing case, Fibrocalcific nodule이 보인다.		

13. Chest CT에서 좌하엽 posterior basal segment에 2mm의 작은 ground glass opacity가 관찰되어 추적 관찰 중 2년 경과 후 직경 8mm로 커져(그림 좌측) 폐 췌기절 제술을 시행하였다. 현미경 관찰에서 폐간질 침윤이 없는 소견(그림 우측)을 보였다. 2015 WHO 폐암 분류에 의한 병리진단은?

- ① Atypical adenomatous hyperplasia
- ② Non-mucinous adenocarcinoma in situ
- ③ Mucinous adenocarcinoma in situ
- ④ Minimally invasive adenocarcinoma
- ⑤ Lepidic predominant adenocarcinoma



문제번호	13	교수님	권건영
해설자	신나일	감수자	
주제	폐 종양의 병리		
답	2		
해설	강의록에 Case1의 환자의 사진이다. AIS, non-mucinous type이다.		

22. 70세 남자환자에서 우측 폐하엽에 3cm와 1cm 폐결절이 발견되었고 두 종괴는 흉부 전산화단층 세침흡입검사에서 같은 선암으로 판명되었다. 양전자방출단층촬영에서 림파선전이는 보이지 않았으며 기관지경검사에서도 특이 소견이 없었다. 이 환자의 병기는?

- ① stage Ia
- ② stage Ib
- ③ stage IIa
- ④ stage IIb
- ⑤ stage IIIa

문제번호	22	교수님	박창권? 권건영?
해설자	신나일	감수자	
주제	폐암의 staging		
답	1		
해설	staging 표를 참고하면 된다. 3cm를 넘지 않고 기관지경에서 특이 소견이 없으므로 T1b이고 N0, M0이므로 stage1a이다.		

55세 남자가 건강검진에서 시행한 가슴 X-선 사진 이상소견으로 내원하였다. 이 환자는 30년간 유리공장에서 근무하고 있었다. 이 환자의 가슴 X-선 사진은 다음과 같다. 이 환자에 대한 옳은 설명은?



- ① 석면이 유발물질이다.
- ② 중피종(mesothelioma)과 관련이 깊다.
- ③ 폐결핵 발병과 관련이 있다.
- ④ 직장을 그만두면 병변이 호전된다.
- ⑤ 주로 폐하엽에 병변이 발생한다.

문제번호		교수님	박순호
해설자	신나일	감수자	
주제	직업성 폐질환		
답	3		
해설	환자는 유리공장에서 오래 일했다고 했는데 유리의 성분 중 규소가 규폐증을 일으킬 수 있다. 규폐증은 결핵, 폐암 등과 관련이 있다. 틀린 보기를 정정하면 다음과 같다. 1. 석면이 유발물질인 병은 석면증(Asbestosis)이다. 2. meshtelioma(중피종)와 관련이 깊은 것은 석면증이다. 4. 원인물질 노출이 중단되어도 fibrosis는 진행된다. 5. 폐 상엽에 병변이 발생한다. 주어진 X ray에서도 폐 상엽에서 small round opacities를 볼 수 있다.		

경추 4번 골절로 인한 경수손상 환자의 신경학적 레벨은 C4이고, 손상 정도는 완전손상이다. 이 환자의 근위약이 없을 것으로 예상되는 근육은?

- ① diaphragm
- ② intercostalis
- ③ rectus abdominis
- ④ sternocleidomastoid
- ⑤ transversus abdominis

문제번호		교수님	김두한
해설자	신나일	감수자	
주제	호흡재활		
답	2, 3, 5 ?		
해설	각 근육을 지배하는 신경의 root를 생각하면 된다. C4(high cervical SCI)이 운동에 관여하지 않는 근육은 intercostalis, abdominis이다.		

32. 다음 중에서 rearrangement와 관련이 있는 FISH(fluorescence in situ hybridization)을 이용해서 검출할 수 있는 유전자는?

- ① ALK
- ② EGFR
- ③ K-RAS
- ④ MET
- ⑤ DDR2

문제번호	32	교수님	박순호?
해설자	신나일	감수자	
주제	진단		
답	2		
해설			

33. 다음 중 수면시간 1시간 당 발생한 무호흡, 저호흡, nasal flow의 변화에 따른 뇌파(각성)의 변화 횟수를 모두 합친 것 지표는?

- ① 수면 지수 (sleep index)
- ② 무호흡-저호흡 지수(apnea-hypopnea index)
- ③ 각성 및 수면 지수(arousal and sleep index)
- ④ 호흡장애지수 (respiratory disturbance index)
- ⑤ 호흡 노력 지수(respiratory effort related index)

문제번호	33	교수님	최원일
해설자	신나일	감수자	
주제	Sleep apnea		
답	4		
해설	.강의록에 '수면다원검사에서 수면무호흡과 관련된 지표의 정의'부분을 참고하면 된다. 수면 1시간 당 발생한 무호흡, 저호흡, RERA(호흡노력 관련 각성) 횟수를 합친 지표는 Respiratory disturbance index(RDI)이다.		

36. 다음과 같은 폐종괴가 의심되는 경우 가장 적합한 조직검사 방법은?

- ① Bronchoscopy
- ② Sputum cytology
- ③ Mediastinoscopy
- ④ CT-guided lung biopsy
- ⑤ Endobronchial ultrasound guided needle aspiration

문제번호	36	교수님	박순호?
해설자	신나일	감수자	
주제	폐 종괴의 조직 검사		
답	4		
해설	병변으로 의심되는 부분이 중심에 있으면 Bronchoscopy를 하지만 말초에 있으므로 transthoracic fine needle aspiration이나 VATS 등의 방법으로 생검을 한다. 5번의 EBUS-TBNA는 기관지 중심으로 생검하는 방법이다.		