

호흡기 3

: 광범위사이질폐질환

Diffuse interstitial lung disease

1. 52세 남자가 몇 달 전부터 점점 숨이 차기 시작하여 병원에 왔다. 얼굴은 창백한 편이었으며, 손가락 끝이 ^{만성적인 저산소증} 굵었다. 가슴 방사선에서 양쪽 폐에 불규칙한 선과 작은 결절의 침윤이 보인다. 특별한 직업력이나 원인물질이 될 만한 것을 찾을 수 없었다. 이 질환에 대한 설명으로 맞는 것은? UIP

1) 정상 조직과 섬유화된 조직이 섞여 있는 반상사이질섬유화가 관찰되며, 섬유모세포병터(fibroblastic foci)가 관찰된다.



2) 초기와 후기의 섬유화가 균일한 형태의 섬유화를 보이는 것이 특징이다.

3) 병의 말기가 되면 입방 또는 원주상피세포가 피복한 매우 규칙적인 공간을 구성하게 된다. NSIP

4) 폐의 사이질에 림프구와 형질세포의 침윤이 광범위하게 일어나게 된다. Autoimmune disease에서 나타나는 폐질환

5) 광범위하고 심한 사이질 내 부종과 섬유화가 특징이며, 발열이 잘 동반된다.



UIP 소견








UIP에서는 정상적인
폐와 망가진 폐가
alternative하게
나타난다

heterogeneity:
정상 조직과 fibrosis
조직이 같이 나타난다

spatial:
여러가지 단계의
fibrosis가 같이
나타난다









UIP의 특징적인
소견:

fibroblastic
foci (지금
fibrosis가
일어남)
<->
alveoli sac
안에 foci가 차
면 oragnic
pneumonia,
bronchus 안에
생겨서 막으면
bronchiolitis
obliterans,
둘이 같이
일어나면
BOOP


NSIP



사이사이 염증 세포, 특히 lymphocyte가 많이 들어가 widening이 일어났다
안에서 정상적인 lung tissue는 둘 다 관찰되지 않는다(involve하는 지역이 똑같은
fibrosis를 보인다) <-> UIP와의 차이점
cellular가 예후가 조금 더 좋다(둘다 UIP보다는 좋음)




NSIP, cellular



NSIP, fibrosing

fibrosis type NSIP




Respiratory bronchiolitis (RB)

**Respiratory bronchiolitis - interstitial
lung disease (RB-ILD)**


Desquamative interstitial pneumonia (DIP)




**Smoking related
Interstitial lung
diseases**



RB






RB-ILD



DIP



AIP





AIP
hyaline membrane
acute inflammatory
cells are many

type 1 pneumocyte injury로 erythema가 형성, widening



3. 55세 남자가 기침이 계속되고, 숨이 차는 증상이 있어서 병원에 왔다. 가슴 방사선소견에서 가슴막밑과 기관지 주위 공기강에 반점형 경화가 관찰되었다. 임상소견을 종합하였을때 폐쇄세기관지기질화폐렴 (bronchiolitis obliterans-organizing pneumonia; BOOP)이 의심되었다. 이와 관련된 설명으로 맞는 것은?

1) 비치즈육아종 염증반응이 특징이며 원인을 모르는 전신질환이다. [Sacroidosis](#)

2) 육아조직과 유사한 섬유조직으로 이루어진 폴립모양 마개가 세기관지와 폐포 내강을 채운다.



3) 양쪽 폐를 침범하면서 주로 림프관을 따라 분포하며 거대세포내봉입체인 샤우만체와 성상체가 발견된다. [Sacroidosis](#)

4) 폐포, 폐포벽과 종말세기관지 주위에 림프구, 형질세포, 큰포식세포 침윤이 있고 특징적인 비치즈육아종이 나타난다. [Sacroidosis](#)

5) 폐포벽이 심한 호산구 침윤으로 두꺼워지게 된다. [호산구 폐렴](#)



Cryptogenic organizing pneumonia; COP

하얀게 내강을 채우고 있는 육아조직들





Sarcoidosis


Necrosis는 거의 동반하지 않는다



몽글몽글하게
보이는게
granuloma



Asteroid body





Schaumann body

과민폐렴

매우 드문 질환
bronchus 주변으로
granulomatous
inflammation이 생기는 질환

(hypersensitivity pneumonitis; HP)



과민폐렴

(hypersensitivity pneumonitis; HP)

