

PAE(전립선동맥 색전술) 후 주의사항

MynxGrip(밍스그립)

1. 시술 24시간 이후에 간단한 샤워는 가능하지만 완전히 아물 때까지는 사우나, 목욕, 수영 등은 피해 주세요.
2. 상처 부위에 붙여져 있는 방수드레싱은 일주일간 적용합니다.
3. 시술 부위를 만지지 마세요.
4. 5일 또는 혈관 천자 부위에 딱지가 생길 때까지 깨끗하고 건조한 상태로 유지시켜 주세요.
5. 아물기 전까지는 꼭 끼는 속옷이나 옷은 피해 주세요.
6. 시술 후 통증과 혈뇨, 소변 시 타는 듯 한 열감이 있을 수 있으며 소변과 관련된 증상 (빈뇨, 응급뇨, 야간뇨 등)이 시술 전보다 심해질 수가 있습니다. 이는 전립선동맥 색전술에 의해 생기는 허혈성 염증에 의한 증상으로 정상적인 치료 과정입니다. 이러한 증상은 시술 후 1~2주부터 서서히 완화될 것입니다.
7. 퇴원약은 처방된 일주일간 드시면 됩니다.
8. 일상생활

당일 퇴원

- 운전하지 마세요.

일주일 동안 제한되는 운동

- 3kg 이상의 무거운 물건을 들지 마세요.
- 격렬한 운동은 하지 마세요. (등산, 헬스 등)
- 계단은 이용하지 마세요.
- 기침, 재채기를 하실 때는 손바닥으로 시술 부위를 누르면서 해주세요.

9. 시술 후 3개월, 12개월 간격으로 MR 촬영 예정이십니다.
10. 치료 경과에 대해서 문제가 있거나 걱정되는 점이 있으시면 **1833-2088** 로 전화 주시면 조치해드리겠습니다.

MynxGrip(밍스그립)이란 무엇인가?

MynxGrip은 부드러운 스폰지 같은 물질을 사용하여 시술 후 즉시 혈관 구멍을 막고 혈관 주위의 혈액을 빠르게 흡수하여 혈관의 천자 부위를 지혈합니다. 또한 MynxGrip은 30일 이내에 몸에 완전히 흡수되어 체내에 아무것도 남기지 않고 사라집니다.

