

Ayudantía 9 MAT033

Eduardo Rubio Marín

Correo: eduardo.rubiom@sansano.usm.cl

Julio, 2021

Pregunta 1

Sea X una variable aleatoria, con función generadora de momentos:

$$\varphi_x(t) = \frac{1}{2}e^{-t} + \frac{1}{2}$$

Sean X_1, X_2, \dots, X_n variables aleatorias independientes distribuidas de igual forma que X , encuentre $E(\bar{X})$ y $V(\bar{X})$.

Solución:

Solución:

$$\text{Sea } \bar{X} = \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n},$$

Solución:

Sea $\overline{X} = \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n}$, entonces se tiene:

Solución:

Sea $\bar{X} = \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n}$, entonces se tiene:

$$\varphi_{\bar{X}}(t) =$$

Solución:

Sea $\bar{X} = \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n}$, entonces se tiene:

$$\varphi_{\bar{X}}(t) = E(e^{\bar{X}t}) =$$

Solución:

Sea $\bar{X} = \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n}$, entonces se tiene:

$$\varphi_{\bar{X}}(t) = E(e^{\bar{X}t}) = E\left(e^{\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n} t}\right) =$$

Solución:

Sea $\bar{X} = \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n}$, entonces se tiene:

$$\varphi_{\bar{X}}(t) = E(e^{\bar{X}t}) = E(e^{\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n} t}) = E(\prod_{i=1}^n e^{\frac{x_i}{n} t}) =$$

Solución:

Sea $\bar{X} = \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n}$, entonces se tiene:

$$\varphi_{\bar{X}}(t) = E(e^{\bar{X}t}) = E(e^{\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n} t}) = E(\prod_{i=1}^n e^{\frac{x_i}{n} t}) = \prod_{i=1}^n (\frac{1}{2} e^{\frac{-t}{n}} + \frac{1}{2}) =$$

Solución:

Sea $\bar{X} = \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n}$, entonces se tiene:

$$\begin{aligned}\varphi_{\bar{X}}(t) &= E(e^{\bar{X}t}) = E\left(e^{\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n} t}\right) = E\left(\prod_{i=1}^n e^{\frac{x_i}{n} t}\right) = \prod_{i=1}^n \left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} + \frac{1}{2}\right) = \\ &= \left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} + \frac{1}{2}\right)^n\end{aligned}$$

Solución:

Sea $\bar{X} = \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n}$, entonces se tiene:

$$\begin{aligned}\varphi_{\bar{X}}(t) &= E(e^{\bar{X}t}) = E\left(e^{\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n} t}\right) = E\left(\prod_{i=1}^n e^{\frac{x_i}{n} t}\right) = \prod_{i=1}^n \left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} + \frac{1}{2}\right) = \\ &= \left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} + \frac{1}{2}\right)^n \\ E(\bar{X}) &= \end{aligned}$$

Solución:

Sea $\bar{X} = \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n}$, entonces se tiene:

$$\begin{aligned}\varphi_{\bar{X}}(t) &= E(e^{\bar{X}t}) = E\left(e^{\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n} t}\right) = E\left(\prod_{i=1}^n e^{\frac{x_i}{n} t}\right) = \prod_{i=1}^n \left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} + \frac{1}{2}\right) = \\ &= \left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} + \frac{1}{2}\right)^n \\ E(\bar{X}) &= \varphi'_{\bar{X}}(t)|_{t=0} =\end{aligned}$$

Solución:

Sea $\bar{X} = \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n}$, entonces se tiene:

$$\begin{aligned}\varphi_{\bar{X}}(t) &= E(e^{\bar{X}t}) = E\left(e^{\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n} t}\right) = E\left(\prod_{i=1}^n e^{\frac{x_i}{n} t}\right) = \prod_{i=1}^n \left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} + \frac{1}{2}\right) = \\ &= \left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} + \frac{1}{2}\right)^n \\ E(\bar{X}) &= \varphi'_{\bar{X}}(t)|_{t=0} = n\left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} + \frac{1}{2}\right)^{n-1} \cdot \left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} \left(\frac{-1}{n}\right)\right)|_{t=0} =\end{aligned}$$

Solución:

Sea $\bar{X} = \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n}$, entonces se tiene:

$$\varphi_{\bar{X}}(t) = E(e^{\bar{X}t}) = E\left(e^{\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n} t}\right) = E\left(\prod_{i=1}^n e^{\frac{x_i}{n} t}\right) = \prod_{i=1}^n \left(\frac{1}{2} e^{\frac{-t}{n}} + \frac{1}{2}\right) =$$

$$\left(\frac{1}{2} e^{\frac{-t}{n}} + \frac{1}{2}\right)^n$$

$$E(\bar{X}) = \varphi'_{\bar{X}}(t)|_{t=0} = n\left(\frac{1}{2} e^{\frac{-t}{n}} + \frac{1}{2}\right)^{n-1} \cdot \left(\frac{1}{2} e^{\frac{-t}{n}} \left(\frac{-1}{n}\right)\right)|_{t=0} =$$

$$n(1)^{n-1} \cdot \left(\frac{-1}{2n}\right) =$$

Solución:

Sea $\bar{X} = \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n}$, entonces se tiene:

$$\varphi_{\bar{X}}(t) = E(e^{\bar{X}t}) = E\left(e^{\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n} t}\right) = E\left(\prod_{i=1}^n e^{\frac{x_i}{n} t}\right) = \prod_{i=1}^n \left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} + \frac{1}{2}\right) =$$

$$\left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} + \frac{1}{2}\right)^n$$

$$E(\bar{X}) = \varphi'_{\bar{X}}(t)|_{t=0} = n\left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} + \frac{1}{2}\right)^{n-1} \cdot \left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} \left(\frac{-1}{n}\right)\right)|_{t=0} =$$

$$n(1)^{n-1} \cdot \left(\frac{-1}{2n}\right) = -\frac{1}{2}$$

Solución:

Sea $\bar{X} = \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n}$, entonces se tiene:

$$\varphi_{\bar{X}}(t) = E(e^{\bar{X}t}) = E\left(e^{\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n} t}\right) = E\left(\prod_{i=1}^n e^{\frac{x_i}{n} t}\right) = \prod_{i=1}^n \left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} + \frac{1}{2}\right) =$$

$$\left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} + \frac{1}{2}\right)^n$$

$$E(\bar{X}) = \varphi'_{\bar{X}}(t)|_{t=0} = n\left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} + \frac{1}{2}\right)^{n-1} \cdot \left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} \left(\frac{-1}{n}\right)\right)|_{t=0} =$$

$$n(1)^{n-1} \cdot \left(\frac{-1}{2n}\right) = -\frac{1}{2}$$

$$E(\bar{X}^2) =$$

Solución:

Sea $\bar{X} = \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n}$, entonces se tiene:

$$\varphi_{\bar{X}}(t) = E(e^{\bar{X}t}) = E\left(e^{\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n} t}\right) = E\left(\prod_{i=1}^n e^{\frac{x_i}{n} t}\right) = \prod_{i=1}^n \left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} + \frac{1}{2}\right) =$$

$$\left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} + \frac{1}{2}\right)^n$$

$$E(\bar{X}) = \varphi'_{\bar{X}}(t)|_{t=0} = n\left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} + \frac{1}{2}\right)^{n-1} \cdot \left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} \left(\frac{-1}{n}\right)\right)|_{t=0} =$$

$$n(1)^{n-1} \cdot \left(\frac{-1}{2n}\right) = -\frac{1}{2}$$

$$E(\bar{X}^2) = \varphi''_{\bar{X}}(t)|_{t=0} =$$

Solución:

Sea $\bar{X} = \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n}$, entonces se tiene:

$$\varphi_{\bar{X}}(t) = E(e^{\bar{X}t}) = E\left(e^{\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n} t}\right) = E\left(\prod_{i=1}^n e^{\frac{x_i}{n} t}\right) = \prod_{i=1}^n \left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} + \frac{1}{2}\right) =$$

$$\left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} + \frac{1}{2}\right)^n$$

$$E(\bar{X}) = \varphi'_{\bar{X}}(t)|_{t=0} = n\left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} + \frac{1}{2}\right)^{n-1} \cdot \left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} \left(\frac{-1}{n}\right)\right)|_{t=0} =$$

$$n(1)^{n-1} \cdot \left(\frac{-1}{2n}\right) = -\frac{1}{2}$$

$$E(\bar{X}^2) = \varphi''_{\bar{X}}(t)|_{t=0} = n(n-1)\left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} + \frac{1}{2}\right)^{n-2} \cdot \left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} \left(\frac{-1}{n}\right)\right)^2|_{t=0} +$$

$$n\left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} + \frac{1}{2}\right)^{n-1} \cdot \left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} \left(\frac{-1}{n^2}\right)\right)|_{t=0} = n(n-1)\left(\frac{1}{4n^2}\right) + n\left(\frac{1}{2n^2}\right) =$$

Solución:

Sea $\bar{X} = \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n}$, entonces se tiene:

$$\varphi_{\bar{X}}(t) = E(e^{\bar{X}t}) = E\left(e^{\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n} t}\right) = E\left(\prod_{i=1}^n e^{\frac{x_i}{n} t}\right) = \prod_{i=1}^n \left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} + \frac{1}{2}\right) =$$

$$\left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} + \frac{1}{2}\right)^n$$

$$E(\bar{X}) = \varphi'_{\bar{X}}(t)|_{t=0} = n\left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} + \frac{1}{2}\right)^{n-1} \cdot \left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} \left(\frac{-1}{n}\right)\right)|_{t=0} =$$

$$n(1)^{n-1} \cdot \left(\frac{-1}{2n}\right) = -\frac{1}{2}$$

$$E(\bar{X}^2) = \varphi''_{\bar{X}}(t)|_{t=0} = n(n-1)\left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} + \frac{1}{2}\right)^{n-2} \cdot \left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} \left(\frac{-1}{n}\right)\right)^2|_{t=0} +$$

$$n\left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} + \frac{1}{2}\right)^{n-1} \cdot \left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} \left(\frac{-1}{n^2}\right)\right)|_{t=0} = n(n-1)\left(\frac{1}{4n^2}\right) + n\left(\frac{1}{2n^2}\right) =$$

$$\frac{n^2 - n + 2n}{4n^2} = \frac{n+1}{4n}$$

Solución:

Sea $\bar{X} = \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n}$, entonces se tiene:

$$\varphi_{\bar{X}}(t) = E(e^{\bar{X}t}) = E\left(e^{\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n} t}\right) = E\left(\prod_{i=1}^n e^{\frac{x_i}{n} t}\right) = \prod_{i=1}^n \left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} + \frac{1}{2}\right) =$$

$$\left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} + \frac{1}{2}\right)^n$$

$$E(\bar{X}) = \varphi'_{\bar{X}}(t)|_{t=0} = n\left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} + \frac{1}{2}\right)^{n-1} \cdot \left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} \left(\frac{-1}{n}\right)\right)|_{t=0} =$$

$$n(1)^{n-1} \cdot \left(\frac{-1}{2n}\right) = -\frac{1}{2}$$

$$E(\bar{X}^2) = \varphi''_{\bar{X}}(t)|_{t=0} = n(n-1)\left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} + \frac{1}{2}\right)^{n-2} \cdot \left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} \left(\frac{-1}{n}\right)\right)^2|_{t=0} +$$

$$n\left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} + \frac{1}{2}\right)^{n-1} \cdot \left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} \left(\frac{-1}{n^2}\right)\right)|_{t=0} = n(n-1)\left(\frac{1}{4n^2}\right) + n\left(\frac{1}{2n^2}\right) =$$

$$\frac{n^2 - n + 2n}{4n^2} = \frac{n+1}{4n}$$

$$V(\bar{X}) =$$

Solución:

Sea $\bar{X} = \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n}$, entonces se tiene:

$$\varphi_{\bar{X}}(t) = E(e^{\bar{X}t}) = E\left(e^{\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n} t}\right) = E\left(\prod_{i=1}^n e^{\frac{x_i}{n} t}\right) = \prod_{i=1}^n \left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} + \frac{1}{2}\right) =$$

$$\left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} + \frac{1}{2}\right)^n$$

$$E(\bar{X}) = \varphi'_{\bar{X}}(t)|_{t=0} = n\left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} + \frac{1}{2}\right)^{n-1} \cdot \left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} \left(\frac{-1}{n}\right)\right)|_{t=0} =$$

$$n(1)^{n-1} \cdot \left(\frac{-1}{2n}\right) = -\frac{1}{2}$$

$$E(\bar{X}^2) = \varphi''_{\bar{X}}(t)|_{t=0} = n(n-1)\left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} + \frac{1}{2}\right)^{n-2} \cdot \left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} \left(\frac{-1}{n}\right)\right)^2|_{t=0} +$$

$$n\left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} + \frac{1}{2}\right)^{n-1} \cdot \left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} \left(\frac{-1}{n^2}\right)\right)|_{t=0} = n(n-1)\left(\frac{1}{4n^2}\right) + n\left(\frac{1}{2n^2}\right) =$$

$$\frac{n^2 - n + 2n}{4n^2} = \frac{n+1}{4n}$$

$$V(\bar{X}) = E(\bar{X}^2) - E(\bar{X})^2 =$$

Solución:

Sea $\bar{X} = \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n}$, entonces se tiene:

$$\varphi_{\bar{X}}(t) = E(e^{\bar{X}t}) = E\left(e^{\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n}t}\right) = E\left(\prod_{i=1}^n e^{\frac{x_i}{n}t}\right) = \prod_{i=1}^n \left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} + \frac{1}{2}\right) =$$

$$\left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} + \frac{1}{2}\right)^n$$

$$E(\bar{X}) = \varphi'_{\bar{X}}(t)|_{t=0} = n\left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} + \frac{1}{2}\right)^{n-1} \cdot \left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}}\left(\frac{-1}{n}\right)\right)|_{t=0} =$$

$$n(1)^{n-1} \cdot \left(\frac{-1}{2n}\right) = -\frac{1}{2}$$

$$E(\bar{X}^2) = \varphi''_{\bar{X}}(t)|_{t=0} = n(n-1)\left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} + \frac{1}{2}\right)^{n-2} \cdot \left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}}\left(\frac{-1}{n}\right)\right)^2|_{t=0} +$$

$$n\left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} + \frac{1}{2}\right)^{n-1} \cdot \left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}}\left(\frac{-1}{n^2}\right)\right)|_{t=0} = n(n-1)\left(\frac{1}{4n^2}\right) + n\left(\frac{1}{2n^2}\right) =$$

$$\frac{n^2 - n + 2n}{4n^2} = \frac{n+1}{4n}$$

$$V(\bar{X}) = E(\bar{X}^2) - E(\bar{X})^2 = \frac{n+1}{4n} - \frac{1}{4} =$$

Solución:

Sea $\bar{X} = \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n}$, entonces se tiene:

$$\varphi_{\bar{X}}(t) = E(e^{\bar{X}t}) = E\left(e^{\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n} t}\right) = E\left(\prod_{i=1}^n e^{\frac{x_i}{n} t}\right) = \prod_{i=1}^n \left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} + \frac{1}{2}\right) =$$

$$\left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} + \frac{1}{2}\right)^n$$

$$E(\bar{X}) = \varphi'_{\bar{X}}(t)|_{t=0} = n\left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} + \frac{1}{2}\right)^{n-1} \cdot \left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} \left(\frac{-1}{n}\right)\right)|_{t=0} =$$

$$n(1)^{n-1} \cdot \left(\frac{-1}{2n}\right) = -\frac{1}{2}$$

$$E(\bar{X}^2) = \varphi''_{\bar{X}}(t)|_{t=0} = n(n-1)\left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} + \frac{1}{2}\right)^{n-2} \cdot \left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} \left(\frac{-1}{n}\right)\right)^2|_{t=0} +$$

$$n\left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} + \frac{1}{2}\right)^{n-1} \cdot \left(\frac{1}{2}e^{\frac{-t}{n}} \left(\frac{-1}{n^2}\right)\right)|_{t=0} = n(n-1)\left(\frac{1}{4n^2}\right) + n\left(\frac{1}{2n^2}\right) =$$

$$\frac{n^2 - n + 2n}{4n^2} = \frac{n+1}{4n}$$

$$V(\bar{X}) = E(\bar{X}^2) - E(\bar{X})^2 = \frac{n+1}{4n} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4n}$$

Pregunta 2

Sean X_1, X_2, \dots, X_n una m.a. de tamaño n , de una población con la siguiente función de densidad:

$$f_{X_i}(x_i) = \begin{cases} \frac{1}{x_i \sigma \sqrt{2\pi}} e^{\frac{-1(\ln(x_i) - \mu)^2}{2\sigma^2}} & x_i > 0; i = 1, \dots, n \\ 0 & e.o.c. \end{cases}$$

- a Encuentre el EMV de μ , con σ^2 conocido.
- b Si $n = 3$ y $X_1 = e$, $X_2 = e^2$ y $X_3 = e^3$. Evalúe el μ_{EMV} encontrado en a.

Solución:

Solución:

a Tenemos que:

$$f_{X_i}(x_i) = \frac{1}{x_i \sigma \sqrt{2\pi}} e^{\frac{-1(\ln(x_i) - \mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Solución:

a Tenemos que:

$$f_{X_i}(x_i) = \frac{1}{x_i \sigma \sqrt{2\pi}} e^{\frac{-1(\ln(x_i) - \mu)^2}{2\sigma^2}}$$
$$L = \prod_{i=1}^n \frac{1}{x_i \sigma \sqrt{2\pi}} \text{EXP} \left\{ -\frac{1}{2} \left(\frac{\ln(x_i) - \mu}{\sigma} \right)^2 \right\}$$

Solución:

a Tenemos que:

$$\begin{aligned}f_{X_i}(x_i) &= \frac{1}{x_i \sigma \sqrt{2\pi}} e^{\frac{-1(\ln(x_i) - \mu)^2}{2\sigma^2}} \\L &= \prod_{i=1}^n \frac{1}{x_i \sigma \sqrt{2\pi}} \text{EXP} \left\{ -\frac{1}{2} \left(\frac{\ln(x_i) - \mu}{\sigma} \right)^2 \right\} \\&= \left(\frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \right)^n \frac{1}{\prod_{i=1}^n x_i} \text{EXP} \left\{ -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \left(\frac{\ln(x_i) - \mu}{\sigma} \right)^2 \right\}\end{aligned}$$

Si aplicamos logaritmo natural a L obtendremos la función de log-verosimilitud.

Si aplicamos logaritmo natural a L obtendremos la función de log-verosimilitud.

$$\ln(L) = -n \ln(\sigma \sqrt{2\pi}) - \ln\left(\prod_{i=1}^n x_i\right) - \left(-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \left(\frac{\ln(x_i) - \mu}{\sigma}\right)^2\right)$$

Si aplicamos logaritmo natural a L obtendremos la función de log-verosimilitud.

$$\begin{aligned}\ln(L) &= -n \ln(\sigma \sqrt{2\pi}) - \ln\left(\prod_{i=1}^n x_i\right) - \left(-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \left(\frac{\ln(x_i) - \mu}{\sigma}\right)^2\right) \\ \Rightarrow \frac{\partial \ln L}{\partial \mu} &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{\ln(x_i) - \mu}{\sigma}\right)\end{aligned}$$

Como buscamos la EMV se debe cumplir;

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \mu} = 0$$

Como buscamos la EMV se debe cumplir;

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \mu} = 0$$
$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{\ln(x_i) - \mu}{\sigma} \right) = 0$$

Como buscamos la EMV se debe cumplir;

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \mu} = 0$$

$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{\ln(x_i) - \mu}{\sigma} \right) = 0$$

$$\sum_{i=1}^n (\ln(x_i) - \mu) = 0$$

Como buscamos la EMV se debe cumplir;

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \mu} = 0$$

$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{\ln(x_i) - \mu}{\sigma} \right) = 0$$

$$\sum_{i=1}^n (\ln(x_i) - \mu) = 0$$

$$\Rightarrow \hat{\mu} = \frac{\sum_{i=1}^n \ln x_i}{n}$$

- b Sabemos que $X_1 = e$, $X_2 = e^2$ y $X_3 = e^3$.
Por lo que se tendrá que $\ln X_1 = 1$, $\ln X_2 = 2$ y $\ln X_3 = 3$.

- Sabemos que $X_1 = e$, $X_2 = e^2$ y $X_3 = e^3$.
Por lo que se tendrá que $\ln X_1 = 1$, $\ln X_2 = 2$ y $\ln X_3 = 3$.

$$\hat{\mu} = \sum_{i=1}^3 \frac{\ln x_i}{3}$$

- Sabemos que $X_1 = e$, $X_2 = e^2$ y $X_3 = e^3$.
Por lo que se tendrá que $\ln X_1 = 1$, $\ln X_2 = 2$ y $\ln X_3 = 3$.

$$\begin{aligned}\hat{\mu} &= \sum_{i=1}^3 \frac{\ln x_i}{3} \\ &= \frac{1 + 2 + 3}{3}\end{aligned}$$

- Sabemos que $X_1 = e$, $X_2 = e^2$ y $X_3 = e^3$.
Por lo que se tendrá que $\ln X_1 = 1$, $\ln X_2 = 2$ y $\ln X_3 = 3$.

$$\begin{aligned}\hat{\mu} &= \sum_{i=1}^3 \frac{\ln x_i}{3} \\ &= \frac{1 + 2 + 3}{3} \\ &= 2\end{aligned}$$

Pregunta 3

Sea X_1, X_2 una muestra aleatoria de tamaño 2 de X con media μ y varianza σ^2 . Si disponemos de dos estimadores para $\hat{\mu}_1 = \frac{X_1 + X_2}{2}$ y $\hat{\mu}_2 = \frac{X_1 + 2X_2}{3}$. Cual de los dos estimadores es el mejor?.

Solución:

Solución: Para definir cual estimador es mejor, debemos partir calculando el sesgo de los 2 estimadores.

$$E[\hat{\mu}_1] = E\left[\frac{X_1 + X_2}{2}\right]$$

Solución: Para definir cual estimador es mejor, debemos partir calculando el sesgo de los 2 estimadores.

$$\begin{aligned} E[\hat{\mu}_1] &= E\left[\frac{X_1 + X_2}{2}\right] \\ &= \frac{1}{2}(\mu + \mu) = \mu \end{aligned}$$

Solución: Para definir cual estimador es mejor, debemos partir calculando el sesgo de los 2 estimadores.

$$\begin{aligned}E[\hat{\mu}_1] &= E\left[\frac{X_1 + X_2}{2}\right] \\&= \frac{1}{2}(\mu + \mu) = \mu \\E[\hat{\mu}_2] &= E\left[\frac{X_1 + 2X_2}{2}\right]\end{aligned}$$

Solución: Para definir cual estimador es mejor, debemos partir calculando el sesgo de los 2 estimadores.

$$\begin{aligned}E[\hat{\mu}_1] &= E\left[\frac{X_1 + X_2}{2}\right] \\&= \frac{1}{2}(\mu + \mu) = \mu \\E[\hat{\mu}_2] &= E\left[\frac{X_1 + 2X_2}{2}\right] \\&= \frac{1}{3}(\mu + 2\mu) = \mu\end{aligned}$$

Solución: Para definir cual estimador es mejor, debemos partir calculando el sesgo de los 2 estimadores.

$$\begin{aligned}E[\hat{\mu}_1] &= E\left[\frac{X_1 + X_2}{2}\right] \\&= \frac{1}{2}(\mu + \mu) = \mu \\E[\hat{\mu}_2] &= E\left[\frac{X_1 + 2X_2}{2}\right] \\&= \frac{1}{3}(\mu + 2\mu) = \mu\end{aligned}$$

Obteniendo así que ambos estimadores son insesgados, por lo cual resta estudiar la variabilidad de estos.

Ahora calculando la varianza de los estimadores obtenemos.

Ahora calculando la varianza de los estimadores obtenemos.

$$V[\hat{\mu}_1] = V\left[\frac{X_1 + X_2}{2}\right]$$

Ahora calculando la varianza de los estimadores obtenemos.

$$\begin{aligned} V[\hat{\mu}_1] &= V\left[\frac{X_1 + X_2}{2}\right] \\ &= \frac{1}{4}(\Sigma^2 + \sigma^2) = \frac{1}{2}\sigma^2 \end{aligned}$$

Ahora calculando la varianza de los estimadores obtenemos.

$$\begin{aligned}V[\hat{\mu}_1] &= V\left[\frac{X_1 + X_2}{2}\right] \\&= \frac{1}{4}(\Sigma^2 + \sigma^2) = \frac{1}{2}\sigma^2 \\V[\hat{\mu}_2] &= V\left[\frac{X_1 + 2X_2}{2}\right]\end{aligned}$$

Ahora calculando la varianza de los estimadores obtenemos.

$$\begin{aligned}V[\hat{\mu}_1] &= V\left[\frac{X_1 + X_2}{2}\right] \\&= \frac{1}{4}(\Sigma^2 + \sigma^2) = \frac{1}{2}\sigma^2 \\V[\hat{\mu}_2] &= V\left[\frac{X_1 + 2X_2}{2}\right] \\&= \frac{1}{9}(\Sigma^2 + 4\sigma^2) = \frac{5}{9}\sigma^2\end{aligned}$$

Ahora calculando la varianza de los estimadores obtenemos.

$$\begin{aligned}V[\hat{\mu}_1] &= V\left[\frac{X_1 + X_2}{2}\right] \\&= \frac{1}{4}(\Sigma^2 + \sigma^2) = \frac{1}{2}\sigma^2 \\V[\hat{\mu}_2] &= V\left[\frac{X_1 + 2X_2}{2}\right] \\&= \frac{1}{9}(\Sigma^2 + 4\sigma^2) = \frac{5}{9}\sigma^2\end{aligned}$$

Debido a que $\hat{\mu}_1$ posee una menor varianza y de acuerdo al criterio de eficiencia, $\hat{\mu}_1$ es preferido a $\hat{\mu}_2$.