

(a)
North & Central America
$R \leq 50$ km, $n = 61$
$\beta = 0.51$ [0.23, 0.80]
Pearson $r = 0.44$ ($p = 4.1e-04$)
Spearman $\rho_s = 0.39$, $n = 61$ sinks
(b)
South America
$R \leq 50$ km, $n = 3$
Matched coastal sinks: $n = 3$
(insufficient for regression, $n < 5$)
(c)
Europe (to the Urals)
$R \leq 50$ km, $n = 10$
$\beta = 0.33$ [−0.11, 0.92]
Pearson $r = 0.36$ ($p = 3.1e-01$)
Spearman $\rho_s = 0.45$, $n = 10$ sinks
(d)
Africa & Madagascar
$R \leq 50$ km, $n = 12$
$\beta = 0.24$ [−0.79, 1.73]
Pearson $r = 0.15$ ($p = 6.5e-01$)
Spearman $\rho_s = 0.13$, $n = 12$ sinks
(e)
Asia
$R \leq 50$ km, $n = 20$
$\beta = 0.40$ [−0.01, 0.77]
Pearson $r = 0.32$ ($p = 1.7e-01$)
Spearman $\rho_s = 0.31$, $n = 20$ sinks
(f)
Australia & Oceania
$R \leq 50$ km, $n = 2$
Matched coastal sinks: $n = 2$
(insufficient for regression, $n < 5$)
Normalized Load $\widetilde{(M \times A)/M \times A}$
Basin area A (km^2)
Basin Population P (inhabitants)