

06. Empfehlung

1. Первый блок (список)

Nach der Injektion von Fillern in die Lippen gibt es einige wichtige Dinge, die Sie vermeiden sollten, um Komplikationen zu verhindern und das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Hier sind die wichtigsten Verbote:

1. Lippen nicht berühren oder massieren – In den ersten 24–48 Stunden sollten Sie Ihre Lippen nicht reiben, massieren oder versuchen, Unregelmäßigkeiten zu „glätten“, da dies zu einer ungleichmäßigen Verteilung des Fillers führen kann.
2. Keinen Alkohol trinken – Alkohol erweitert die Blutgefäße und kann Schwellungen und Blutergüsse verstärken. Verzichten Sie mindestens 48 Stunden darauf.
3. Nicht rauchen – Rauchen verlangsamt die Heilung und kann die Verteilung des Fillers negativ beeinflussen.
4. Kein Trinken mit einem Strohhalm und keine übermäßige Mimik – Diese Bewegungen können den Filler verschieben und zur Bildung von Knoten führen.
5. Keine Sauna, kein Dampfbad, kein Solarium und keine heißen Bäder – Hohe Temperaturen fördern die Durchblutung und können Schwellungen verstärken oder den Filler schneller abbauen.
6. Kein intensiver Sport – Körperliche Anstrengung erhöht die Durchblutung und kann Schwellungen und Blutergüsse verstärken. Verzichten Sie für 2–3 Tage auf Sport.
7. Keine blutverdünnenden Medikamente ohne ärztliche Anweisung – Aspirin, Ibuprofen und andere NSAR können Blutungen und Blutergüsse verstärken.
8. Keine dekorative Kosmetik verwenden – In den ersten 12–24 Stunden sollten Sie auf Lippenstift, Lipgloss oder Lippenbalsam verzichten, um Infektionen zu vermeiden.
9. Keine kosmetischen Behandlungen oder Gesichtsmassagen durchführen lassen – Vermeiden Sie für mindestens zwei Wochen weitere Injektionen, Laserbehandlungen, Peelings und apparative Verfahren im Lippenbereich.
10. Nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen – UV-Strahlung kann Schwellungen verstärken und Entzündungen verursachen. Verwenden Sie einen Lippenbalsam mit SPF.

Was man nach einer Botulinumtoxin-Behandlung nicht tun sollte: Klare Zeitvorgaben

Die ersten 6 Stunden:

- Nicht hinlegen und den Kopf nicht nach unten neigen (z. B. keine Schuhe binden, nicht mit gesenktem Kopf waschen).
- Die behandelten Bereiche nicht berühren oder massieren (um eine ungewollte Verlagerung des Botulinumtoxins zu vermeiden).
- Aktiv die Mimik nutzen (z. B. Stirn runzeln, Augenbrauen heben), damit sich das Präparat besser in den Muskeln verteilt.

Die ersten 24 Stunden:

- Keinen Alkohol trinken (dies erweitert die Blutgefäße und kann die Wirkung des Botulinumtoxins verringern).
- Keinen Sport oder körperliche Anstrengung ausüben (erhöhte Durchblutung kann den Abbau des Präparats beschleunigen).
- Keine heißen Bäder nehmen, keine Sauna oder Dampfbäder besuchen und sich keiner Hitze aussetzen (Wärme fördert die Durchblutung und kann das Ergebnis beeinflussen).
- Längeres Vorbeugen vermeiden (z. B. beim Yoga oder bei der Hausarbeit).
- Keine Gesichtsbehandlungen, Massagen oder aggressive Hautpflegeprodukte anwenden.
- Nicht zu viel Flüssigkeit vor dem Schlafengehen trinken (um Schwellungen zu vermeiden).
- Keine blutverdünnenden Medikamente (z. B. Aspirin, Ibuprofen) ohne ärztliche Anweisung einnehmen.

Die ersten 3 Tage:

- Keine kosmetischen Behandlungen durchführen lassen (keine weiteren Injektionen oder apparativen Verfahren im behandelten Bereich).
- Keine Flugreisen unternehmen (Druckunterschiede können die Wirkung des Botulinumtoxins beeinflussen).
- Keine Antibiotika aus der Gruppe der Aminoglykoside oder Muskelrelaxantien einnehmen.

Die ersten 7 Tage:

- Keine intensiven Peelings, Laserbehandlungen oder Gesichtsmassagen durchführen lassen.
- Keine direkte Sonneneinstrahlung oder Solariumbesuche ohne Sonnenschutz.

.Die Einhaltung dieser zeitlichen Vorgaben hilft dabei, das bestmögliche und langanhaltende Ergebnis der Botulinumtoxin-Behandlung zu erzielen.

Diese Empfehlungen basieren auf allgemein anerkannten medizinischen Protokollen, die von Fachärzten für ästhetische Medizin und Dermatologie verwendet werden. Sie entsprechen den Standardrichtlinien der Hersteller von Botulinumtoxin (z. B. Botox, Dysport, Xeomin) sowie den klinischen Protokollen in der ästhetischen Medizin.

Was man nach der Mesotherapie nicht tun sollte: Expertenempfehlungen

Die Mesotherapie ist eine Injektionsbehandlung, nach der die Haut besondere Pflege benötigt. Werden die Einschränkungen nicht beachtet, kann dies zu Reizungen, Entzündungen oder einer geringeren Wirksamkeit der Behandlung führen.

In den ersten 4–6 Stunden:

1. Die behandelte Haut nicht berühren oder massieren – dies kann Reizungen oder Infektionen verursachen.
2. Keine dekorative Kosmetik auftragen – insbesondere Make-up oder Foundation kann die Poren verstopfen und Entzündungen auslösen.
3. Die behandelten Bereiche nicht mit Wasser in Berührung bringen – kein Waschen oder Thermalwasserspray verwenden, um die Hautschutzbarriere nicht zu stören.

In den ersten 24 Stunden:

4. Keine Wärmebehandlungen oder direkte Sonneneinstrahlung – keine heißen Bäder, keine Sauna oder Sonnenbäder.
5. Keinen Alkohol trinken – Alkohol erweitert die Blutgefäße, was Schwellungen und Rötungen verstärken kann.
6. Keine intensive körperliche Aktivität ausüben – starkes Schwitzen kann Hautreizungen hervorrufen und die Wirkung der Behandlung verringern.
7. Keine aggressiven Hautpflegeprodukte verwenden – vermeiden Sie Peelings mit Säuren, Retinol oder alkoholhaltige Toner.

In den ersten 3 Tagen:

8. Nicht sonnenbaden oder ins Solarium gehen – UV-Strahlung kann Hyperpigmentierung und Hautirritationen verursachen.
9. Keine Gesichtsmassagen durchführen – mechanischer Druck auf die Haut kann Schwellungen verstärken.
10. Nicht im Schwimmbad oder in offenen Gewässern baden – dies erhöht das Infektionsrisiko.

In der ersten Woche:

11. Keine weiteren kosmetischen Behandlungen durchführen lassen – Laserbehandlungen, Peelings oder apparative Verfahren können die Haut zusätzlich reizen.

12. Keine Haarentfernung, kein starkes Peeling oder andere aggressive Hautbehandlungen – dies verlangsamt den Heilungsprozess.

Die Einhaltung dieser Empfehlungen hilft, Komplikationen zu vermeiden und die maximale Wirkung der Mesotherapie zu erzielen.

Was man nach der PDO-Fadenlifting-Behandlung nicht tun sollte

...Nach dem Einsetzen von PDO-Fäden (Polydioxanon-Fäden) ist es wichtig, bestimmte Einschränkungen zu beachten. Diese Fäden stimulieren die Kollagenproduktion und lösen sich mit der Zeit auf, weshalb sie eine gewisse Schonzeit benötigen, um sich richtig im Gewebe zu verankern.

In den ersten 6 Stunden:

1. Das Gesicht nicht berühren oder massieren – jeglicher Druck kann die Fäden verschieben.
2. Kein Waschen des Gesichts oder Auftragen von Kosmetika – um Infektionen zu vermeiden.
3. Keine heißen Getränke oder Speisen konsumieren – Hitze kann Schwellungen verstärken.

In den ersten 24 Stunden:

4. Nicht auf der Seite oder auf dem Bauch schlafen – am besten auf dem Rücken mit leicht erhöhtem Kopf liegen, um Schwellungen zu minimieren.
5. Keine intensiven Gesichtsbewegungen machen – vermeiden Sie übermäßiges Lächeln, Gähnen oder starkes Kauen, um die Fäden nicht zu lockern.
6. Kein Alkohol oder Nikotin konsumieren – dies kann die Wundheilung verlangsamen und Entzündungen fördern.
7. Kein Sport oder schweres Heben – um den Blutfluss nicht zu stark anzuregen, da dies zu stärkeren Schwellungen oder Schmerzen führen kann.

In den ersten 3–7 Tagen:

8. Nicht mit dem Gesicht nach unten schlafen – um eine Verformung der Fäden zu vermeiden.
9. Keine Sauna, Dampfbäder, Solarien oder heiße Bäder – Hitze erweitert die Blutgefäße und kann zu stärkeren Schwellungen führen.
10. Keine Zahnbehandlungen durchführen lassen – starkes Öffnen des Mundes kann die Platzierung der Fäden beeinträchtigen.
11. Keine kosmetischen Behandlungen in der behandelten Region – keine Injektionen, Laserbehandlungen oder mechanischen Gesichtsbearbeitungen.

Keine harte Nahrung essen – Nüsse, harte Brotrinden oder Kaugummi belasten die Gesichtsmuskulatur zu stark.

In den ersten 2–4 Wochen:

13. Keine Gesichtsmassagen oder manuelle kosmetische Behandlungen – dies kann die Fäden verschieben.
14. Keine intensiven Sportarten oder Workouts – insbesondere solche mit starken Kopfbewegungen oder hoher Belastung.
15. Keine extremen Temperaturschwankungen für das Gesicht – vermeiden Sie zum Beispiel kalten Wind ohne Schutz oder direkte Sonneneinstrahlung.

Zusätzliche Empfehlungen:

- Leichte Schwellungen, Druckempfindlichkeit und ein Spannungsgefühl sind normal und sollten innerhalb von 1–2 Wochen abklingen.
- Eine weiche Ernährung wird empfohlen (Suppen, Joghurt, weiches Gemüse), um die Kaumuskulatur zu entlasten.
- Die vollständige Heilung und Stabilisierung des Ergebnisses dauert 1–2 Monate, daher sollten aggressive äußere Einflüsse in dieser Zeit vermieden werden.

Durch die Einhaltung dieser Regeln können sich die PDO-Fäden optimal im Gewebe festsetzen, was das Risiko von Komplikationen minimiert und ein langanhaltendes Lifting-Ergebnis sichert.

Das Vampir-Lifting (PRP-Therapie) ist eine Injektionsbehandlung, bei der mit thrombozytenreichem Plasma gearbeitet wird. Nach der Behandlung ist die Haut besonders empfindlich und benötigt eine schonende Pflege. Werden die Empfehlungen nicht befolgt, kann dies die Wirkung verringern oder zu unerwünschten Reaktionen führen.

In den ersten 4–6 Stunden:

1. Die Haut nicht berühren oder massieren – mechanische Reize können Irritationen oder Infektionen verursachen.
2. Kein Waschen des Gesichts und keine Kosmetik auftragen – die Haut sollte sauber bleiben, um das Infektionsrisiko zu minimieren.
3. Nicht an staubigen oder stark verschmutzten Orten aufhalten – offene Poren können leichter Schadstoffe aufnehmen.

In den ersten 24 Stunden:

4. Keine dekorative Kosmetik verwenden – Make-up, Foundation oder Puder können die Poren verstopfen.

5. Kein Sport oder starkes Schwitzen – übermäßiges Schwitzen kann Hautreizungen verstärken.
6. Kein Alkohol und Nikotin konsumieren – dies beeinträchtigt die Mikrozirkulation und kann die Regeneration verlangsamen.
7. Keine heißen Bäder, Sauna oder Dampfbäder – Hitze erweitert die Blutgefäße und kann Schwellungen verstärken.

In den ersten 3 Tagen:

8. Nicht sonnenbaden oder das Solarium besuchen – UV-Strahlen können zu Pigmentstörungen und Entzündungen führen.
9. Keine aggressiven Pflegeprodukte verwenden – Peelings, alkoholhaltige Toner und Säureprodukte sind verboten.
10. Nicht im Schwimmbad oder offenen Gewässern baden – dies erhöht das Infektionsrisiko.

In der ersten Woche:

11. Keine Injektions- oder apparativen Behandlungen durchführen – Laser, Mesotherapie oder Ultraschall können die Haut zusätzlich reizen.
12. Keine tiefen Gesichtereinigungen oder Massagen – dies kann die Haut schädigen und die PRP-Wirkung verringern.
13. Wenig Koffein und Salz konsumieren – beides kann Schwellungen verstärken.

Zusätzliche Empfehlungen:

- Mehr Wasser trinken – dies fördert die Regeneration der Haut.
- Sonnenschutz mit SPF 30+ verwenden – um Hyperpigmentierung zu vermeiden.
- Feuchtigkeitsspendende und beruhigende Pflegeprodukte nutzen – z. B. mit Panthenol oder Hyaluronsäure.

Die Einhaltung dieser Regeln hilft der Haut, sich schneller zu regenerieren und den maximalen Nutzen aus der PRP-Therapie zu ziehen.

Was Sie nach der Injektionslipolyse vermeiden sollten – Expertenrat für optimale Ergebnisse

Die Injektionslipolyse („Fett-weg-Spritze“) ist eine gezielte Methode zur Reduktion kleiner Fettdepots. Für eine sichere Heilung und ein optimales Ergebnis beachten Sie bitte folgende Nachsorgeempfehlungen:

In den ersten 4–6 Stunden:

- Nicht berühren oder massieren: Die behandelten Bereiche können empfindlich reagieren – Reibung oder Druck vermeiden.
- Kein Make-up oder Pflegeprodukte auftragen: Besonders im Gesicht sollte die Haut ungestört heilen.
- Kein Wasserkontakt: Waschen oder Sprays bitte erst später verwenden.

In den ersten 24 Stunden:

- Keine Hitze, kein Sport: Heiße Duschen, Sauna oder intensive Bewegung können Schwellungen fördern.
- Kein Alkohol: Alkohol erweitert die Gefäße und kann Nebenwirkungen verstärken.
- Keine Kühlung ohne Rücksprache: Leichte Schwellungen sind normal – nur bei Bedarf und nach ärztlicher Empfehlung kühlen.

In den ersten 3 Tagen:

- Keine Massagen oder mechanische Behandlungen: Diese können den Behandlungseffekt stören.
- Nicht schwimmen oder baden: Schwimmbäder, Seen und Meerwasser erhöhen das Infektionsrisiko.
- Keine intensive Sonneneinstrahlung oder Solarium: UV-Strahlung kann zu Pigmentstörungen führen.

In der ersten Woche:

- Keine weiteren ästhetischen Behandlungen: Laser, Microneedling oder Peelings sollten vermieden werden.
- Keine aggressive Hautpflege: Produkte mit Säuren, Retinol oder Alkohol können die Haut zusätzlich reizen.

Ab dem 5.–7. Tag:

- Lymphdrainage oder sanfte Massagen: Unterstützende Massagen können den Abtransport gelöster Fettzellen fördern und das Ergebnis verbessern. Empfehlenswert ist ein Kurs von 3–5 Sitzungen, jeweils nach Rücksprache mit Ihrem Behandler.

Gut zu wissen:

Schwellungen, Spannungsgefühl oder leichte Rötungen sind normale Reaktionen und klingen meist innerhalb weniger Tage ab. Bei Unsicherheiten oder ungewöhnlichen Symptomen

wenden Sie sich bitte an Ihre behandelnde Fachkraft.