

6.2 Рекомендация

1. Первый блок (список)

После инъекции филлеров в губы есть несколько важных вещей, которых следует избегать, чтобы предотвратить осложнения и добиться наилучшего результата. Вот основные запреты:

1. Не трогайте и не массируйте губы – В первые 24–48 часов не следует тереть, массировать или пытаться «разгладить» неровности, так как это может привести к неравномерному распределению филлера.
2. Не пейте алкоголь – Алкоголь расширяет кровеносные сосуды и может усилить отеки и синяки. Воздержитесь как минимум на 48 часов.
3. Не курите – Курение замедляет заживление и может негативно повлиять на распределение филлера.
4. Не пейте через соломинку и избегайте чрезмерной мимики – Эти движения могут сместить филлер и привести к образованию узлов.
5. Не посещайте сауну, парную, солярий и горячие ванны – Высокие температуры способствуют кровообращению и могут усилить отеки или быстрее разрушить филлер.
6. Не занимайтесь интенсивным спортом – Физическая нагрузка увеличивает кровообращение и может усилить отеки и синяки. Воздержитесь от спорта на 2–3 дня.
7. Не принимайте разжижающие кровь препараты без назначения врача – Аспирин, ибупрофен и другие НПВП могут усилить кровотечения и синяки.
8. Не используйте декоративную косметику – В первые 12–24 часа следует воздержаться от помады, блеска для губ или бальзама для губ, чтобы избежать инфекций.
9. Не проводите косметические процедуры или массаж лица – Избегайте в течение как минимум двух недель дополнительных инъекций, лазерных процедур, пилингов и аппаратных методов в области губ.
10. Не подвергайте прямому солнечному свету – УФ-излучение может усилить отеки и вызвать воспаления. Используйте бальзам для губ с SPF.

Что нельзя делать после лечения ботулиническим токсином: Четкие временные рамки

Первые 6 часов:

- Не ложитесь и не наклоняйте голову вниз (например, не завязывайте обувь, не мойте с опущенной головой).
- Не трогайте и не массируйте обработанные области (чтобы избежать нежелательного смещения ботулотоксина).
- Активно используйте мимику (например, хмурьте лоб, поднимайте брови), чтобы препарат лучше распределился в мышцах.

Первые 24 часа:

- Не употребляйте алкоголь (это расширяет кровеносные сосуды и может уменьшить эффект ботулотоксина).
- Не занимайтесь спортом или физической нагрузкой (повышенное кровообращение может ускорить распад препарата).
- Не принимайте горячие ванны, не посещайте сауну или парные и не подвергайтесь воздействию тепла (тепло способствует кровообращению и может повлиять на результат).
- Избегайте длительного наклона (например, во время йоги или домашних дел).
- Не проводите процедуры для лица, массажи или используйте агрессивные средства по уходу за кожей.
- Не пейте слишком много жидкости перед сном (чтобы избежать отеков).
- Не принимайте разжижающие кровь препараты (например, аспирин, ибупрофен) без назначения врача.

Первые 3 дня:

- Не проводите косметические процедуры (никаких дополнительных инъекций или аппаратных процедур в обработанной области).
- Не совершайте авиаперелеты (разница давления может повлиять на эффект ботулотоксина).
- Не принимайте антибиотики из группы аминогликозидов или миорелаксанты.

Первые 7 дней:

- Не проводите интенсивные пилинги, лазерные процедуры или массажи лица.
- Не подвергайтесь прямым солнечным лучам или посещениям солярия без солнцезащитного крема.

Соблюдение этих временных рекомендаций помогает достичь наилучшего и долговременного результата лечения ботулотоксином.

Эти рекомендации основаны на общепринятых медицинских протоколах, используемых специалистами в области эстетической медицины и дерматологии. Они соответствуют стандартным рекомендациям производителей ботулотоксина (например, Botox, Dysport, Xeomin), а также клиническим протоколам в эстетической медицине.

Что нельзя делать после мезотерапии: рекомендации экспертов

Мезотерапия – это инъекционная процедура, после которой коже требуется особый уход. Если ограничения не будут соблюдены, это может привести к раздражениям, воспалениям или снижению эффективности лечения.

В первые 4–6 часов:

1. Не трогать и не массировать обработанную кожу – это может вызвать раздражение или инфекции.
2. Не наносить декоративную косметику – особенно макияж или тональный крем могут забивать поры и вызывать воспаления.
3. Не допускать контакта обработанных участков с водой – не умываться и не использовать термальную воду, чтобы не нарушить защитный барьер кожи.

В первые 24 часа:

4. Не проводить тепловые процедуры или подвергать кожу прямому солнечному свету – никаких горячих ванн, сауны или солнечных ванн.
5. Не употреблять алкоголь – алкоголь расширяет кровеносные сосуды, что может усилить отеки и покраснения.
6. Не заниматься интенсивной физической активностью – сильное потоотделение может вызвать раздражение кожи и снизить эффективность лечения.
7. Не использовать агрессивные средства по уходу за кожей – избегайте пилингов с кислотами, ретинолом или тоников с содержанием алкоголя.

В первые 3 дня:

8. Не загорать и не посещать солярий – УФ-излучение может вызвать гиперпигментацию и раздражение кожи.
9. Не проводить массаж лица – механическое давление на кожу может усилить отеки.
10. Не купаться в бассейне или открытых водоемах – это увеличивает риск инфекции.

В первую неделю:

11. Не проводить другие косметические процедуры – лазерные процедуры, пилинги или аппаратные методы могут дополнительно раздражать кожу.
12. Не удалять волосы, не проводить сильный пилинг или другие агрессивные процедуры для кожи – это замедляет процесс заживления.

Соблюдение этих рекомендаций помогает избежать осложнений и достичь максимального эффекта от мезотерапии.

Что нельзя делать после процедуры PDO-нитевого лифтинга

...После установки PDO-нитей (нитей из полидиоксанона) важно соблюдать определенные ограничения. Эти нити стимулируют выработку коллагена и со временем рассасываются, поэтому им необходимо время для правильной фиксации в ткани.

В первые 6 часов:

1. Не трогайте и не массируйте лицо – любое давление может сместить нити.
2. Не мойте лицо и не наносите косметику – чтобы избежать инфекций.
3. Не употребляйте горячие напитки или пищу – тепло может усилить отеки.

В первые 24 часа:

4. Не спите на боку или на животе – лучше лежать на спине с немного приподнятой головой, чтобы минимизировать отеки.
5. Не делайте интенсивных движений лицом – избегайте чрезмерной улыбки, зевания или сильного жевания, чтобы не ослабить нити.
6. Не употребляйте алкоголь или никотин – это может замедлить заживление ран и способствовать воспалениям.
7. Не занимайтесь спортом или тяжелыми физическими нагрузками – чтобы не слишком стимулировать кровоток, так как это может привести к более сильным отекам или болям.

В первые 3–7 дней:

8. Не спите лицом вниз – чтобы избежать деформации нитей.
9. Не посещайте сауну, парные, солярии или горячие ванны – тепло расширяет кровеносные сосуды и может привести к более сильным отекам.
10. Не проводите стоматологические процедуры – сильное открытие рта может повлиять на размещение нитей.
11. Не проводите косметические процедуры в обработанной области – никаких инъекций, лазерных процедур или механических процедур для лица.

Не ешьте твердую пищу – орехи, твердые корки хлеба или жевательную резинку слишком сильно нагружают лицевую мускулатуру.

В первые 2–4 недели:

13. Не проводите массаж лица или мануальные косметические процедуры – это может сместить нити.
14. Не занимайтесь интенсивными видами спорта или тренировками – особенно такими, которые связаны с резкими движениями головы или высокой нагрузкой.
15. Избегайте резких температурных колебаний для лица – например, холодного ветра без защиты или прямых солнечных лучей.

Дополнительные рекомендации:

- Легкие отеки, чувствительность к давлению и ощущение натяжения являются нормальными и должны пройти в течение 1–2 недель.
- Рекомендуется мягкая диета (супы, йогурт, мягкие овощи), чтобы разгрузить жевательную мускулатуру.
- Полное заживление и стабилизация результата занимает 1–2 месяца, поэтому в этот период следует избегать агрессивных внешних воздействий.

Соблюдение этих правил позволяет PDO-нитям оптимально закрепляться в ткани, что минимизирует риск осложнений и обеспечивает длительный эффект лифтинга.

Вампирский лифтинг (PRP-терапия) — это инъекционное лечение, при котором используется тромбоцитарная плазма. После процедуры кожа особенно чувствительна и требует бережного ухода. Если рекомендации не будут соблюдены, это может снизить эффективность или привести к нежелательным реакциям.

В первые 4–6 часов:

1. Кожу не трогать и не массировать – механические раздражители могут вызвать раздражение или инфекции.
2. Не умываться и не наносить косметику – кожа должна оставаться чистой, чтобы минимизировать риск инфекции.
3. Не находиться в пыльных или сильно загрязненных местах – открытые поры могут легче впитывать вредные вещества.

В первые 24 часа:

4. Не использовать декоративную косметику – макияж, тональный крем или пудру могут забивать поры.
5. Не заниматься спортом и не потеть сильно – чрезмерное потоотделение может усилить раздражение кожи.
6. Не употреблять алкоголь и никотин – это ухудшает микроциркуляцию и может замедлить регенерацию.
7. Не принимать горячие ванны, сауну или паровые бани – тепло расширяет кровеносные сосуды и может усилить отеки.

В первые 3 дня:

8. Не загорать и не посещать солярий – УФ-лучи могут привести к пигментационным нарушениям и воспалениям.
9. Не использовать агрессивные средства ухода – пилинги, тоники с содержанием алкоголя и кислоты запрещены.
10. Не купаться в бассейне или открытых водоемах – это увеличивает риск инфекции.

На первой неделе:

11. Не проводить инъекционные или аппаратные процедуры – лазер, мезотерапия или ультразвук могут дополнительно раздражать кожу.
12. Не делать глубокие очищения лица или массажи – это может повредить кожу и уменьшить эффект PRP.
13. Употреблять мало кофеина и соли – оба могут усилить отеки.

Дополнительные рекомендации:

- Пить больше воды – это способствует регенерации кожи.
- Использовать солнцезащитный крем с SPF 30+ – чтобы избежать гиперпигментации.
- Использовать увлажняющие и успокаивающие средства ухода – например, с пантенолом или гиалуроновой кислотой.

Соблюдение этих правил помогает коже быстрее регенерироваться и получить максимальную пользу от PRP-терапии.

Что следует избегать после инъекционной липолизы – советы экспертов для достижения оптимальных результатов

Инъекционная липолиз («жиросжигающий укол») является целенаправленным методом уменьшения небольших жировых отложений. Для безопасного заживления и

оптимального результата, пожалуйста, обратите внимание на следующие рекомендации по послеоперационному уходу:

В первые 4–6 часов:

- Не трогать и не массировать: Обработанные участки могут реагировать чувствительно – избегайте трения или давления.
- Никакого макияжа или уходовых средств: Особенно на лице кожа должна заживать без помех.
- Никакого контакта с водой: Мытьё или спреи используйте только позже.

В первые 24 часа:

- Никакой жары, никакого спорта: Горячие души, сауна или интенсивные физические нагрузки могут способствовать отёкам.
- Никакого алкоголя: Алкоголь расширяет сосуды и может усилить побочные эффекты.
- Никакого охлаждения без консультации: Лёгкие отёки нормальны – охлаждать только при необходимости и по рекомендации врача.

В первые 3 дня:

- Никаких массажей или механических процедур: Они могут нарушить эффект лечения.
- Не плавать и не купаться: Бассейны, озёра и морская вода увеличивают риск инфекции.
- Никакого интенсивного солнечного света или солярия: УФ-излучение может привести к пигментационным нарушениям.

В первую неделю:

- Никаких других эстетических процедур: Лазеры, микронедлинг или пилинги следует избегать.
- Никакого агрессивного ухода за кожей: Продукты с кислотами, ретинолом или алкоголем могут дополнительно раздражать кожу.

С 5-го по 7-й день:

- Лимфодренаж или мягкие массажи: Поддерживающие массажи могут способствовать выведению растворённых жировых клеток и улучшить результат. Рекомендуется курс из 3–5 сеансов, каждый из которых следует согласовать с вашим лечащим врачом.

Хорошо знать:

Отёки, чувство напряжения или лёгкие покраснения являются нормальными реакциями и обычно проходят в течение нескольких дней. В случае сомнений или необычных симптомов, пожалуйста, обратитесь к вашему лечащему специалисту.