Bouturage et Marcottage

Table des Matières

Bouturage et Marcottage....1
- Bouturage....2
- Marcottage....3
- Annexe....4
  - Citrus sinensis (Oranger)....4
    - Bouturage....4
    - Marcottage aérien....5
  - Poncirus trifoliata (Poncire trifolié)....5
    - Bouturage....5
    - Marcottage aérien....6
  - Eucalyptus deglupta (Eucalyptus arc-en-ciel)....6
    - Bouturage....6
    - Marcottage....6
  - Hippophae rhamnoides (Argousier)....6
    - Bouturage....6
    - Marcottage....7
  - Olea europaea (Olivier)....7
    - Bouturage....7
    - Marcottage aérien....7
  - Pinus spp. (Pins)....7
    - Bouturage....7
    - Marcottage....8
  - Rubus idaeus (Framboisier)....8
    - Drageons....8
    - Boutures de racines....8
    - Boutures de tige....8
    - Marcottage....8
  - Rubus fruticosus (Ronce, mûre)....8
    - Marcottage par pointe....8
    - Bouturage....9
  - Ribes rubrum (Groseillier rouge)....9
    - Bouturage aoûté....9
    - Marcottage....9
  - Ribes uva-crispa (Groseillier à maquereau)....9
    - Bouturage aoûté....9
    - Marcottage....9
  - Selenicereus spp. (Pitaya / fruit du dragon)....10
    - Bouturage....10
    - Marcottage....10
  - Pistacia spp. (Pistachier, térébinthe)....10
    - Bouturage....10
    - Marcottage aérien....10
  - Prunus cerasifera (Prunier myrobolan pourpre)....11
    - Drageons....11
    - Bouturage semi-aoûté....11

Bouturage aoûté....11
Marcottage....11
Actinidia deliciosa et A. chinensis (Kiwi vert et jaune)....11
Bouturage....11
Bouturage aoûté....12
Marcottage....12

Bouturage

Espèce	Se prête-t-il au bouturage ?	Type de bouture	Quand	Hormone (AIB/IBA)	Enracinement
Citrus sinensis (Oranger)	Oui, mais capricieux	Semi-aoûtée (avec feuilles)	Été, après durcissement de la pousse	Utile (poudre 0,1–0,3 %)	4–6 semaines
Poncirus trifoliata (Poncire)	Difficile — boutures juvéniles surtout	Semi-aoûtée / aoûtée	Juin (jeunes pousses)	Peu d'effet selon études	6–12 semaines, taux faible
Eucalyptus deglupta (Arc-en-ciel)	Oui, à condition de bois jeune (< 5 ans)	Semi-aoûtée	Printemps–début été	Utile, pas indispensable	6–8 semaines
Hippophae rhamnoides (Argousier)	Oui, facile — LA méthode standard	Aoûtée (bois de l'année) ; semi-aoûtée aussi	Dormance (fin hiver–mars) pour l'aoûtée ; début été pour la semi-aoûtée	Optionnelle (500 ppm améliore ; fortes doses nuisent)	4–8 semaines
Olea europaea (Olivier)	Oui, très facile — méthode standard en pépinière	Semi-aoûtée / aoûtée	Août–sept. (semi-aoûtée) ; hiver (aoûtée)	0,2–0,3 % IBA recommandé	~3 mois
Pinus spp. (Pin)	Difficile — espèces et âge dépendants	Semi-aoûtée (mugo) / aoûtée (pin blanc)	Après premières gelées d'automne	Indispensable	Plusieurs mois (lent)
Rubus idaeus (Framboisier)	Moyen — les drageons sont bien plus simples	Racines (fragments) ; herbacée possible	Automne–hiver (racines)	Non nécessaire	Drageon prêt à planter

Rubus fruticosus (Ronce)	Oui (aoûtée) mais le marcottage domine	Aoûtée de canne	Février	Utile	4–8 semaines
Ribes rubrum (Groseillier rouge)	Oui, très facile	Aoûtée (20–30 cm)	Fin automne–hiver (repos)	Non nécessaire	Enracinement au printemps
Ribes uva-crispa (Groseillier à maquereau)	Oui, facile (un peu moins que le groseillier)	Aoûtée	Repos (automne–hiver)	Non nécessaire	Racines au printemps, repiquage à l'automne suivant
Selenicereus spp. (Pitaya)	Oui, trivial — méthode standard mondiale	Tige (segment de cladode)	Toute l'année, saison chaude de préférence	Optionnelle	7–8 jours de cicatrisation puis racines en 2–6 semaines
Pistacia spp. (Pistachier, térébinthe)	Difficile — enracinement récalcitrant	Semi-aoûtée	Été	Indispensable	Variable, souvent décevant ; le greffage domine
Prunus cerasifera (Myrobolan pourpre)	Moyen — possible avec brumisation et hormone	Semi-aoûtée ; aoûtée	Mai–juin (semi) ; hiver (aoûtée)	Indispensable (3 000–5 000 mg/L pour l'aoûtée)	6–10 semaines (semi) ; 4–6 mois (aoûtée), 20–91 %
Actinidia deliciosa / A. chinensis (Kiwi vert / jaune)	Oui, très bien — méthode standard	Herbacée (préférée) ; aoûtée possible	Vert : juin–juillet (herbacée) ; hiver (aoûtée, bois de taille)	Utile (IBA liquide 500–4 000 mg/L)	4–8 semaines sous brumisation

Marcottage

Espèce	Se prête-t-il au marcottage ?	Type	Quand	Délai d'enracinement
Citrus sinensis	Oui, très bien — méthode classique	Aérien	Printemps (bois de l'année précédente) ou mi-été	2–4 mois
Poncirus trifoliata	Possible (anecdotique)	Aérien	Printemps–été	~2–3 mois, succès aléatoire
Eucalyptus deglupta	Non documenté / peu adapté	—	—	—
Hippophae	Non nécessaire —	— (drageons)	Toute l'année	—

rhamnoides	drageons et rejets abondent			
Olea europaea	Oui, possible	Aérien	Printemps–été	2–3 mois
Pinus spp.	Non — conifères récalcitrants au marcottage	—	—	—
Rubus idaeus	Oui (canes flexibles)	Simple / par pointe	Fin été–automne	Racines formées en ~1 an
Rubus fruticosus	Oui, très bien — le plus simple	Par pointe	Fin été (les canes se couchent seules)	Automne–hiver
Ribes rubrum	Oui, possible	Simple (rameau bas enterré)	Automne–hiver	Racines à l'automne suivant
Ribes uva-crispa	Oui, très adapté (port retombant)	Simple / par pointe	Automne–hiver (rameau de l'année)	Racines en automne, séparation au printemps
Selenicereus spp.	Non pertinent — le bouturage est instantané	—	—	—
Pistacia spp.	Oui — alternative sérieuse au bouturage	Aérien	Saison de croissance	Enracinement réussi avec AIB + GA3 (étude 2019)
Prunus cerasifera	Non documenté ; drageons à la base possibles	— (drageons)	—	—
Kiwi vert/jaune	Oui, simple — pousse âgée d'un an couchée	Simple (marcottage de vigne)	Printemps	Séparer après 6–8 mois

Annexe

Citrus sinensis (Oranger)

Bouturage

Possible mais l'espèce racine mal depuis bouture détachée ; le marcottage aérien et le greffage sont préférés (Straits Times : https://www.straitstimes.com/life/home-design/root-awakening-citrus-can-be-propagated-via-air-layering-or-grafting).

En pépinière, les porte-greffes d'agrumes se multiplient par boutures de tige sous brumisation (Proc. Fla. State Hort. Soc. : https://journals.flvc.org/fshs/article/download/94987/91008).

1. Prélever un bouture semi-aoûtée de 10–15 cm avec quelques feuilles, sous un nœud.
2. Retirer les feuilles du bas, en garder 2–3 réduites de moitié.
3. Tremper la base dans hormone (AIB/IBA ou ANA), planter dans mélange drainant, couvrir d'un sachet, chaleur de fond 20–25 °C. Enracinement en 4–6 semaines (Mein schöner Garten : https://en.garden-landscape.com/citrus-plants-reproduce-by-cuttings-3004).

Marcottage aérien

Méthode de choix, protocole détaillé chez Texas A&M (https://aggie-horticulture.tamu.edu/earthkind/landscape/air-layering/) :

1. Choisir un rameau de la grosseur d'un crayon, bois de l'année précédente (printemps) ou pousse aoûtée de l'année (mi-été).
2. Anneler : deux incisions parallèles espacées de ~4 cm autour de la tige, retirer l'anneau d'écorce jusqu'au bois (ne pas laisser d'écorce, sinon l'anneau se referme).
3. Gratter légèrement le cambium, appliquer hormone d'enracinement sur la blessure.
4. Entourer d'une boule de tourbe humide (ou mousse de sphaigne), filmer de plastique opaque, ficeler haut et bas.
5. Attendre 2–4 mois : quand les racines remplissent la motte, sectionner sous le film et planter (AgriPure : https://agripure.org/articles/air-layering-fruit-trees).

Nota : le marcottage donne un arbre « sur ses propres racines », sans la tolérance au froid ni la résistance aux Phytophthora d'un porte-greffe — pour un agrume en Aude, le greffage sur poncirus reste la voie robuste.

Poncirus trifoliata (Poncire trifolié)

Bouturage

Documenté mais difficile. L'enracinement dépend fortement de la juvénilité : les boutures prélevées sur arbres jeunes racinent mieux, et ni les bactéries promoteuses ni l'IBA n'améliorent l'enracinement (ResearchGate : https://www.researchgate.net/publication/251009896_Effects_of_Juvenility_on_the_Rooting_of_Trifoliate_Orange_Poncirus_trifoliata_L_Raf_Stem_Cuttings).

1. Début juin : boutures semi-aoûtées de 10–15 cm, base juste sous un nœud.
2. Hormone légère, mélange 50/50 tourbe-perlite, sachet humide, lumière indirecte.
3. Compter 6–12 semaines et un taux d'échec élevé ; multiplier les essais.

Le cultivar 'Flying Dragon' se bouture selon le même protocole, rempotage 4–6 semaines après enracinement (Weekand : https://www.weekand.com/home-garden/article/propagate-flying-dragon-trees-18065353.php).

Marcottage aérien

Réussites anecdotiques rapportées sur des rejets (Houzz : https://www.houzz.com/discussions/5813049/rooting-flying-dragon-cuttings) — même technique que l'oranger, sans garantie.

Verdict : pour le poncirus, le semis (cf. cheatsheet graines) puis le greffage est nettement plus fiable ; le marcottage aérien vaut le coup d'essai sur un rejet.

Eucalyptus deglupta (Eucalyptus arc-en-ciel)

Bouturage

Possible uniquement avec du matériel jeune. Les boutures d'arbres de moins de ~5 ans racinent, celles d'arbres plus âgés non — un composé inhibiteur se forme avec l'âge. Davidson (1974) a obtenu plus de 95 % d'enracinement sur des boutures issues de semis de 2–3 mois, y compris en eau.

1. Bouture semi-aoûtée de 15–20 cm, pousse de l'année, sans fleurs ni capsules.
2. Retirer les feuilles sur les 2/3 bas, couper juste sous un nœud.
3. Hormone utile, milieu drainant (tourbe-perlite), humidité élevée, chaud (25–30 °C) et lumineux sans soleil direct.
4. Racines en 6–8 semaines.

Marcottage

Non documenté pour cette espèce ; l'arbre rejette et drageonne en climat tropical, mais le bouturage de matériel juvénile reste la voie clonale.

Hippophae rhamnoides (Argousier)

Bouturage

Méthode standard pour garantir le sexe des plants, seules les femelles fructifient (Practical Self Reliance : https://practicalselfreliance.com/sea-buckthorn-hippophae-rhamnoides/) :

- Aoûtée : prélever en période de dormance (fin d'automne à début de printemps) des segments de 15–20 cm sur le bois de l'année ; planter au printemps (mars), un tiers enterré, le meilleur enracinement obtenu avec trempage à l'eau courante puis 500 ppm d'AIB. L'hormone n'est pas indispensable.
- Semi-aoûtée : début d'été, sous humidité élevée ; c'est la fenêtre qui donne le meilleur enracinement selon les guides horticoles (ForwardPlant : https://www.forwardplant.com/care/propagate/hippophae-rhamnoides/).

Drageons et boutures de racines : l'argousier drageonne abondamment — séparer un drageon raciné est la voie la plus rapide ; les boutures de racines réussissent très bien aussi.

Marcottage

Non nécessaire — la plante se propage seule par drageons.

Olea europaea (Olivier)

Bouturage

LA méthode (l'olivier se clone quasi exclusivement ainsi en pépinière) :

1. Août–septembre : bouture semi-aoûtée de 15–20 cm, de la pousse de l'année qui commence à durcir, après la nouaison (Hunker : https://www.hunker.com/13428781/how-to-grow-olive-trees-from-cuttings/).
2. Retirer les feuilles sauf 2–3 au sommet ; couper la base en biseau sous un nœud.
3. Tremper dans talc d'enracinement à 0,2 % d'IBA (Weekand : https://www.weekand.com/home-garden/article/propagate-olive-trees-18065757.php).
4. Milieu : moitié sable lavé, moitié tourbe (ou perlite-tourbe) ; chaleur de fond ~21 °C, brumiser le feuillage 2–3 fois/jour, à l'ombre.
5. Contrôler l'enracinement par une traction douce au bout de ~3 mois ; arrêter le chauffage dès l'enracinement. Première (petite) récolte ~4 ans (Hunker : https://www.hunker.com/13428781/how-to-grow-olive-trees-from-cuttings/).

Marcottage aérien

Possible au printemps–été, protocole standard (annelage 3–4 cm, hormone, mousse, film), enracinement en 2–3 mois.

Pinus spp. (Pins)

Bouturage

Difficile mais faisable. Les espèces les plus faciles sont P. mugo (pin de montagne, bouture semi-aoûtée) et P. strobus (pin blanc, bouture aoûtée) (Hunker : https://www.hunker.com/13429106/how-to-grow-pine-trees-from-cuttings/). Le matériel juvénile enracine beaucoup mieux ; pour des pins matures, le stockage des boutures 4 semaines à 4 °C avant plantation améliore l'enracinement, étudié sur P. halepensis (Israel J. Plant Sci. : https://brill.com/view/journals/ijps/67/1-2/article-p5_5.xml).

1. Après les premières gelées d'automne (jusqu'à fin hiver, éviter les dégels), prélever des boutures de 10–15 cm à l'extrémité de pousses saines (Fine Gardening : https://www.finegardening.com/article/grow-your-own-conifers-from-hardwood-cuttings ; Am. Conifer Society : https://www2.conifersociety.org/blogpost/2082607/489786/How-to-Propagate-Conifers-from-Cuttings).
2. Retirer les aiguilles de la moitié basse (aucune aiguille ne doit toucher le sol).
3. Hormone d'enracinement indispensable ; milieu stérile 1:1 tourbe-perlite.

4. Couvrir d'un plastique clair (mini-serre), lumière vive sans soleil direct ; enracinement lent, plusieurs mois à un an.

Marcottage

Non — les conifères ne se prêtent pas au marcottage aérien ; le semis (cf. cheatsheet graines) est la voie normale.

Rubus idaeus (Framboisier)

Drageons

Le plus simple. Le framboisier s'étend naturellement : déterrer au printemps–automne un drageon à 30 cm et plus du pied, avec des racines, et replanter directement (Plantura : https://plantura.garden/uk/fruits/raspberries/propagating-raspberries).

Boutures de racines

Automne–hiver, segments de racines de 5–10 cm plantés horizontalement à 2–5 cm de profondeur — elles émettent des pousses au printemps (RHS : https://www.rhs.org.uk/plants/16137/rubus-idaeus/details).

Boutures de tige

Possibles (herbacées au printemps, semi-aoûtées début été, aoûtées en hiver — le RHS liste toutes ces fenêtres), mais le succès est médiocre pour le framboisier rouge : mieux vaut drageons et racines (Gardening Stack Exchange : https://gardening.stackexchange.com/questions/48020/is-it-possible-to-propagate-raspberries-from-cuttings).

Marcottage

Possible — coucher un bout de canne et l'enterrer fin été–automne, racines en ~1 an, puis séparer (RHS : https://www.rhs.org.uk/plants/16137/rubus-idaeus/details ; Plantura : https://plantura.garden/uk/fruits/raspberries/propagating-raspberries).

Rubus fruticosus (Ronce, mûre)

Marcottage par pointe

Méthode de prédilection, quasi sans soin : en fin d'été, les canes arquées touchent le sol et s'y enracinent d'elles-mêmes.

1. Choisir une longue cane saine de l'année, en courber la pointe vers le sol.
2. Enterrer la pointe à 5–10 cm, maintenir avec une pierre ou un crochet (retirer quelques feuilles de la pointe aide).
3. Les racines se forment pendant l'automne–hiver ; au printemps suivant, couper la cane côté mère et replanter le nouveau pied (FarmersOrbit : https://farmersorbit.com/propagating-blackberries/).

Bouturage

Aoûtées en février (segments de cane de 6–8 cm, sous châssis), ou boutures de racines de 8–15 cm posées horizontalement fin d'hiver ; drageons également disponibles (FarmersOrbit : https://farmersorbit.com/propagating-blackberries/). En pépinière, les boutures de canne sont une alternative aux plants issus de marcottage par pointe, avec des taux variables selon les types de ronce (ResearchGate : https://www.researchgate.net/publication/353864121_Propagation_of_blackberries_and_related_Rubus_species).

Ribes rubrum (Groseillier rouge)

Bouturage aoûté

Très facile :

1. Fin automne–hiver, sur bois dormant, couper des segments de 20–30 cm (au moins 3–4 bourgeons), juste sous un bourgeon à la base (Gardenish : https://gardenish.co/plants/ribes-rubrum/ ; EarthOne : https://earthone.io/plant/ribes%20rubrum).
2. Planter directement en terre de jardin ou en châssis, aux 2/3 enterrés, bourgeons vers le haut ; terre fraîche et drainante.
3. Enracinement fiable au printemps ; laisser croître une saison, planter à sa place l'automne suivant.

Hormone superflue ; les boutures semi-aoûtées de début d'été marchent aussi sous couvert.

Marcottage

Possible — coucher un rameau bas et l'enterrer sur 10–15 cm en automne, séparer l'année suivante.

Ribes uva-crispa (Groseillier à maquereau)

Bouturage aoûté

Comme le groseillier rouge, à ceci près que le maquereau enracine un peu moins généreusement ; boutures de 20–30 cm sur bois dormant, en terre ou châssis, prêtes à repiquer à l'automne suivant (Gardener's Navigator : https://gardenersnavigator.com/plants/gooseberry ; UAF Georgeson Botanical Garden : https://www.uaf.edu/afes/places/gbg/research/currant-propagation/index.php).

Marcottage

Très adapté, encore moins d'effort : le port retombant du maquereau s'y prête :

1. Automne–hiver : coucher une branche basse d'un an, enterrer une portion de 8–10 cm à 3–4 cm de profondeur (entailler légèrement l'écorce côté inférieur), laisser la pointe hors sol, maintenir avec un crochet.

2. Garder frais toute la saison ; racines formées à l'automne, séparer du pied mère et replanter au printemps suivant (Gardener's Navigator : https://gardenersnavigator.com/plants/gooseberry).

Le marcottage par pointe (pointe de cane enterrée sous une pierre) réussit aussi très bien. La fenêtre idéale combinée est l'automne–hiver, bouturage et marcottage ensemble.

Selenicereus spp. (Pitaya / fruit du dragon)

Bouturage

Trivial, méthode universelle :

1. Prélever un segment de tige (cladode) de 15–40 cm ; coupe en biais à la base, éventuellement traitée au fongicide. Les segments longs (35–40 cm) donnent la meilleure reprise et croissance (ResearchGate : https://www.researchgate.net/publication/231969648_Mass_Propagation_of_Pitaya_Dragon_Fruit).
2. Laisser cicatriser 7–8 jours à l'ombre sèche (étape critique contre la pourriture).
3. Planter verticalement à 5–10 cm de profondeur dans un substrat très drainant ; la reprise dépend fortement du substrat et de l'espèce (Scientific Reports, Nature : https://www.nature.com/articles/s41598-026-60049-0).
4. Arroser peu au départ ; croissance visible en quelques semaines, première récolte dès 1–2 ans (contre ~7 ans par semis).

Marcottage

Sans objet — chaque bouture s'enracine presque à coup sûr.

Pistacia spp. (Pistachier, térébinthe)

Espèce récalcitrante : l'enracinement des boutures de P. vera est difficile et non viable à grande échelle ; le greffage sur semis domine en pratique (Encyclopedia MDPI : https://encyclopedia.pub/entry/41975).

Bouturage

Semi-aoûtées sous brumisation avec AIB — documenté pour des porte-greffes ('UCB-1') et le lentisque (P. lentiscus), avec croissance rapide après reprise (Sci. Hortic. : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304423802000614 ; Mastic Tree, PDF : http://sakizagaci.gen.tr/wp-content/uploads/2019/03/PROPAGATION-OF-MASTIC-TREE-FROM-SEED-TO-TISSUE-CULTURE.pdf). À réserver aux conditions de serre.

Marcottage aérien

La voie clonale la plus prometteuse : une étude irakienne (2019) confirme la réussite du marcottage aérien sur P. vera avec traitements AIB + GA3 (ResearchGate :

https://www.researchgate.net/publication/337923468_Propagation_of_pistachio_Pistacia_vera_L_by_air_layering_under_the_effects_of_IBA_and_GA3_treatments).

1. Saison de croissance : anneler un rameau de 1–2 cm de diamètre (anneau d'écorce de 3–4 cm), appliquer AIB (poudre) ± GA3.
2. Mousse humide + film opaque, garder humide plusieurs mois.
3. Séparer une fois les racines formées ; compter sur un taux moyen.

Verdict : pour P. terebinthus/vera en plein champ, semis (cf. cheatsheet graines) puis greffage reste la voie fiable ; le marcottage aérien vaut l'essai pour cloner un sexe précis.

Prunus cerasifera (Prunier myrobolan pourpre)

Drageons

La méthode la plus rapide quand l'arbre en émet à la base — séparer et replanter directement (Greg : https://greg.app/propagate-cherry-plum/).

Bouturage semi-aoûté

Fin mai–juin, boutures feuillées de 10–15 cm sous humidité élevée (brumisation/sachet), hormone standard ; enracinement en 6–10 semaines (Greg : https://greg.app/propagate-cherry-plum/).

Bouturage aoûté

Possible mais plus capricieux — les meilleurs résultats publiés sur P. cerasifera ('Myrobalan B' et apparentés) sont de 20–91 % d'enracinement avec auxine à 3 000–5 000 mg/L (Sci. Hortic. : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304423819310301) :

1. En hiver, bois dormant : boutures de 20 cm, entaille légère d'écorce sur un côté à la base.
2. Trempage rapide dans auxine forte (3 000–5 000 mg/L KIBA), plantation en châssis froid.
3. Enracinement étalé sur 4–6 mois, taux modéré à faible — multiplier les boutures.

Marcottage

Non documenté pour cette espèce ; pour l'ornemental pourpre, le greffage sur semis de myrobolan reste la référence pépinière.

Actinidia deliciosa et A. chinensis (Kiwi vert et jaune)

Espèce dioïque : pieds mâles et femelles séparés — la bouture/marcottage/greffe est la seule voie pour connaître le sexe d'avance ; par semis, il faut jusqu'à 7 ans de croissance avant de savoir.

Bouturage

LA méthode, herbacée de préférence :

1. Juin–juillet (vert) ou fin avril–mai selon région : prélever des boutures herbacées de 10–15 cm sur la pousse de l'année, coupées juste sous un nœud feuillé (Alabama Cooperative Extension : https://ssl.acesag.auburn.edu/department/peaches/kiwiprop.html ; UCANR Davis : https://ucanr.edu/sites/btfnp/fruitnutproduction/Kiwi/Kiwi_Propagation/).
2. Garder une feuille au sommet (réduite de moitié), retirer les autres ; les boutures herbacées enracinent plus uniformément que les aoûtées.
3. Tremper 5 s dans IBA liquide (essais sur 'Hayward' : 500 à 4 000 mg/L testés, ISHS Acta Hort. 282_31 : https://ishs.org/ishs-article/282_31/).
4. Milieu : perlite-vermiculite 1:1 ou tourbe-perlite, brumisation intermittente (5 s toutes les 5 min en journée), ombrière 50 %, 21–23 °C (Alabama Cooperative Extension : https://ssl.acesag.auburn.edu/department/peaches/kiwiprop.html).
5. Enracinement en 4–8 semaines ; repiquage en pots, puis en place quand la plante atteint ~1 m.

Bouturage aoûté

Possible aussi — le bois retiré à la taille d'hiver se bouture directement en terre ou sous châssis (OSU Extension : https://extension.oregonstate.edu/catalog/em-9322-growing-kiwifruit-your-home-garden).

Attention : le jaune A. chinensis est moins rustique que le vert ; jeunes pousses très sensibles aux gelées tardives (NCSU Extension : https://plants.ces.ncsu.edu/plants/actinidia-chinensis/). En Aude, le vert 'Hayward' reste le choix sûr ; le jaune exige un abri ou un mur bien exposé.

Marcottage

Très simple pour le jardinier :

1. Au printemps, coucher une pousse âgée d'un an et l'enterrer sur 10–15 cm (pointe hors sol), maintenir avec un crochet.
2. Laisser 6–8 mois, en gardant le sol frais ; séparer et replanter le nouveau pied raciné (Plantiary : https://plantiary.com/plant/actinidia-chinensis_3942.html).