

Tarea 9

Análisis Numérico

Kevin Omar Celis Flores

11 de mayo de 2026

Problema 1.

- a) Usando la regla del trapecio compuesta, para intervalo uniformemente espaciados, tenemos que

$$\begin{aligned} I = \int_0^1 f(x) dx &\approx 0.25 \left[\frac{1}{2} (f(0) + f(1)) + f(0.25) + f(0.5) + f(0.75) \right] \\ &= 0.25 \left[\frac{1}{2} (1 + 0.6703) + f(0.25) + 1.0148 + 1.0063 + 0.3819 \right] \\ &= 0.934538 \end{aligned}$$

Similarmente, usando la regla de Simpson 1/3 compuesta para $n = 4$ tenemos

$$\begin{aligned} I = \int_0^1 f(x) dx &\approx \frac{0.25}{3} \left[f(0) + 4f(0.25) + 2f(0.5) + 4f(0.75) + f(1) \right] \\ &= \frac{0.25}{3} \left[1 + (4 \times 1.0148) + (2 \times 1.0063) + (4 \times 0.8819) + 0.6703 \right] \\ &= 0.939142 \end{aligned}$$

- b) Estimaremos los errores con ayuda de wolfram mathematica. Sea $h = 0.25$ y $x_n = nh$ para $0 \leq n \leq 4$. Utilizaremos diferencias finitas centradas en los puntos interiores x_1, x_2 y x_3 y diferencias finitas hacia adelante y hacia atrás para los puntos x_0 y x_4 respectivamente. Una vez aproximados los valores para $f'(x_n)$, aproximaremos $f''(x)$ siguiendo la misma estrategia, y así sucesivamente para las demás derivadas de orden superior.

Tenemos entonces que

x	0	0.25	0.5	0.75	1
$f(x)$	1	1.0148	-1.0063	= 0.8819	0.6703
$f'(x)$	0.0592	0.0126	-0.2658	-0.672	-0.8464
$f''(x)$	-0.1864	-0.65	-1.3692	-1.1612	-0.6976
$f'''(x)$	-1.8544	-2.3656	-1.0224	1.3432	1.8544
$f^{(iv)}(x)$	-2.0448	1.664	7.4176	5.7536	2.0448

Hemos resaltado en naranja la segunda y cuarta derivada de valor absoluto más grande. Notemos que en este caso $b = 1$, $a = 0$ y $n = 4$. Entonces

$$|E_T| \approx \frac{1.3692}{12 \times 4^2}$$

$$|E_S| \approx \frac{7.4176}{180 \times 4^4}$$

$$\approx 0.00713125$$

$$\approx 0.000160972$$

- c) Dado el valor de referencia $I_{ref} = 0.92782$ primero redondeamos el valor aproximado de I obtenido con cada regla, al mismo número de cifras significativas que I_{ref} . Se tiene entonces

$$I_T = 0.93454 \quad \text{Regla del trapecio}$$

$$I_S = 0.93914 \quad \text{Regla del Simpson 1/3}$$

Los errores relativos porcentuales serán, respectivamente para la regla del trapecio y de Simpson

$$E_T = 0.72428 \%$$

$$E_S = 1.2206 \%$$

Vemos entonces, que para los datos dados, el método del trapecio resulta ser más eficaz que la regla de Simpson en este caso, al tener un error relativo menor. Esto contras con las aproximaciones para el error obtenidas en el inciso anterior, las cuales sugieren lo contrario. Una posible explicación para esto es que, al calcular hasta la cuarta derivada mediante diferencias finitas, en los puntos dados, los errores se acumulan, por lo que las cotas, en particular para la regla de Simpson, resultan no ser muy exactas.

Problema 2.

- a) Los pesos correspondientes son

$$w_0 = \int_a^b \frac{(x - \frac{a+b}{2})(x - b)}{(a - \frac{a+b}{2})(a - b)} dx$$

Tomando el cambio de variable $x = \frac{b-a}{2}t + \frac{a+b}{2}$, se tiene $dx = \frac{b-a}{2} dt$ y

$$\begin{aligned} w_0 &= \int_{-1}^1 \frac{(\frac{b-a}{2}t)(\frac{b-a}{2}t + \frac{a-b}{2})}{(\frac{a-b}{2})(a-b)} \frac{b-a}{2} dt \\ &= \frac{b-a}{4} \int_{-1}^1 \frac{(b-a)^2 t(t-1)}{(a-b)^2} dt \\ &= \frac{b-a}{4} \int_{-1}^1 (t^2 - t) dt \\ &= \frac{b-a}{4} \left[\frac{1}{3}t^3 - \frac{1}{2}t^2 \right]_{-1}^1 \\ &= \frac{b-a}{4} \times \frac{2}{3} \\ &= \frac{b-a}{6} \end{aligned}$$

$$w_1 = \int_a^b \frac{(x-a)(x-b)}{\left(\frac{a+b}{2}-a\right)\left(\frac{a+b}{2}-b\right)} dx$$

Tomando nuevamente el cambio de variable $x = \frac{b-a}{2}t + \frac{a+b}{2}$, se tiene:

$$\begin{aligned} w_1 &= \int_{-1}^1 \frac{\left(\frac{b-a}{2}t + \frac{b-a}{2}\right)\left(\frac{b-a}{2}t + \frac{a-b}{2}\right)}{\left(\frac{b-a}{2}\right)\left(\frac{a-b}{2}\right)} \frac{b-a}{2} dt \\ &= \frac{b-a}{2} \int_{-1}^1 (t+1)(-t+1) dt \\ &= \frac{b-a}{2} \int_{-1}^1 1-t^2 dt \\ &= \frac{b-a}{2} \left[t - \frac{1}{3}t^3 \right]_{-1}^1 \\ &= \frac{b-a}{2} \times \frac{4}{3} \\ &= \frac{4}{6}(b-a) \end{aligned}$$

Para el peso w_2 notemos que el polinomio cuadrático sobre el cual integramos es exactamente el mismo que para el peso w_1 pero trasladado $\frac{a+b}{2}$ unidades hacia la derecha, y ambos casos integramos sobre un intervalo de longitud $\frac{a+b}{2}$, por lo tanto

$$w_2 = w_1 = \frac{b-a}{6}$$