

[별표 7]

체모를 제거하는 데 도움을 주는 기능성화장품 각조 (제2조제7호 관련)

치오글리콜산 80 % Thioglycolic Acid 80 %

Mercaptoacetic acid 80%

티오글리콜산 80 %

$C_2H_4O_2S$: 92.12

이 원료는 정량할 때 치오글리콜산($C_2H_4O_2S$) 78.0 ~ 82.0 %를 함유한다.

성 상 이 원료는 특이한 냄새가 있는 무색 투명한 유동성 액체이다.

확인시험 이 원료 및 치오글리콜산표준품을 가지고 적외부스펙트럼측정법 중 액막법에 따라 측정할 때 같은 파수에서 같은 강도의 흡수를 나타낸다.

순도시험 1) **납** 이 원료 1.0 g을 달아 납시험법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 20.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

2) **비소** 이 원료 0.5 g을 달아 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다(4 ppm 이하).

정 량 법 이 원료 약 2.0 g을 정밀하게 달아 물을 넣어 50.0 mL로 한다. 이 액 10.0 mL를 취하여 250 mL 삼각플라스크에 넣고 물 75 mL를 넣은 다음 0.05 mol/L 요오드액으로 적정한다(지시약 : 전분시액). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

0.05 mol/L 요오드액 1 mL = 9.212 mg $C_2H_4O_2S$

저 장 법 기밀용기.

치오글리콜산 크림제 Thioglycolic Acid Cream

티오글리콜산 80% 크림

이 기능성화장품은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 치오글리콜산 ($C_2H_4O_2S$: 92.12)을 함유한다.

확인시험 이 기능성화장품 2.0 g을 달아 100 mL 비커에 넣어 녹이고 염산 5 mL를 넣은 다음 이 액 5 mL를 취하여 염화제이철 시액 3 ~ 4 방울을 넣을 때 청색을 나타낸다. 흔들어 주면 점차 색이 소실되며, 염화제이철시액 1 mL를 넣은 다음 수산화나트륨시액 5 ~ 6 방울을 넣을 때 황색 침전이 생긴다.

정량법 이 기능성화장품 약 5.0 g을 정밀하게 달아 250 mL 삼각플라스크에 넣고 열탕 50 mL를 넣은 다음 염산 10 mL를 넣고 흔들어 섞어 빙냉하고 다시 에텔 약 2 mL를 넣고 0.05 mol/L 요오드액으로 적정한다(지시약 : 전분시액). 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

$$0.05 \text{ mol/L 요오드액 } 1 \text{ mL} = 9.212 \text{ mg } C_2H_4O_2S$$

저장법 기밀용기