

Содержание

Векторные пространства	3
1 Векторное пространство. Подпространство. Линейная оболочка системы векторов. Линейно (не)зависимые системы векторов. Конечномерные линейные пространства	3
1.1 Векторное пространство	3
1.2 Подпространство	3
1.3 Линейная оболочка системы векторов	3
1.4 Линейно (не)зависимые системы векторов	3
1.5 Конечномерные линейные пространства	3
2 Базис и размерность конечномерного линейного пространства, корректность ее определения (лемма Штайница). Дополнение линейно независимой системы векторов до базиса. Координаты вектора в базисе, запись операций над векторами через координаты. Изменение координат вектора при замене базиса (матрица перехода)	4
2.1 Базис и размерность конечномерного линейного пространства, корректность ее определения (лемма Штайница)	4
2.2 Дополнение линейно независимой системы векторов до базиса	4
2.3 Координаты вектора в базисе, запись операций над векторами через координаты	4
2.4 Изменение координат вектора при замене базиса (матрица перехода)	4
3 Сумма и пересечение подпространств. Линейно независимые подпространства, прямая сумма подпространств, её характеристики, прямое дополнение подпространства, проекция на подпространство вдоль прямого дополнения. Связь размерностей суммы и пересечения подпространств (формула Грассмана). Понятие факторпространства, его базис и размерность	5
3.1 Сумма и пересечение подпространств	5
3.2 Линейно независимые подпространства, прямая сумма подпространств, её характеристики, прямое дополнение подпространства, проекция на подпространство вдоль прямого дополнения	5
3.3 Связь размерностей суммы и пересечения подпространств	6
3.4 Понятие факторпространства, его базис и размерность	6
4 Понятие аффинного пространства, связь между аффинным и векторным пространством	6
Линейные отображения	6
5 Линейные отображения и линейные преобразования векторных пространств (линейные операторы). Операции над линейными отображениями, линейное пространство линейных отображений. Алгебра линейных операторов. Изоморфизмы	7
5.1 Линейные отображения и линейные преобразования векторных пространств (линейные операторы)	7
5.2 Операции над линейными отображениями, линейное пространство линейных отображений	7
5.3 Алгебра линейных операторов	8
5.4 Изоморфизмы	8
6 Матрица линейного отображения. Координатная запись линейного отображения. Связь операций над матрицами и над линейными отображениями. Изменение матрицы линейного отображения (преобразования) при замене базиса	9
6.1 Матрица линейного отображения	9
6.2 Координатная запись линейного отображения	9
6.3 Связь операций над матрицами и над линейными отображениями	9
6.4 Изменение матрицы линейного отображения (преобразования) при замене базиса	9
7 Ядро и образ, их описание в терминах матрицы линейного отображения. Критерий инъективности. Связь между размерностями ядра и образа	10
7.1 Ядро и образ, их описание в терминах матрицы линейного отображения	10
7.2 Критерий инъективности	10
7.3 Связь между размерностями ядра и образа	10

8	Аффинные преобразования, их свойства. Аффинная группа	10
8.1	Аффинные преобразования, их свойства	10
8.2	Аффинная группа	10
	Структура линейного преобразования	11
9	Инвариантные подпространства. Ограничение оператора на инвариантное подпространство. Фактороператор	11
9.1	Инвариантные подпространства	11
9.2	Ограничение оператора на инвариантное подпространство	11
9.3	Фактороператор	12
10	Собственные векторы и собственные значения. Собственные подпространства. Характеристический многочлен и его инвариантность. Определитель и след преобразования	12
10.1	Собственные векторы и собственные значения	12
10.2	Собственные подпространства	12
10.3	Характеристический многочлен и его инвариантность	12
10.4	Определитель и след преобразования	13
11	Линейная независимость собственных подпространств, отвечающих различным собственным значениям. Алгебраическая и геометрическая кратность собственного значения. Критерий диагонализруемости преобразования	13
11.1	Линейная независимость собственных подпространств, отвечающих различным собственным значениям	13
11.2	Алгебраическая и геометрическая кратность собственного значения	13
11.3	Критерий диагонализруемости преобразования	14
12	Инвариантные подпространства малой размерности в вещественном случае	14
13	Треугольный вид матрицы преобразования. Теорема Гамильтона-Кэли	14
13.1	Треугольный вид матрицы преобразования	14
13.2	Теорема Гамильтона-Кэли	15
14	Корневые подпространства, их размерность. Разложение пространства в прямую сумму корневых. Жорданова нормальная форма, её существование и единственность. Минимальный многочлен, критерий диагонализруемости оператора в терминах минимального многочлена	15
14.1	Корневые подпространства, их размерность	15
14.2	Разложение пространства в прямую сумму корневых	15
14.3	Жорданова нормальная форма, её существование и единственность	16
14.4	Минимальный многочлен, критерий диагонализруемости оператора в терминах минимального многочлена	17
	Билинейные формы	17
15	Билинейные (полуторалинейные) формы (функции). Координатная запись билинейной формы. Матрица билинейной формы и её изменение при замене базиса	17
15.1	Билинейные (полуторалинейные) формы (функции)	17
15.2	Координатная запись билинейной формы	18
15.3	Матрица билинейной формы и её изменение при замене базиса	18
16	Симметричные билинейные (полуторалинейные) формы. Взаимно-однозначное соответствие с квадратичными (эрмитовыми) формами	18
16.1	Симметричные билинейные (полуторалинейные) формы	18
16.2	Взаимно-однозначное соответствие с квадратичными (эрмитовыми) формами	18
17	Ядро билинейной функции. Ортогональное дополнение подпространства. Ограничение билинейной функции на подпространство. Критерий невырожденности подпространства. Существование нормального вида билинейной симметричной формы над полями \mathbb{R} и \mathbb{C}	19
17.1	Ядро билинейной функции	19

18 Алгоритмы приведения квадратичной формы к нормальному виду (метод Лагранжа и сдвоенных элементарных преобразований матрицы)	19
19 Закон инерции квадратичной (эрмитовой) формы. Положительный и отрицательный индексы инерции, их геометрическая характеристика. Критерий Сильвестра	19
19.1 Закон инерции квадратичной (эрмитовой) формы	19
19.2 Критерий Сильвестра	20
20 Кососимметричные билинейные функции, приведение их к нормальному виду	20
Пространства со скалярным произведением	20
21 Евклидовы и унитарные пространства. Матрица Грама и её свойства. Неравенство Коши – Буняковского – Шварца, неравенство треугольника. Метрика. Выражение скалярного произведения в координатах	20
21.1 Евклидовы и унитарные пространства	20
21.2 Матрица Грама и её свойства	21
21.3 Неравенство Коши – Буняковского – Шварца, неравенство треугольника	21
21.4 Метрика	21
21.5 Выражение скалярного произведения в координатах	21

Векторные пространства

1 Векторное пространство. Подпространство. Линейная оболочка системы векторов. Линейно (не)зависимые системы векторов. Конечномерные линейные пространства

1.1 Векторное пространство

Опр Унарная, бинарная операция на множестве над полем Ставит в соответствие элементу (элементам) из множества другой элемент из множества

Опр Векторное пространство над полем Помимо унарности и бинарности, по 4 аксиомы сложения и умножения

1.2 Подпространство

Опр Подпространство Требуются лишь унарность и бинарность

1.3 Линейная оболочка системы векторов

Опр Линейная оболочка Все векторы, которые линейно выражаются через минимальную систему, покрывающую пространство

1.4 Линейно (не)зависимые системы векторов

Опр Линейная комбинация Сумма векторов с коэффициентами из поля

Опр Линейно (не)зависимая система векторов Нетривиальная линейная комбинация (не) равна нулю

1.5 Конечномерные линейные пространства

Опр Ранг (не)пустой системы векторов Любой набор векторов, чьё число больше чем ранг, будет линейно зависим. Ранг пустой считаем нулевым

Опр Размерность Более употребительное название для ранга в случае работы с подпространством

Опр (Бес)конечномерные линейные пространства Если их размерность (бес)конечна

Л1 Любой вектор системы векторов ранга r раскладывается по r л.н.з векторам

1. Возьмём вектора из линейной оболочки и добавим к ним произвольный вектор системы a . Эта система будет л.з. из определения ранга
2. Тогда найдутся коэффициента для нетривиальной линейной комбинации, притом коэффициент перед $\lambda_a \neq 0$ (иначе линейная оболочка была бы зависима)
3. Из линейной комбинации выразим a , поделив все вектора на λ_a

Л2 Если вектор b принадлежит линейной оболочке a_1, \dots, a_k других векторов, то он не влияет на её ранг

1. От противного: пусть \exists л.н.з система из $r+1$ векторов (она будет содержать b , иначе w с определением ранга)
2. Итак, пусть система b, a_1, \dots, a_r л.н.з. Тогда система a_1, \dots, a_r тоже будет л.н.з. Так их r штук, то все вектора a_1, \dots, a_k будут выражаться через a_1, \dots, a_r
3. Если мы заменим a_1, \dots, a_k на их выражения через a_1, \dots, a_r , то получится, что b выражается по ним, что w л.н.з b, a_1, \dots, a_r

Th Основная теорема о рангах Ранг подсистемы и системы совпадает $\Leftrightarrow \forall$ вектор системы раскладывается по линейной оболочке подсистемы

\Rightarrow : мгновенно следует из Л1 В моей формулировке

\Leftarrow :

1. От противного: пусть \exists л.н.з система из $r+1$ векторов
2. Её ранг будет не меньше ранга её и любого количества л.н.з векторов из подсистемы

3. С другой стороны, многократно применяя Л2, получим что её ранг не превышает ранга подсистемы, w

Следствие 1 Для любой подсистемы векторного пространства ранг равен размерности линейной оболочки

Следствие 2 Если размерности вложенных подпространств совпадают, то они равны

2 Базис и размерность конечномерного линейного пространства, корректность ее определения (лемма Штайница). Дополнение линейно независимой системы векторов до базиса. Координаты вектора в базисе, запись операций над векторами через координаты. Изменение координат вектора при замене базиса (матрица перехода)

2.1 Базис и размерность конечномерного линейного пространства, корректность ее определения (лемма Штайница)

Опр Базис Система л.н.з векторов, являющаяся линейной оболочкой

Лемма Штайница Пусть система векторов a_1, \dots, a_n порождает пространство V , а система векторов b_1, \dots, b_m л.н.з. Тогда $n \geq m$

1. Возьмём b_1 . Он будет выражаться через a_1, \dots, a_n по определению линейной оболочки. БОО первый коэффициент в его разложении по a_1, \dots, a_n ненулевой (иначе мы их переупорядочим)
2. Выразим из этого разложения a_1 . Тогда $V = \langle b_1, a_2, \dots, a_n \rangle$. Так, действуя по индукции, заменим все вектора a_i
3. В случае $n < m$ получим противоречие с л.н.з. b_1, \dots, b_m (потому что всего n векторов порождают пространство). Таким образом $n \geq m$, притом недостающие до линейно оболочки вектора можно взять из a_1, \dots, a_n

2.2 Дополнение линейно независимой системы векторов до базиса

Утв Систему л.н.з векторов можно дополнить до базиса

1. Ранг подсистемы меньше ранга системы, поэтому выполняется обратное к основной теореме о рангах утверждение ($\exists \bar{x}$, не лежащей в л.н.з подсистеме)
2. Если мы добавим \bar{x} к подсистеме и она станет зависимой, то в нетривиальной линейной комбинации равен нулю либо новый коэффициент (w с л.н.з исходной подсистемы), либо какой-то из старых (тогда \bar{x} выражается через векторы линейной оболочки и принадлежит ей)
3. Продолжая процесс и далее, дополним систему до базиса

2.3 Координаты вектора в базисе, запись операций над векторами через координаты

Опр Координаты вектора в базисе Коэффициенты в разложении по базису

При сложении векторов и домножении на число, координаты изменяются покомпонентно

2.4 Изменение координат вектора при замене базиса (матрица перехода)

Опр Матрица перехода Матрица координатных столбцов новых базисных векторов относительно старых

Th S чья-то матрица перехода $\Leftrightarrow S$ невырождена

Это следует из того, что координатные столбцы X_k векторов a_k линейно независимы $\Leftrightarrow a_k$ л.н.з. ($\lambda^k a_k = 0 \Leftrightarrow \lambda^k X_k = 0$). Поэтому столбцы матрица невырождена (её столбцы л.н.з.) \Leftrightarrow векторы л.н.з.

Th Если вектор имеет в базисах e, e' координатные столбцы X, X' , то $X = SX'$

Достаточно расписать один вектор в обоих базисах и сравнить записи

Утв Если $\exists e, e', e''; e' = eC, e'' = e'D$, то $e'' = eCD$

Последовательно подставляем матрицы перехода

3 Сумма и пересечение подпространств. Линейно независимые подпространства, прямая сумма подпространств, её характеристики, прямое дополнение подпространства, проекция на подпространство вдоль прямого дополнения. Связь размерностей суммы и пересечения подпространств (формула Грассмана). Понятие факторпространства, его базис и размерность

3.1 Сумма и пересечение подпространств

Опр Пересечение подпространств Множество элементов, которые являются их обычным теоретико-множественным пересечением как подмножеств

Опр Сумма подмножеств по Минковскому Множество-сумма векторов всех векторов a_i из каждого $A_i \subset V$, то есть каждый вектор из суммы раскладывается по векторам из всех пространств

Для суммы Минковского выполняется коммутативность и ассоциативность

Утв Сумма линейных оболочек есть линейная оболочка объединения

Каждый элемент суммы есть линейная оболочка какого-то подпространства, поэтому если мы сложим все линейные оболочки по Минковскому, то получим линейную оболочку объединения (совокупности)

Следствие Сумма конечного числа подпространств есть подпространство

Потому как сумма есть минимальное по включению подпространство, содержащее в себе каждое из пространств

Утв Размерность суммы не превосходит суммы размерностей

Это следует из того, что размерность равна рангу, а для рангов ранг объединения не превосходит суммы рангов (доказывается от противного)

3.2 Линейно независимые подпространства, прямая сумма подпространств, её характеристики, прямое дополнение подпространства, проекция на подпространство вдоль прямого дополнения

Опр Прямая (внешняя) сумма Декартово произведение (a_1, \dots, a_n)

Сложение и умножение на скаляр определены для внешней суммы покомпонентно

Опр Прямая (внутренняя) сумма Сумма, вектора a_i в разложении которой из каждого $A_i \subset V$ определены однозначно

Например, всё пространство разлагается в прямую сумму своих базисных векторов

Через \overline{U}_i обозначим сумму всех рассматриваемых пространств, за исключением $U_i : U_1 + \dots + U_{i-1} + U_{i+1} + U_n$

Th.1 Первый критерий прямой суммы

Сумма подпространств прямая $\Leftrightarrow U_i \cap \overline{U}_i$

- \Rightarrow : от противного. Пусть БОО условие не выполнено для U_1 . Тогда там есть нулевой вектор, который принадлежит U_i и раскладывается по остальным пространствам. Тогда у нас существует два представления нулевого вектора (одно тривиальное, другое новое), w с прямостью суммы
- \Rightarrow : от противного. Пусть существует два различных разложения v по a_i и b_i . БОО хотя бы $a_1 \neq b_1$, поэтому если возьмём их разность, то с одной стороны она $\in U_1$, а с другой —
- $\in \overline{U}_1$, то есть пересечение не тривиально, w

Th.2 Второй критерий прямой суммы

Для конечномерных подпространств следующие условия эквивалентны:

1. Сумма $U = \oplus U_i$ прямая
2. Система из $\sum_i \dim U_i$ векторов из объединения базисов есть базис в U
3. $\dim U = \sum_i n_i$

- $2 \Leftrightarrow 3$: по следствию основной теоремы о рангах $\dim U = \text{рге} = \text{рг} \cup_i e^i$, поэтому

$$\dim U = \sum_i \dim U_i \Leftrightarrow \text{рге} = \sum_i \dim U_i \Leftrightarrow e$$

- $1 \Rightarrow 2$: от противного. Пусть e л.н.з система. Запишем нетривиальную линейную комбинацию всей суммы. Так как хотя бы одна компонента нетривиальная, то БОО $l_1 \neq 0$. Тогда эта комбинация одновременно принадлежит и U_1 , и $\overline{U_1}$, по той же идее, что и в Th.1, это w
- $2 \Rightarrow 1$: от противного. По обратной идее предыдущего пункта воспользуемся Th.1, получим ненулевое пересечение, распишем вектор оттуда (нетривиальная л.к.) и получим w с л.н.з e

Опр *Прямое дополнение подпространства* Недостающий член в прямой сумме до всего пространства V

В случае двух подпространств, они входят в определение симметрично

Утв Сумма размерностей подпространства и любого его прямого дополнения равна размерности всего пространства V

Утв У любого подпространства конечномерного пространства V существует прямое дополнение

Для нахождения дополнения достаточно выбрать базис в подпространстве и дополнить его до базиса в пространстве. Тогда по Th.2 эта система и будет прямым дополнением

Если $a = a_1 + a_2$, то a_1 называется проекцией a на U_1 вдоль (параллельно) U_2

3.3 Связь размерностей суммы и пересечения подпространств

Смотреть в рукописном конспекте

3.4 Понятие факторпространства, его базис и размерность

Опр *Факторпространство* Фактор-множество (множество всех классов эквивалентности для заданного отношения эквивалентности) $a \sim b \Leftrightarrow b - a \in U$

Элементы факторпространства есть смежные классы вида $a + U$

$$(a + U) + (b + U) = (a + b) + U$$

$$\lambda(a + U) = \lambda a + U$$

Если W - прямое дополнение U , то существует естественный изоморфизм $W \rightarrow V/U (a \mapsto a + U)$. Он является ограничением на W линейного отображения $\pi : V \rightarrow V/U, \pi(v) = v + U$ и называется канонической проекцией. Действительно, из определения прямого дополнения следует единственность $u \in U : v = u + w$. Применим π и получим $v + U = w + U$, что влечёт биективность π

Отсюда следует, что дополнение произвольного базиса в U до базиса в V после применения к ней π будет базисом в V/U , притом $\dim V/U = \dim V - \dim U$, что следует из теоремы о сумме размерностей ядра и образа

4 Понятие аффинного пространства, связь между аффинным и векторным пространством

Опр *Аффинное пространство* Отображение из точек-векторов в точки (откладывание от точки векторы)

Аффинное пространство удовлетворяет трём аксиомам (ассоциативность, существование нуля и единственность " дополнения"). Также справедливо "правило треугольника"

Th *О замене координат*

Если существует две ДСК и S – матрица перехода от старой к новой, γ – координатный столбец начала координат новой системы в старой, то справедливо $X = SX' + \gamma$

Достаточно рассмотреть произвольный вектор как сумму сдвигов в ноль и в точку, перейти к базису и координатным столбцам, вспомнить определение матрицы перехода и сократить базис

Линейные отображения

5 Линейные отображения и линейные преобразования векторных пространств (линейные операторы). Операции над линейными отображениями, линейное пространство линейных отображений. Алгебра линейных операторов. Изоморфизмы

5.1 Линейные отображения и линейные преобразования векторных пространств (линейные операторы)

Опр Линейное отображение Отображение, удовлетворяющее двум аксиомам

Отсюда следуют конечная линейность, отображение нулевого и противоположного вектора

Множество всех линейных отображений обозначается как $L(V, W)$. В случае $W = V$ линейное отображение называют линейным преобразованием (оператором)

Опр Линейная функция (функционал) Случай $\dim W = 1 (W = \mathbb{K})$

Утв Под действием линейного отображения л.з система остаётся л.з

Достаточно записать нетривиальную линейную комбинацию и взять её образ, используя уже известные аксиомы

Утв Ранг системы под действием линейного отображения не возрастает

Это следует из определения ранга и противного к предыдущему утверждению. В силу равенства ранга и размерности в конечномерном случае, получаем аналогичное неравенство для размерностей

Утв Образ подпространства

Образ линейной оболочки есть линейная оболочка образов

Действительно, если записать определение линейной оболочки (множество всех линейных комбинаций) и подействовать отображением, то получится требуемое. В частном случае, если взять базис (его линейная оболочка есть всё пространство), то образ пространства есть линейная оболочка образов базисных векторов

Опр Линейное вложение Инъективное линейное отображение

Утв В случае линейного вложения л.н.з. система остаётся л.н.з.

Действительно, если записать л.к. образов и "вынести φ за скобки", то в силу инъективности получим, л.к. исходных векторов. В силу её линейной независимости, эта л.к. тривиальна, как и л.к. образов. В частном случае, если взять базис, то получим равенства рангов U и $\varphi(U)$, как и размерностей

Th Если взять базис e_i в V и произвольные векторы c_i в W , то $\exists! \varphi : \varphi(e_i) = c_i$. Дополнительно, φ инъективно c_i л.н.з.

1. Для начала докажем единственность. Зафиксируем произвольный вектор a пространства, разложим его по базису и рассмотрим $\varphi(a)$, имеющего единственные коэффициенты. В силу произвольности a теорема справедлива
2. Для доказательства существования, достаточно взять два произвольных вектора из пространства, подействовать на них отображением (с учётом $\varphi(e_i) = c_i$), затем проверить аксиомы линейного отображения
3. \Rightarrow : следует из предыдущего утверждения
4. \Leftarrow : от противного, с использованием определения инъективности, разложения $a - b$ по базису и $\varphi(e_i) = c_i$

5.2 Операции над линейными отображениями, линейное пространство линейных отображений

Опр Сумма отображений Такое отображение, что ...

Опр Произведение отображения на скаляр Такое отображение, что ...

В комплексном случае скаляр заменяется на комплексно-сопряжённый.

Нетрудно проверить, что оба нововведённых отображения линейны. Также проверкой доказывается ассоциативность, дистрибутивность и линейность в случае композиции отображений

5.3 Алгебра линейных операторов

Так как на множестве $L(V, V)$ определены операции сложения, умножения на скаляр и умножения, то $L(V, V)$ имеет структуру ассоциативной алгебры (непустое множество (носитель) с заданным на нём набором операций и отношений (сигнатурой)). Ассоциативная потому как заданы операции ассоциативного умножения, то есть $\forall k, l \in \mathbb{F}$ и $\forall a, b, c \in A$ справедливо

1. $a(b + c) = ab + ac$
2. $(a + b)c = ac + bc$
3. $(k + l)a = ka + la$
4. $k(a + b) = ka + kb$
5. $k(la) = (kl)a$
6. $k(ab) = (ka)b = a(kb)$
7. $1a = a$, где 1 – единица кольца \mathbb{K}

Опр *Аннулирующий многочлен для оператора* $P(\varphi) = 0$

Опр *Минимальный многочлен* Аннулирующий многочлен с минимальной степенью

Утв Пусть μ – минимальный многочлен оператора φ , а $P \in \mathbb{F}$ – произвольный. Тогда P аннулирует $\varphi \Leftrightarrow f: \mu$ в кольце многочленов над \mathbb{F}

1. Разделим P на μ с остатком и подставим в полученное равенство φ
2. Воспользуемся условием и получим $P(\varphi) = 0 \Leftrightarrow r(\varphi) = 0$
3. В таком случае остаток должен быть аннулирующим для φ , то есть его степень меньше степени минимального многочлена, поэтому w не возникает только в случае $r \equiv 0$
4. Таким образом, эквивалентность доказана

Отсюда следует, что минимальный многочлен единственен с точностью до умножения на константу

5.4 Изоморфизмы

Опр *Изоморфизм* Линейное биективное отображение

Опр *Изоморфные векторные пространства* Между ними существует изоморфизм

Утв *Обратный к изоморфизму изоморфизм*

1. Биективность следует из тождеств для обратных функций
2. Далее берутся векторы из образа и на них проверяются аксиомы линейного отображения
3. Итого, обратный к изоморфизму изоморфизм по определению

Th *Классификация конечномерных векторных пространств*

Пространства изоморфны \Rightarrow их размерности совпадают

1. \Rightarrow : из изоморфности следует инъективность, а для инъективных отображений равенство доказано ранее
2. \Leftarrow : построим изоморфизм между элементами каждого пространства и их координатными столбцами в них по фиксированному базису. Ранее было доказано, что такое разложение единственно. Достаточно обратить какое-то из отображений (по предыдущему утверждению оно тоже будет изоморфизмом). Итого, мы получили композицию изоморфизмов, то есть изоморфизм

Th Если конечномерные пространства $U, V : \dim U = \dim V; e_i$ – базис в U , $\varphi \in L(U, V)$. Тогда следующие условия эквивалентны:

1. φ – изоморфизм
2. φ инъективен
3. φ сюръективен

4. $\varphi(e_i)$ есть базис в V

- $1 \Rightarrow 2$: по определению
- $2 \Rightarrow 3$: из инъективности следует $\dim(\varphi(U)) = \dim U \rightarrow \varphi(V) \cong U \rightarrow \varphi$ сюръективно
- $3 \Rightarrow 4$: это следует из свойства линейной оболочки образов базисных векторов, связи размерности и ранга, определения ранга и базиса
- $4 \Rightarrow 1$: по критерию инъективности, в силу л.н.з. $\varphi(e_i)$, φ будет инъективно, а из свойства линейной оболочки следует сюръективность φ

6 Матрица линейного отображения. Координатная запись линейного отображения. Связь операций над матрицами и над линейными отображениями. Изменение матрицы линейного отображения (преобразования) при замене базиса

6.1 Матрица линейного отображения

Опр Матрица линейного отображения Как и в обычном случае, координатные столбцы векторов $\varphi(e_i)$

Таким образом, существует биекция между $L(V, W)$ и $Mat(m, n)$, как и изоморфизм (проверяется). Отсюда следует, что размерность линейных операторов есть mn

6.2 Координатная запись линейного отображения

Th Если $\varphi \leftrightarrow A; a = eX, \varphi(a) = fY$, то $y = Ax$

Для доказательства достаточно записать определение координатного столбца, применить к ней φ и в силу коммутативности, поменять местами строки и столбцы, чтобы увидеть запись матричного умножения, что доказывает равенство

Следствие Если дано неизвестно в плане линейности отображение φ , такое, что под его действием $y = Ax$, то оно линейное

В силу наличия биекции между матрица и линейными отображениями, найдём такое ϕ . В таком случае по Th., они будут иметь одинаковую координатную запись $y = Ax$, то есть равны и φ линейно

Th Если линейное преобразование φ таково, что $\varphi(e_i) = e'_i$, то $A : A \leftrightarrow \varphi$ есть матрица перехода между базисами

Следует из определений (матрица линейного преобразования будет удовлетворять определению матрицы перехода)

6.3 Связь операций над матрицами и над линейными отображениями

Утв Композиции линейных отображений соответствует произведение соответствующих матриц

Доказывается по определению (подстановкой)

Следствие Обратному отображению соответствует обратная матрица

Следует из предыдущего утверждения и того, что тождественному отображению соответствует единичная матрица

Следствие $P(\varphi) \leftrightarrow P(A)$

Следствие $\varphi \leftrightarrow A$ задаёт изоморфизм алгебр линейных преобразований и квадратных матриц

То есть изоморфизм группы биективных линейных преобразований и группы невырожденных матриц

6.4 Изменение матрицы линейного отображения (преобразования) при замене базиса

Th Если $L(V, W); S : e' = eS; y = Ax, y' = Ax'; f' = fR$, то $A' = R^{-1}AS$ (матрица линейного отображения в другом базисе)

Доказывается путём подстановок и комбинаций равенств

В частном случае $L(V, V)A' = S^{-1}AS$

Следствие Ранг матрицы линейного отображения не зависит от выбора базисов в пространствах

Потому что мы домножаем слева и справа на невырожденные матрицы

7 Ядро и образ, их описание в терминах матрицы линейного отображения. Критерий инъективности. Связь между размерностями ядра и образа

7.1 Ядро и образ, их описание в терминах матрицы линейного отображения

Опр Образ линейного отображения Множество всех векторов V под действием $\varphi \in L(V, W)$

Th Координатное описание образа

Если $\varphi \in L(V, W)$, а $b \in W : b = fY$, то $b \in \text{Im } \varphi \Leftrightarrow Y \in \langle a_1, \dots, a_n \rangle$

Это следует из записи образа через линейную оболочку действия φ на базисные векторы, определения матрицы линейного отображения и того факта, что $b = fY$ есть л.к. столбцов Y

Отсюда также следует, что размерность образа равна рангу матрицы линейного отображения

Утв В случае $\varphi \in L(V, W)$ прообразы образов в подмножестве W являются подмножеством V

Опр Ядро линейного отображения Множество всех векторов V , которые зануляются под действием $\varphi \in L(V, W)$

То есть ядро есть подмножество V . Также ядро можно охарактеризовать как полный прообраз нулевого пространства

Если ядро пусто, то оператор невырожден

Th Координатное описание ядра

Если $\varphi \in L(V, W)$, а $a \in V : a = eX$, то $a \in \text{Ker } \varphi \Leftrightarrow AX = 0$

В обе стороны по определению ядра

Другими словами, в терминах координатных столбцов ядро задается как общее решение однородной СЛУ $Ax = 0$

Следствие $\dim \text{Ker } \varphi = n - \text{rg } A$

7.2 Критерий инъективности

Th Критерий инъективности

Если $\varphi \in L(V, W)$, инъективно $\Leftrightarrow \text{Ker } \varphi = 0$

\Rightarrow : пользуемся $\varphi(0) = 0 \Leftarrow$: от противного с использованием определения инъективности

7.3 Связь между размерностями ядра и образа

Th В конечномерных пространствах $\dim \text{Ker } \varphi + \dim \text{Im } \varphi = n$

Следует из $\dim \text{Im } \varphi = \text{rg } A$ и $\dim \text{Ker } \varphi = n - \text{rg } A$

8 Аффинные преобразования, их свойства. Аффинная группа

8.1 Аффинные преобразования, их свойства

Опр Аффинно-линейное преобразование

Опр Дифференциал отображения Обозначение элемента $\varphi \in L(V, V)$

Опр Аффинное преобразование Биективное преобразование

Утв Преобразование аффинно \Leftrightarrow его дифференциал биективен

Для доказательства достаточно воспользоваться определением при одной фиксированной точке в нём

Утв Композиция линейных и аффинных преобразований линейна и аффинна соответственно, а их дифференциал есть произведение дифференциалов

Следует из определения и того, что композиция биективных отображений биективна

Утв Обратное к аффинному отображению отображение аффинно

Следует из определения

8.2 Аффинная группа

Аффинные преобразования образуют группу относительно композиции

Утв $Y = AX + C$

Для доказательства достаточно взять в определении аффинно-линейного преобразования точку $M = 0$

Отсюда следует, что любое аффинное преобразование задаётся параллельным переносом и поворотом вокруг неподвижной точки, то есть линейное преобразование однозначно задаётся точкой и двумя векторами

Th Линейное преобразование f аффинно \Leftrightarrow переводит неколлинеарные точки в неколлинеарные

Построим ДСК на наших трёх точках, подействуем на них преобразование и получим новую ДСК. f однозначно задано этой ДСК. Поэтому f аффинно $\Leftrightarrow f$ биективно \Leftrightarrow неколлинеарная система (л.н.з) переходит в неколлинеарную (в частности, система три точки)

Th Связь аффинного преобразования с заменой координат

При аффинном преобразовании координатный столбец вектора не меняется

Достаточно воспользоваться координатной записью вектора, а потом к концевым точкам применить аффинное преобразование

Th При аффинном преобразовании

1. прямая переходит в прямую
 2. параллельные прямые переходят в параллельные
 3. отношения длин отрезков сохраняются
 4. центральная симметрия сохраняется
1. достаточно параметризовать прямую и применить определение к концевым точкам
 2. аналогичным образом в силу линейности (из определения) сохраняются отношения (длин отрезков и расстояния между прямыми)
 3. отношения длин отрезков сохраняются
 4. при центральной симметрии для любых двух симметричных точек центр есть середина соответствующего отрезка, а так как отношения сохраняются, то получаем сохранение определения

Th Изменение площадей

При аффинном преобразовании, чей дифференциал имеет матрицу A , площадь фигуры умножается на $|\det A|$

Покажем на примере параллелограмма. Достаточно расписать определение ориентированной площади, применить преобразование и взять модуль (настоящая площадь неотрицательна)

Th При аффинном преобразовании порядок алгебраической кривой не меняется

Так как при аффинном преобразовании координаты не меняются, то не поменяется и многочлен, задающий кривую (скалярное произведение коэффициентов на переменные), как и его порядок

Структура линейного преобразования

9 Инвариантные подпространства. Ограничение оператора на инвариантное подпространство. Фактороператор

9.1 Инвариантные подпространства

Опр Инвариантное подпространство Образ лежит в нём же

Утв Сумма и пересечение инвариантных подпространств инвариантно

Доказывается поэлементной проверкой определения

Утв В случае коммутирующих преобразований ядро и образ одного инвариантно относительно другого Доказывается по определению

Следствие Ядро и образ многочлена $f(\varphi)$ инвариантны относительно $\varphi \in L(V, V)$

Утв U инвариантно относительно $\varphi \Leftrightarrow U$ инвариантно относительно $\varphi - \lambda, \lambda \in \mathbb{F}$

Доказывается проверкой в одну сторону и путём взятия другой λ в обратную

Таким образом, в случае $\text{Im}(\varphi - \lambda) \subset U \rightarrow U$ инвариантно φ

9.2 Ограничение оператора на инвариантное подпространство

Утв Если U инвариантно относительно φ – изоморфизма, то U инвариантно относительно φ^{-1}

Достаточно рассмотреть сужение φ на U . В силу инъективности это будет изоморфизм. Тогда обра- щаем его и получаем требуемое

Утв Если U_k инвариантно относительно линейное оболочки первых k векторов $\Leftrightarrow a_{ij} = 0, i \in \overline{k+1, n}, j \in \overline{1, k}$, то есть матрица имеет блочно-диагональный вид, где второй квадрант есть сужение φ на U_k

Достаточно воспользоваться определением матрицы линейного преобразования и вспомнить, что у нас базис не меняется

Утв Если $\varphi \in L(V, V)$, а $P(\varphi)$, $\deg P = k$ вырожден, то существует не более чем k -мерное инвариантное подпространство V относительно φ

1. Возьмём произвольный элемент ядра a и покажем, что $U = \langle a, \varphi(a), \dots, \varphi^{k-1}(a) \rangle$ инвариантно относительно φ
2. В силу индуктивности φ^j , достаточно доказать лишь что $\varphi^k(a) \in U$
3. Подставляем $\varphi(a)$ в многочлен и получаем, что $\varphi^k(a)$ линейно выражается через остальные члены, что доказывает инвариантность и утверждение

9.3 Фактороператор

Опр Фактороператор Линейный оператор, определённый формулой $(v + U) = \varphi(v) + U, \forall v \in V$

10 Собственные векторы и собственные значения. Собственные подпространства. Характеристический многочлен и его инвариантность. Определитель и след преобразования

10.1 Собственные векторы и собственные значения

Опр Собственное значение Существует $a \in V$:

Опр Собственный значение Ненулевой вектор a преобразования ...

Утв Ненулевой вектор a собственный для $\varphi \Leftrightarrow \langle a \rangle$ инвариантна относительно φ

В силу эквивалентности инвариантности наличию собственного значения

Утв Ненулевой вектор a собственный для φ с собственным значением $\lambda \Leftrightarrow a \in \ker(\varphi - \lambda)$

Достаточно вспомнить определение ядра

10.2 Собственные подпространства

Опр Собственное подпространство Ядро $\ker(\varphi - \lambda)$, содержащее ...

Утв Сумма подпространств V_{λ_i} прямая

1. От противного: возьмём $a_1 \in V_{\lambda_1} \cap \sum_i V_{\lambda_i}$, то есть $a_1 = \sum_i a_i$
2. Применим к этому равенству преобразование $\Pi_2^k(\varphi - \lambda_k)$
3. Справа у нас получится ноль, а слева – нет, w

10.3 Характеристический многочлен и его инвариантность

Опр Характеристический многочлен Функция от константы. Не забыть про обозначение

Опр Характеристическое уравнение Равенства многочлена нулю

Опр Характеристические числа Корни характеристического многочлена

Характеристический многочлен можно записать и с учётом алгебраической кратности его корней

Утв Характеристический многочлен имеет вид $(-1)^n \lambda^n + (-1)^{n-1} \text{tr} A + \dots + |A|$

Достаточно знать, что определитель есть функция от всех элементов матрицы, затем просто расписать коэффициенты перед требуемыми степенями

Отсюда, в соответствии с теоремой Виета, сумма всех характеристических чисел равна следу, а произведение есть $\det A$

Стоит учесть, что данное утверждения верно лишь в \mathbb{C} . В \mathbb{R} собственные значения есть только вещественные характеристические числа

10.4 Определитель и след преобразования

Утв Если матрица оператора верхнетреугольна, то характеристические числа характеристического многочлена совпадают с диагональными элементами

Верно в силу того, что определитель верхнетреугольной матрицы равен произведению диагональных элементов

Th Инвариантность характеристического многочлена

Характеристический многочлен не зависит от выбора базиса

Достаточно записать характеристическое уравнение в двух базисах, перейти от одного к другому с помощью матрицы перехода и преобразовать выражение

Следствие Определитель, след, набор характеристических чисел матрицы оператора не зависят от выбора базиса

Все вышеперечисленные термины выражаются через коэффициенты характеристического многочлена

11 Линейная независимость собственных подпространств, отвечающих различным собственным значениям. Алгебраическая и геометрическая кратность собственного значения. Критерий диагонализированности преобразования

11.1 Линейная независимость собственных подпространств, отвечающих различным собственным значениям

Th λ – собственное значение $\Leftrightarrow \lambda$ характеристическое число

1. λ – собственное значение $\Leftrightarrow \ker(\varphi - \lambda) \neq O$
2. \Leftrightarrow соответствующая СЛУ имеет нетривиальное решение
3. \Leftrightarrow соответствующая квадратная матрица вырождена
4. \Leftrightarrow соответствующий определитель равен нулю
5. $\Leftrightarrow \lambda$ характеристическое число

Th Собственные векторы различных собственных значений л.н.з.

1. Доказывается по индукции. База очевидна
2. Докажем переход. Для этого рассмотрим $k + 1$ собственный вектор, из которых k заведомо л.н.з
3. Применим к их л.к. φ . Из неё вычтем правильную л.к. первых k векторов (чтобы обнулить α_{k+1})
4. Итого, k коэффициентов нули, а значит, и $k + 1$ -й тоже, то есть система осталась л.н.з.

11.2 Алгебраическая и геометрическая кратность собственного значения

Опр Геометрическая кратность Размерность собственного подпространства

Th Геометрическая кратность не превосходит алгебраическую

1. Рассмотрим собственное пространство размерности s и произвольный базис в нём. Дополним его до базиса во всём пространстве
2. Запишем матрицу линейного оператора. Она будет иметь блочно-диагональный вид
3. Вычислим характеристический многочлен этой матрицы и непосредственно убедимся в доказанном утверждении (потому как в оставшемся многочлене собственное значение может быть корнем; в противном случае достигается равенство)

11.3 Критерий диагонализуемости преобразования

Опр *Диагонализуемое преобразование* Существует базис, в котором матрица имеет диагональный вид

Th *Первый критерий диагонализуемости*

Если $\varphi \in L(V, V)$ имеет попарно различные собственные значения λ_i кратностей s_i , то следующие условия эквивалентны:

1. φ диагонализуем
 2. В пространстве существует базис из собственных векторов
 3. $\dim V_{\lambda_i} = s_i$
 4. $V = \bigoplus_i V_{\lambda_i}$
- $1 \Leftrightarrow 2$: в силу того, что матрица A есть склейка применения φ на базисные векторы
 - $2 \Rightarrow 3$: пользуемся необходимыми условиями и суммируем $t_i \leq \dim V_{\lambda_i} \leq s_i$ по i
 - $3 \Rightarrow 4$: так как собственные пространства разных собственных значений не пересекаются, то они разлагаются в прямую сумму. Сумма их размерностей будет $\sum_i s_i = n$, то есть всего пространства
 - $4 \Rightarrow 2$: достаточно выбрать базис в каждом подпространстве и объединить. Ранее доказывалось, что он будет базисом во всём пространстве (второй критерий прямой суммы)

Следствие *Достаточно условие диагонализуемости*

Если характеристический многочлен имеет n различных корней из поля, то φ диагонализуем

Действительно, в таком случае у каждого собственного подпространства размерность единица и они располагаются на главной диагонали

12 Инвариантные подпространства малой размерности в вещественном случае

Th

1. В \mathbb{C} у $\varphi \exists$ одномерное инвариантное подпространство
 2. В \mathbb{R} у $\varphi \exists$ одномерное инвариантное подпространство в случае нечётного n
 3. У $\varphi \exists$ ненулевое инвариантное подпространство размерности не выше 2
1. По основной теореме алгебры у любого многочлена есть по крайней мере один комплексный корень
 2. Из анализа известно, что в таком случае у многочлена есть по крайней мере один вещественный корень
 3. Если у многочлена есть вещественный корень, то у него есть и одномерное инвариантное подпространство. Иначе рассмотрим комплексный корень. Из анализа известно, что его сопряжённый тоже будет корнем характеристического многочлена. Тогда многочлен P с этими коэффициентами будет вещественен, а $\det P(A) = 0$ в силу наличия соответствующих собственных значений. В таком случае ранее было доказано, что у $\varphi \exists$ двумерное инвариантное подпространство

13 Треугольный вид матрицы преобразования. Теорема Гамильтона-Кэли

13.1 Треугольный вид матрицы преобразования

Лемма $\exists (n-1)$ -мерное инвариантное подпространство

1. Возьмём произвольное 0 и сделаем выводы по размерности ядра и образа для $\varphi - 0$
2. Выясним существования $U : \dim U = n-1$ – не более чем надмножество $\text{Im } \varphi - 0$. Для его построения возьмём базис в образе и дополним его до базиса во всём V

3. В конце возьмём базис для U , задаваемый требуемое подпространство

Лемма *О треугольном виде*

\exists базис, в котором матрица $\varphi \in L(V, V)$ верхнетреугольна с заданным порядком расстановки характеристических чисел по диагонали

1. Возьмём произвольные 0 и инвариантное $n - 1$ подпространство
2. Далее получим вид для $\varphi : \varphi = \lambda_0 e_n + \sum_1^{n-1} \mu_i f_i$
3. Сделаем вывод о матрице оператора, характеристическом многочлене сужения
4. Затем применяем спуск индукции, чтобы поместить на главную диагональ нужные базисные векторы

13.2 Теорема Гамильтона-Кэли

Th *Гамильтона-Кэли*

Характеристический многочлен является аннулирующим для матрицы оператора

Это следует из того, что $s_i \geq m_i$, то есть характеристический многочлен содержит в себе минимальный (то есть аннулирующий)

14 Корневые подпространства, их размерность. Разложение пространства в прямую сумму корневых. Жорданова нормальная форма, её существование и единственность. Минимальный многочлен, критерий диагонализированности оператора в терминах минимального многочлена

14.1 Корневые подпространства, их размерность

Опр *Корневое подпространство* Первое стабильное ядро

Притом корневое пространство равно и все стабильным ядрам большей размерности

Л2 $\dim \ker(\varphi - \lambda_i)^{s_i} \geq s_i$

1. Запишем матрицу в верхнетреугольном виде, притом расположим λ_i в первых s_i диагональных клетках
2. Применим к матрице преобразование $\varphi - \lambda_i$. Получим нильпотентный левый верхний блок
3. Возведём матрицу в нужную степень с учётом перемножения блочных матриц и получим левый верхний блок нулей
4. Тогда получим, что первые s_i векторов принадлежат соответствующему ядру. А так как такими же могут быть и последующие, то возможно строгое неравенство

Следствие $\dim V_i^\lambda \geq s_i$

В силу суммы размерностей ядра и образа

14.2 Разложение пространства в прямую сумму корневых

Л1 *Сумма любых степеней ядер $\varphi - \lambda_i$ прямая*

1. От противного: пусть $\exists a_1 = V^{\lambda_1} \cap \sum_2^k V^{\lambda_i}$
2. Тогда этот вектор можно разложить по этим подпространствам
3. Применим к обеим частям равенства $\psi = \prod_2^k \varphi - \lambda_i$
4. Тогда справа получим стороны получим ноль, а слева — нет, w

В частности, сумма корневых пространств прямая

Th

1. $V = \bigoplus_i V^{\lambda_i}$

2. $\dim V_i^\lambda = s_i$

3. $m_i \leq s_i$, то есть стабилизация ядер наступает не позже s_i шага

1. В силу $\dim V_i^\lambda \geq s_i$ сложим неравенства по всем i . Тогда $\sum_i s_i \geq n$, однако у нас $\dim V = n$, поэтому $V = \bigoplus_i V_i^{\lambda_1}$
2. Предыдущий пункт возможен лишь когда во всех неравенствах выполнено равенство
3. $\dim \ker(\varphi - \lambda_i)^{s_i} \geq s_i = \dim V_i^\lambda$, однако $\ker(\varphi - \lambda_i) \subset V_i^\lambda$. В противном случае не выполнена формула суммы размерностей ядра и образа

14.3 Жорданова нормальная форма, её существование и единственность

Опр Жорданова клетка Верхнетреугольная матрица, в которой на главной диагонали ...

Опр Жорданова матрица, ЖНФ Блочно-диагональная матрица, каждый блок которой ...

Опр Жорданов базис Базис, в котором оператор имеет ЖНФ

Опр Жорданова цепочка, присоединённый вектор

1. Рассмотрим жорданову клетку запишем её действие в строчном виде
2. Рассмотрим новый оператор $\psi = \varphi - \lambda_0$. Под его действием векторы сваливаются в ядра меньшего по степени оператора
3. Полученная последовательность называется жордановой цепочкой
4. Вектор над данным называется присоединённым. Ясно, что он может быть и не единственен

Th Существование ЖНФ

Существует базис, в котором матрица оператора жорданова

1. Требуется доказать, что существует базис, являющийся объединением жордановых цепочек, то есть так надо сделать в каждом корневом подпространстве
2. Рассмотрим нильпотентный оператор $\psi : V_i^\lambda \rightarrow V_i^\lambda$, являющийся ограничением оператора $\varphi - \lambda_i$ на V_i^λ
3. Заметим, что если $a \in \ker \psi^t$, то $a \in \ker \psi^{t-1}$ (непосредственно проверяется)
4. Теперь рассмотрим вложенную цепочку ядер и определим к последнему, V_i^λ прямое (нулевое дополнение) W_{m_i+1} до следующего ядра (которое будет являться самим V_i^λ)
5. Рассмотрим ядро $\psi(W_{t+1})$, для которого выполнено три условия
6. Из них мы можем определить W_t как прямое дополнение $\ker \psi^{t-1}$ до $\ker \psi^t$ (дополним до базиса)
7. Таким образом, применяя оператор $\psi(W_{t+1})$ мы спускаемся вниз по цепочке и, дополнив до базиса, продолжаем спуск
8. Жорданов базис есть объединение базисов W_i каждое из которых лежит в $\ker \psi^i$, то есть базисных разных W_i пересекаются тривиально (к том же мы пользовались л.н.з. дополнением)

Th Единственность ЖНФ

Для данного базиса ЖНФ единственна с точностью до перестановки жордановых клеток

1. Требуется доказать, что $\forall \lambda_i$ количество жордановых цепочек данной длины в жордановом базисе определено однозначно
2. Рассмотрим все цепочки, соответствующие фиксированному λ_i . Их линейная оболочка находится $\in V_i^\lambda$, $\dim < B_{\lambda_i} > \leq s_i$
3. Так как всего в (жордановом) базисе у нас n векторов, а $< B_{\lambda_i} >$ и составляют этот базис, то в неравенствах выше достигается равенство
4. Рассмотрим нильпотентный оператор $\psi : V_i^\lambda \rightarrow V_i^\lambda$, являющийся ограничением оператора $\varphi - \lambda_i$ на V_i^λ

5. Его образ состоит из всех не верхних векторов в цепочках, образ его образа состоит из всех векторов, кроме ...
6. Введём обозначения для количества жордановых цепочек длины d , отвечающих λ_i за c_i^d
7. Составим уравнения на их суммы, чья система легко решается и однозначно выражается через характеристики оператора φ , то есть инвариантно

Из указанного рассмотрения нетрудно заметить, что степень $\lambda - \lambda_i$ характеристического многочлена s_i равна длине всех цепочек, отвечающих $\forall \lambda_i$, а степень m_i минимального многочлена равна длине максимальной (иначе оператор обнулится не полностью, не по всем цепочкам-базисным векторам)

14.4 Минимальный многочлен, критерий диагонализруемости оператора в терминах минимального многочлена

Опр Минимальный многочлен Многочлен, обнуляющий оператор, минимальной степени

Утв Минимальный многочлен является аннулирующим

1. Хотя бы один аннулирующий многочлен существует, ведь если взять степени оператора, которые будут больше размерности пространства, то эта система будет л.з., а значит, у соответствующего многочлена будут ненулевые коэффициенты
2. Теперь возьмём произвольный вектор $a \in V = \bigoplus_i V^{\lambda_i}$
3. Так как ядра каждого одночлена содержатся в ядре минимального, то каждый член разложения из ядра минимального многочлена. Тогда и a тоже
4. Итого, в силу произвольности a , минимальный многочлен аннулирующий

Утв Минимальный многочлен есть $\prod_i (\lambda - \lambda_i)^{m_i}$

1. От противного: пусть хотя бы одна степень тут меньше, то есть БОО $m'_1 < m_1$
2. Тогда $\dim \ker(\varphi - \lambda_1)^{m'_1} < s_1$ по лемме
3. Если мы сложим все ядра такого вида то получим строгое неравенство. То есть существуют вектор пространства $a : \mu_\varphi(\varphi(a)) \neq 0$, то есть новый многочлен не минимальный

Th Второй критерий диагонализруемости

Если $\varphi \in L(V, V)$ имеет попарно различные собственные значения λ_i кратностей s_i , то следующие условия эквивалентны:

1. φ диагоназируем
 2. $V_{\lambda_i} = V^{\lambda_i}$
 3. μ_φ раскладывается на различные линейные множители
- $1 \Leftrightarrow 2$: в силу того, что $V_{\lambda_i} \subseteq V_i^\lambda$ и $V = \bigoplus_i V_{\lambda_i}$, достигается равенство множеств
 - $2 \Rightarrow 3$: из 2 следует, что $m_i = 1 \forall i$, поэтому все n множителей различны

Билинейные формы

15 Билинейные (полуторалинейные) формы (функции). Координатная запись билинейной формы. Матрица билинейной формы и её изменение при замене базиса

15.1 Билинейные (полуторалинейные) формы (функции)

Опр Билинейная форма, полуторалинейное отображение Не забыть сопрячь на втором аргументе

Опр Матрица билинейной формы Её элемент есть результат применения формы на пару базисных векторов

15.2 Координатная запись билинейной формы

Th Координатная запись

$$\beta(x, y) = x^T B \bar{y}$$

Достаточно представить векторы в координатной записи и раскрыть по билинейности

Утв Если произвольно отображения удовлетворяет равенству $\beta(x, y) = x^T B \bar{y}$, то это билинейная форма

Так как запись верна для всех векторов, то она верна и для базисных, к чему мы её и применим. Далее проверим аксиомы и убедимся, что перед нами билинейная форма

15.3 Матрица билинейной формы и её изменение при замене базиса

Th Изменение матрицы при замене базиса

$$\beta' = S^T B \bar{S}$$

Достаточно вставить матрицу перехода на нужные места

16 Симметричные билинейные (полуторалинейные) формы. Взаимно-однозначное соответствие с квадратичными (эрмитовыми) формами

16.1 Симметричные билинейные (полуторалинейные) формы

Опр (Эрмитова) симметричная форма $\beta(x, y) = \overline{\beta(y, x)}$

Th Билинейная форма симметрична $\Leftrightarrow B = B^*, B^* = \overline{B^T}$

\Rightarrow : по определению билинейной формы \Leftrightarrow : надо воспользоваться тем, что результат билинейной формы есть число (матрица 1 на 1), а затем подогнать под определение, используя транспонирования и сопряжение

16.2 Взаимно-однозначное соответствие с квадратичными (эрмитовыми) формами

Опр Квадратичная (эрмитова) форма $q(x) = \beta(x, x)$, порождённая билинейной

Учтём, что теперь $\beta(a, a) = \overline{\beta(a, a)}, q(a) = x^T B \bar{x}$

Th (Эрмитова) квадратичная форма порождается ровно одной билинейной $\Leftrightarrow B = B^*, B^* = \overline{B^T}$

1. Требуется доказать, что значение билинейной формы однозначно восстанавливается по квадратичной
2. В \mathbb{R} достаточно рассмотреть $q(x + y)$
3. В \mathbb{C} достаточно рассмотреть $q(x + y)$ и $i q(x + iy)$, не забыв, где надо, про комплексное сопряжение и что $i^2 = -1$
4. Сделаем вывод о матрице оператора, характеристическом многочлене сужения
5. Затем применяем спуск индукции, чтобы поместить на главную диагональ нужные базисные векторы

17 Ядро билинейной функции. Ортогональное дополнение подпространства. Ограничение билинейной функции на подпространство. Критерий невырожденности подпространства. Существование нормального вида билинейной симметричной формы над полями \mathbb{R} и \mathbb{C}

17.1 Ядро билинейной функции

18 Алгоритмы приведения квадратичной формы к нормальному виду (метод Лагранжа и сдвоенных элементарных преобразований матрицы)

Опр *Диагональный вид формы* Матрица формы в данном базисе диагональна

Опр *Канонический диагональный вид формы* Каждый элемент диагонали $\in \{-1; 0; 1\}$

Заметим, от диагонального вида легко перейти к каноническому (путём линейной замены)

Th *Существует базис, в котором квадратичная форма имеет диагональный вид*

- Допустим $b_{11} \neq 0, b_{m1} \neq 0$. Тогда применим сдвоенное элементарное преобразование: вычтем из m -й строки и столбца 1-ю строку и столбец, домноженные на соответствующий коэффициент ($b_{1m} \neq \overline{b_{m1}}$). Далее продолжим с матрицей меньшей размерности
- Если хотя бы один диагональный элемент не ноль, то поменяем местами базисные векторы и продолжим как в простом случае
- Если все диагональные элементы ноль, то прибавим к нему столбец и строку с ненулевым элементом λ той же линии (получится в результате сдвоенности 2λ). Затем продолжим как в простом случае

19 Закон инерции квадратичной (эрмитовой) формы. Положительный и отрицательный индексы инерции, их геометрическая характеристика. Критерий Сильвестра

19.1 Закон инерции квадратичной (эрмитовой) формы

Опр *Положительно (полу)определённая форма* Положительна (неотрицательна) на ...

Опр *Отрицательно (полу)определённая форма* Аналогично

Th *Квадратичная форма определена положительно $\Leftrightarrow d_i > 0 \forall i$*

$\Rightarrow: d_i = q(e_i)$ по определению положительной определённости \Leftrightarrow : в силу $q(a) = \sum_i d_i |x_i|^2$

Отсюда следует, что определитель матрицы положительно определённой формы положителен

Аналогичные критерии есть и у отрицательно- и полуопределённых форм

Опр *Положительный индекс инерции* Наибольшее число, для которого $\exists U \dots$

Th *Об индексах инерции*

Индексы инерции p, q равны количеству соответствующих по знаку чисел среди d_i

1. Докажем для положительного индекса инерции
2. БОО положительные можно считать p' – количество положительных d_i – элементов первыми. Тогда ограничение на этом подпространстве и будет отвечать определению положительного индекса инерции
3. Пусть $p > p'$. Тогда рассмотрим подпространство соответствующей размерности
4. По формуле включений-исключений придём к тому, что пересечение пространства и отрицательно полуопределённого подпространства ненулевое. Тогда существует ненулевой вектор, на котором форма не определена однозначно, w

Следствие *Ранг квадратичной формы равен $p + q$*

Опр *Сигнатура квадратичной формы $(p, q, n - p - q)$*

19.2 Критерий Сильвестра

Th Критерий Сильвестра

Квадратичная форма определена положительно $\Leftrightarrow M_i > 0 \forall i$

1. \Rightarrow : достаточно рассмотреть сужение на каждое подпространство и вспомнить про следствие из закона инерции
2. \Leftarrow : от противного. Положим m – минимальное число первых базисных векторов элементов, на которых форма определена не положительно и рассмотрим сужение на них
3. Тогда из $p \geq m - 1$ (в силу сужения на $m - 1$ подпространстве) и $p < m$, иначе m определено неверно. Получаем равенство $p = m - 1$
4. Перейдём к диагональному виду и рассмотрим определитель сужения на m -ное пространство. Он будет неположителен, w

20 Кососимметричные билинейные функции, приведение их к нормальному виду

Опр Кососимметрическая билинейная функция $\beta(x, y) = -\overline{\beta(y, x)}$

Из определения видно, что $\beta(x, x) = 0$

Th Билинейная форма кососимметрическая $\Leftrightarrow \overline{B^T} = -B$

\Rightarrow : по определению кососимметрической формы \Leftrightarrow : надо воспользоваться тем, что результат билинейной формы есть число (матрица 1 на 1), а затем подогнать под определение, используя транспонирования и сопряжение

Следствие Билинейная форма в нечётномерном векторном пространстве вырождена Потому как тождественна O

Th Канонический вид

Существует базис, в котором квадратичная форма имеет диагональный вид

- Допустим $b_{11} = 0$ и соответствующие строка и столбец нулевые, то спускаем по размерности вниз
- Если хотя бы один не первый элемент строки не ноль, то поменяем местами вторую и эту строки. Затем путём элементарных преобразований сделаем $+1$ (на столбце получим схожую картину) и спустимся вниз
- Если и после первого есть ненулевой элемент, то его можно сдвоенными ЭПС сделать нулевым

Пространства со скалярным произведением

21 Евклидовы и унитарные пространства. Матрица Грама и её свойства. Неравенство Коши – Буняковского – Шварца, неравенство треугольника. Метрика. Выражение скалярного произведения в координатах

21.1 Евклидовы и унитарные пространства

Опр Евклидово (унитарное) пространство Пространство над полем с фиксированным скалярным произведением

Опр Норма (длина) вектора $|x| = \sqrt{\beta(x, x)}$

Норма неотрицательна и нулевая в случае нулевого вектора

Опр Ортогональные векторы $\beta(x, y) = 0$

21.2 Матрица Грама и её свойства

Опр Матрица Грама Матрица система векторов: $g_{ij} = (a_i, a_j)$

Утв Определитель матрицы Грама положителен при л.н.з системе и ноль иначе

1. На л.н.з. векторах матрица Грама есть матрица п.о. билинейной симметрической формы, поэтому её детерминант положителен.
2. В случае л.з. системы составим её нетривиальную л.к., домножим на векторы a_j и повторим так $\forall j \in \overline{1, n}$
3. Тогда если составить из строчек матричное уравнение, то получим $\Gamma x = 0$, что в силу $x \neq 0$ означает вырожденность Γ

21.3 Неравенство Коши – Буняковского – Шварца, неравенство треугольника

Следствие Неравенство Коши – Буняковского – Шварца

$$\forall a, b \in E |a||b| \geq |(a, b)|$$

Достаточно воспользоваться предыдущей теоремой и раскрыть определитель, сняв в конце квадраты

Следствие Неравенство треугольника

$$\forall a, b \in E |a||b| \geq |a + b|$$

Достаточно расписать $|a + b|^2$ и воспользоваться предыдущим неравенством

21.4 Метрика

На E введём метрику как $\rho(a, b) = |b - a|$. Заметим, что в таком случае выполняются все 4 аксиомы метрики (неотрицательность, ноль при нуле, симметричность и неравенство треугольника)

21.5 Выражение скалярного произведения в координатах

Опр Скалярное произведение Билинейная (эрмитова) симметричная положительно ...

Th Скалярное произведение

$$(a, b) = x^T \Gamma \bar{y}$$

Это верно, потому как в случае базисных векторов матрица Грама совпадает с матрицей билинейной формы скалярного произведения