

showonlyrefs = true

Конспект билетов

Кратные интегралы и теория поля

Содержание

1 Теорема о выражении меры множества через интеграл от меры сечений. Теорема Фубини	4
1.1 Теорема о выражении меры множества через интеграл от меры сечений	4
1.2 Теорема Фубини	4
2 Теорема о замене переменных в кратном интеграле	4
3 Теорема о построении криволинейной системы координат исходя из её части	5
4 Гладкие подмногообразия пространства R^N. Теорема о гладком подмногообразии пространства R^N, заданном системой уравнений	5
4.1 Гладкие подмногообразия пространства R^N	5
4.2 Теорема о гладком подмногообразии пространства R^N , заданном системой уравнений	5
5 Геометрический касательный вектор к подмножеству пространства R^n. Теоремы о структуре множества $T_P(M)$ геометрических касательных векторов к гладкому подмногообразию M пространства R^n в общем случае и в случае, когда M заданно системой уравнений	5
5.1 Геометрический касательный вектор к подмножеству пространства R^n	5
5.2 Теоремы о структуре множества $T_P(M)$ геометрических касательных векторов к гладкому подмногообразию M пространства R^n в общем случае и в случае, когда M заданно системой уравнений	5
6 Необходимые условия безусловного экстремума. Достаточные условия безусловного экстремума	6
6.1 Необходимые условия безусловного экстремума	6
6.2 Достаточные условия безусловного экстремума	6
7 Метод Лагранжа нахождения точек условного экстремума. Необходимые условия условного экстремума. Достаточные условия условного экстремума	6
7.1 Метод Лагранжа нахождения точек условного экстремума	6
7.2 Необходимые условия условного экстремума.	6
7.3 Достаточные условия условного экстремума.	7
8 Топологическое пространство. Индуцированная топология. Карта и атлас на топологическом пространстве. Общие (абстрактные) определения многообразия и гладкого многообразия. Классы гладкости C^k отображений из одного гладкого многообразия в другое	7
8.1 Топологическое пространство	7
8.2 Индуцированная топология	7
8.3 Карта и атлас на топологическом пространстве	8
8.4 Общие (абстрактные) определения многообразия и гладкого многообразия	8
8.5 Классы гладкости C^k отображений из одного гладкого многообразия в другое	8
9 Теорема о гладком атласе на гладком подмногообразии пространства R^N. Достаточное условие гладкости подмногообразия пространства R^N в терминах карты	8
9.1 Теорема о гладком атласе на гладком подмногообразии пространства R^N	8
9.2 Достаточное условие гладкости подмногообразия пространства R^N в терминах карты	8
10 Касательный вектор к абстрактному гладкому многообразию как оператор дифференцирования. Теорема о структуре множества $T_P(M)$ касательных векторов. Изменение координат касательного вектора при замене локальной системы координат	9
10.1 Касательный вектор к абстрактному гладкому многообразию как оператор дифференцирования	9
10.2 Теорема о структуре множества $T_P(M)$ касательных векторов.	9
10.3 Изменение координат касательного вектора при замене локальной системы координат . . .1/19	9
11 Край многообразия. Теорема о независимости краевой точки карты от карты	10

14 Теорема о построении ориентирующего атласа для края многообразия на основе ориентирующего атласа исходного многообразия. Согласование ориентации гладкого многообразия и ориентации его края	11
14.1 Теорема о построении ориентирующего атласа для края многообразия на основе ориентирующего атласа исходного многообразия	11
14.2 Согласование ориентации гладкого многообразия и ориентации его края	12
15 Тензорное поле на многообразии. Изменение компонент тензорного поля при замене локальной системы координат. Выражение тензорного поля через его компоненты с помощью операции тензорного произведения	12
15.1 Тензорное поле на многообразии	12
15.2 Изменение компонент тензорного поля при замене локальной системы координат.	12
15.3 Выражение тензорного поля через его компоненты с помощью операции тензорного произведения	12
16 Дифференциальные формы на гладком многообразии, их представление через внешнее произведение дифференциалов координатных функций. Внешний дифференциал дифференциальной формы, его независимость от локальной системы координат	12
16.1 Дифференциальные формы на гладком многообразии, их представление через внешнее произведение дифференциалов координатных функций	12
16.2 Внешний дифференциал дифференциальной формы, его независимость от локальной системы координат	13
17 Правило Лейбница для внешнего дифференциала внешнего произведения двух дифференциальных форм.	13
18 Перенос касательных векторов. Выражение для переноса базисного вектора касательного пространства через частные производные координатных функций отображения	13
18.1 Перенос касательных векторов	13
18.2 Выражение для переноса базисного вектора касательного пространства через частные производные координатных функций отображения.	13
19 Перенос дифференциальных форм при отображении многообразий. Выражение для переноса базисного вектора кокасательного пространства через частные производные координатных функций отображения	13
19.1 Перенос дифференциальных форм при отображении многообразий	13
19.2 Выражение для переноса базисного вектора кокасательного пространства через частные производные координатных функций отображения.	14
20 Обратный перенос дифференциальных форм при суперпозиции отображений многообразий. Коммутативность операций внешнего дифференцирования и обратного переноса дифференциальной формы	14
20.1 Обратный перенос дифференциальных форм при суперпозиции отображений многообразий	14
20.2 Коммутативность операций внешнего дифференцирования и обратного переноса дифференциальной формы.	14
21 Теорема о разбиении единицы на многообразии	14
22 Определение интеграла от дифференциальной формы и его корректность. Криволинейный и поверхностный интегралы второго рода	15
22.1 Определение интеграла от дифференциальной формы и его корректность	15
22.2 Криволинейный и поверхностный интегралы второго рода	15
23 Теорема Стокса.	15
24 Условия независимости криволинейного интеграла от пути интегрирования. Связь условий точности и замкнутости дифференциальных форм	15
24.1 Условия независимости криволинейного интеграла от пути интегрирования	15
24.2 Связь условий точности и замкнутости дифференциальных форм	16

25 Теорема о цепном равенстве. Лемма Пуанкаре	16
25.1 Теорема о цепном равенстве	16
25.2 Лемма Пуанкаре.	16
26 Риманова метрика. Выражение для индуцированной римановой метрики в полярной системе координат на плоскости и сферической системе координат в трехмерном пространстве	16
26.1 Риманова метрика	16
26.2 Выражение для индуцированной римановой метрики в полярной системе координат на плоскости и сферической системе координат в трехмерном пространстве	17
27 Определение формы Риманова объема и ее связь с дифференциальной формой (тензором Леви-Чивиты). Определение интеграла первого рода скалярной функции по гладкому многообразию. Поток векторного поля через двумерное ориентируемое подмногообразие пространства R^3, выражение потока через интеграл от дифференциальной формы и интеграл первого рода	17
27.1 Определение формы Риманова объема и ее связь с дифференциальной формой (тензором Леви-Чивиты)	17
27.2 Определение интеграла первого рода скалярной функции по гладкому многообразию.	17
27.3 Поток векторного поля через двумерное ориентируемое подмногообразие пространства R^3 , выражение потока через интеграл от дифференциальной формы и интеграл первого рода	17
28 Дивергенция и ротор векторного поля в области трехмерного евклидова пространства. Геометрический смысл дивергенции и ротора векторного поля. Условия существования скалярного и векторного потенциалов векторного поля в области трехмерного евклидова пространства	17
28.1 Дивергенция и ротор векторного поля в области трехмерного евклидова пространства	17
28.2 Геометрический смысл дивергенции и ротора векторного поля.	18
28.3 Условия существования скалярного и векторного потенциалов векторного поля в области трехмерного евклидова пространства	18
29 Определение производной Ли тензорного поля через его обратный перенос фазовым потоком. Выражение компонент производной Ли тензорного поля по векторному полю через компоненты этих полей. Выражение производной Ли для тензорных полей типов $(0,0)$, $(1,0)$ и $(0,1)$	18
29.1 Определение производной Ли тензорного поля через его обратный перенос фазовым потоком	18
29.2 Выражение компонент производной Ли тензорного поля по векторному полю через компоненты этих полей	18
29.3 Выражение производной Ли для тензорных полей типов $(0,0)$, $(1,0)$ и $(0,1)$	19
30 Коммутативность производной Ли и внешнего дифференциала формы.	19
31 Правило Лейбница для внутреннего произведения векторного поля на внешнее произведение двух дифференциальных форм	19
32 Магическое тождество Картана.	19

1 Теорема о выражении меры множества через интеграл от меры сечений. Теорема Фубини

1.1 Теорема о выражении меры множества через интеграл от меры сечений

Лемма 1

Пусть есть счётный набор конечно измеримых убывающих вложенных множеств X_i . Мера множества, являющегося счётным пересечением есть предел мер

Лемма 2

Если интеграл неотрицательной функции по множеству равен нулю, то сама функция равна нулю почти на всём множестве

Theorem О выражении меры множества через интеграл от меры сечений

1. Для начала докажем для клетки. Её сечение будет принимать простой вид, в зависимости от принадлежности x , что даёт простое интегрирование и доказывает теорему
2. Теперь докажем для счётного набора (объединения) клеток. Задача сводится к предыдущей.
3. Найдём меру множества, являющегося счётным пересечением объединения счётного числа клеток
4. Определим убывающую последовательность множеств
5. Далее считаем меры составляющих, по ходу дела используя теорему Лебега об ограниченной сходимости
6. Теперь рассмотрим случай множества нулевой меры и, с помощью всяких сравнений и пределов, докажем требуемое.
7. В конце рассмотрим общий случай конечно измеримого множества.
8. Используем все предыдущие леммы и случаи и получаем требуемое при почти всех x

1.2 Теорема Фубини

Theorem О геометрическом смысле интеграла

Theorem Фубини

2 Теорема о замене переменных в кратном интеграле

Опр C^k -гладкий диффеоморфизм

Опр Носитель функции

Theorem О замене переменных в кратном интеграле

Лемма 2 Теорема справедлива, если f непрерывна на Y , а её носитель компактен и лежит в Y

1. Убрав условие 3, мы сделали теорему локальной (для каждой точки существует окрестность, где выполнено условие 3)
2. Воспользуемся теоремой о расщеплении отображений, о неявной функции, критерием компактности, теоремой о разбиении единицы
3. Это позволяет разбить функцию на сумму. Утверждение для фиксированного индекса (на его области значений) верно по предыдущей лемме

Лемма 4 Теорема справедлива, если функция f непрерывна на Y

1. Рассмотрим неотрицательно значные функции и введём хитрые множества Y_k и функции f_k
2. Докажем, что $\text{supp} f_k \subset Y_k$ исходя из определения f_k . Получили ограниченность и замкнутость f_k
3. Из построения множеств следуют включения, а за ними и неравенства
4. Теперь покажем, что f_k стремятся к f через определения и построения условий.
5. Запишем следствия из предела и перейдём и завершим доказательство с помощью теоремы Б. Леви
6. В общем случае разобьём f на f_+ и f_- и получим искомое равенство

3 Теорема о построении криволинейной системы координат исходя из её части

Опр Криволинейная система координат на множестве A , координатный набор

Theorem О построении криволинейной системы координат исходя из её части.

1. Рассмотрим отображение из известного набора функций и матрицу Якоби этого отображения.
2. Рассмотрим координатные строки и матрицу в точке и применим теорему о ранге матрицы
3. Определим новые гладкие функции и всеобъемлющее отображение, рассмотрим новую матрицу Якоби
4. Применим теорему об обратном отображении и получим требуемое

4 Гладкие подмногообразия пространства R^N . Теорема о гладком подмногообразии пространства R^N , заданном системой уравнений

4.1 Гладкие подмногообразия пространства R^N

Опр Гладкое n -мерное подмногообразием пространства R_p^N в точке $P \in M$

Опр Канонический и выпрямляющий диффеоморфизм

Утв Гладкое n -мерное подмногообразие пространства

4.2 Теорема о гладком подмногообразии пространства R^N , заданном системой уравнений

Theorem О гладком подмногообразии, заданном системой уравнений

1. Сначала построим отображения до гладкого диффеоморфизма по теореме о построении криволинейной системы координат, исходя из её части
2. Докажем выпрямляемость обратного диффеоморфизма через анализ множеств и из их свойств

5 Геометрический касательный вектор к подмножеству пространства R^n . Теоремы о структуре множества $T_P(M)$ геометрических касательных векторов к гладкому подмногообразию M пространства R^n в общем случае и в случае, когда M заданно системой уравнений

5.1 Геометрический касательный вектор к подмножеству пространства R^n

Опр Геометрический касательный вектор к множеству в точке

Опр Геометрическое касательное пространство

5.2 Теоремы о структуре множества $T_P(M)$ геометрических касательных векторов к гладкому подмногообразию M пространства R^n в общем случае и в случае, когда M заданно системой уравнений

Theorem 1 О структуре множества геометрических касательных векторов к гладкому подмногообразию.

1. Воспользуемся определением канонического диффеоморфизма, леммой о $T_P(M)$ к линейному пространству и о локальности $T_P(M)$.
2. Запишем вид $T_P(M)$ и перейдём к локальной параметризации (из-за правил умножения матриц)
3. Итого, касательные векторы есть л.к. столбцов матрицы Якоби, а само $T_P(M)$ является n -мерным линейным подпространством R^N .

Theorem 2 *О структуре множества геометрических касательных векторов к подмногообразию, заданному системой уравнений.*

1. Пишем те же рассуждениями, что и в теореме о гладком подмногообразии, заданном системой уравнений.
2. Введём новую переменную и воспользуемся предыдущей теоремой

6 Необходимые условия безусловного экстремума. Достаточные условия безусловного экстремума

6.1 Необходимые условия безусловного экстремума

Опр Точка экстремума

Опр Точка (не)строгого локального минимума (максимума) функции на множестве.

Опр Точка (без)условного локального экстремума

Theorem Необходимое условие экстремума

Для доказательства воспользуемся определением градиента и рассмотрим функцию одной переменной, где применим теорему Ферма

6.2 Достаточные условия безусловного экстремума

Опр Стационарная точка.

Theorem Достаточные условия экстремума.

1. Разложим Δf по формуле Тейлора с использованием определения стационарной точки.
2. В знакоопределённом случае воспользуемся леммой и определением α -малого и предела
3. Теперь распишем Δf и получим требуемое. В случае отрицательной определённости рассуждения аналогичны (f меняется на $-f$)
4. В знаконеопределённом случае рассмотрим выделенные направления и запишем Δf .
5. Воспользуемся определением предела и выберем достаточно малые t_i для построения противоречия
6. В последнем случае приводятся два контрпримера $f = x^4$ и $f = x^3$

7 Метод Лагранжа нахождения точек условного экстремума. Необходимые условия условного экстремума. Достаточные условия условного экстремума

7.1 Метод Лагранжа нахождения точек условного экстремума

Опр Функция Лагранжа

Опр Множители Лагранжа

7.2 Необходимые условия условного экстремума.

Theorem Необходимые условия экстремума

Сделаем общие построения для доказательства теорем.

1. Воспользуемся теоремой о построении криволинейной системы координат, исходя из её части и введём новые обозначения для обратных функций
2. Тогда можно расписать обратную функцию Лагранжа и показать, что новая задача эквивалентна старой

Теперь докажем саму теорему.

1. Воспользуемся теоремой о необходимом условии безусловного экстремума и выберем специальные множители Лагранжа.

2. Вернёмся к исходным переменным, воспользовавшись теоремой о дифференцировании сложной функции и значениями $\frac{\partial L}{\partial \lambda_i}$
3. Вышеперечисленное показывает, что x_0 — стационарная точка функции Лагранжа, как и нашей исходной функции

7.3 Достаточные условия условного экстремума.

Theorem Достаточные условия экстремума.

1. Перейдём к обратной функции Лагранжа, для которой точка y_0 стационарна
2. Исходная точка будет стационарной, если в этой точке обратная функция совпадёт с обратной функцией Лагранжа, то есть k' для обратной функции Лагранжа будет отрицательная определена
3. Покажем, что это эквивалентно отрицательной определённости k . Для этого воспользуемся инвариантностью первого дифференциала, распишем второй и воспользуемся стационарностью точки
4. Согласно теореме о структуре множества геометрических касательных векторов к подмногообразию, заданному системой уравнений, получаем эквивалентность структур форм, что нам и требуется

8 Топологическое пространство. Индуцированная топология. Карта и атлас на топологическом пространстве. Общие (абстрактные) определения многообразия и гладкого многообразия. Классы гладкости C^k отображений из одного гладкого многообразия в другое

8.1 Топологическое пространство

Опр Топологическое пространство

Опр Топология

Опр Открытое в топологическом пространстве множество

Опр Семейство всех открытых подмножеств метрического пространства с метрикой

Опр Окрестность точки

Опр Внутренность множества

Опр Замыкание множества

8.2 Индуцированная топология

Опр Индуцированная топология

Лемма 1

Доказывается по определению, с привлечением старых множеств, породивших новую топологию

Опр Хаусдорфово топологическое пространство

Опр Предел по топологическому пространству

Заметим, что у хаусдорфова пространства не может быть двух различных пределов; иначе может

Лемма 2

Доказывается выбором специальных окрестностей, которые не пересекаются

Опр База топологического пространства

Лемма 3

Возьмём пересечения открытых шаров с рациональными радиусами и координатами

Опр Непрерывное в точке отображение

Опр Секвенциально непрерывное в точке отображение

Опр (Секвенциально) непрерывное отображение

Опр Гомеоморфизм

Лемма 4

Докажем от частного к общему с помощью непрерывности и открытости объединения открытых

Опр Компактное топологическое пространство

Опр Секвенциально компактное топологическое пространство

Опр Секвенциально компактное множество

Лемма 5

Возьмём открытое покрытие множества, перейдём к прообразам, выберем там открытое покрытие и конечное подпокрытие

Опр Гомеоморфные множества

Опр Топологический инвариант

Опр Линейно-связное топологическое пространство

Компактность и линейная связность являются топологическими инвариантами, поскольку они сохраняются при любом непрерывном отображении

8.3 Карта и атлас на топологическом пространстве

Опр n -мерная карта на топологическом пространстве

Опр Гомеоморфизм карты, район действия карты, область параметров карты

Опр Атлас на топологическом пространстве

8.4 Общие (абстрактные) определения многообразия и гладкого многообразия

Опр n -мерное абстрактное многообразие

Опр Замена координат, отображение перехода, отображение склейки

8.5 Классы гладкости C^k отображений из одного гладкого многообразия в другое

Опр Гладкий диффеоморфизм

Опр Гладкий атлас

Атлас на многообразии, состоящий из одной карты, считается гладким

Опр Эквивалентные гладкие атласы

Опр Гладкая структура, определяемая атласом

Гладкая структура — отношение эквивалентности

Опр Гладкое n -мерное многообразие

Опр Карта на гладком многообразии

Опр Локальная система координат карты

Опр Класс C^k -гладких отображений

Опр Координатное представление отображения

Опр Диффеоморфные гладкие многообразия

9 Теорема о гладком атласе на гладком подмногообразии пространства R^N . Достаточное условие гладкости подмногообразия пространства R^N в терминах карты

9.1 Теорема о гладком атласе на гладком подмногообразии пространства R^N .

Theorem О гладком атласе на гладком подмногообразии

1. По лемме, $\forall P$ найдётся карта на топологическом пространстве M , порождённая каноническим диффеоморфизмом, район действия которой содержит точку P . Семейство всех таких карт составляет атлас; покажем, что он гладкий
2. Фиксируем $\forall P$, вводим новые обозначения и рассматриваем отображения замены координат
3. Они будут состоять из суперпозиции гладких диффеоморфизмов, что докажет и диффеоморфность замены координат

9.2 Достаточное условие гладкости подмногообразия пространства R^N в терминах карты

Опр Порождённая каноническим диффеоморфизмом карта

Опр Порождённая каноническим диффеоморфизмом в некоторой окрестности точки карта.

Theorem Достаточное условие гладкости подмногообразия в терминах карты.

1. Считаем V открытым подмножеством согласно лемме и воспользуемся теоремой о ранге матрицы

2. От исходного отображения перейдём к $f(x)$ с новыми обозначениями и запишем Матрицу Якоби отображения
3. Увидим, что в x_0 матрица невырождена, что позволяет использовать теорему об обратном отображении
4. M будет задано простой системой уравнений, то есть имеет вид подпространства или полуподпространства
5. Теперь докажем, что M подмногообразие. В случае внутренней точки рассматриваем сужения и пересечения, вводя новые обозначения.
6. Осталось показать, что параметры находились в линейной части пространства. В случае внутренней точки доказываем сначала прямое, а потом и обратное включения с помощью шаманства
7. Случай граничной точки следует заменой подпространства на полуподпространство
8. Согласно определению отображения f , справедливо равенство, которое и завершает доказательство

10 Касательный вектор к абстрактному гладкому многообразию как оператор дифференцирования. Теорема о структуре множества $T_P(M)$ касательных векторов. Изменение координат касательного вектора при замене локальной системы координат

10.1 Касательный вектор к абстрактному гладкому многообразию как оператор дифференцирования

Опр Производная функции по вектору в точке

Опр Касательный вектор

Оператор обладает свойством локальности

Обозначение Множество всех касательных векторов

Опр Соответствующие абстрактный и обычный касательный векторы

Опр Координаты касательного вектора

Касательный вектор является линейным оператором. Это следует из свойства линейности и правила Лейбница для производной функции одной переменной

10.2 Теорема о структуре множества $T_P(M)$ касательных векторов.

Theorem О структуре множества касательных векторов.

1. Фиксируем произвольную ЛСК в окрестности точки и введём новые обозначения.
2. Перейдём к равенствам для любой функции f . В итоге получим линейное пространство.
3. Покажем, что коэффициенты разложения вектора по системе векторов определены однозначно. Это следует из существования соответствующего геометрического касательного вектора
4. Итого, операторный набор составляет базис в $T_P(M)$

Опр Производная функции по геометрическому касательному вектору

Опр Изоморфизм, изоморфные линейные пространства

10.3 Изменение координат касательного вектора при замене локальной системы координат

Лемма

Доказывается записью вектора в двух базисах и с помощью теоремы о дифференцировании сложной функции

11 Край многообразия. Теорема о независимости краевой точки карты от карты

11.1 Край многообразия

Опр *Край допустимой области параметров*

Край, вообще говоря, не совпадает с границей множества, потому как граничные точки могут не принадлежать множеству

Опр *Краевая точка карты*

11.2 Теорема о независимости краевой точки карты от карты.

Theorem *О независимости краевой точки от карты.*

1. Докажем от противного: пусть краевая для одной карты и нет для другой
2. \exists две окрестности, операции с которым показывают, что x_2 внутренняя точка множества V_2 .
3. Сделаем замену координат, а потом и тождественное изображение. Получим невырожденность замены координат.
4. Воспользуемся теоремой о неявной функции и получим окрестность точки x_1 в V_1 первой карты
5. Таким образом, точка x_1 не лежит на границе области, а значит, P не краевая точка карты, противоречие

Опр *Край гладкого многообразия*

12 Ориентация гладкого многообразия. Существование ровно двух ориентаций линейно-связного ориентируемого многообразия

12.1 Ориентация гладкого многообразия

Опр *Согласованные (по ориентации) карты*

Опр *Ориентирующий атлас*

Опр *(Не)ориентируемое многообразие*

Опр *Согласованные атласы*

Опр *Ориентация многообразия*

Опр *Ориентированное многообразие*

Опр *Карты, соответствующие ориентации (согласованные с ориентацией) гладкого многообразия*

12.2 Существование ровно двух ориентаций линейно-связного ориентируемого многообразия.

Theorem *О двух ориентациях многообразия.*

1. Возьмём ориентирующий атлас и сделаем из него атлас с противоположной ориентацией. Заметим, что допустимая область параметров таковой остаётся
2. Таким образом, существуют по крайней мере две различные ориентации многообразия – это класс всех атласов, согласованных с первым или со вторым
3. Покажем, что третьей ориентации многообразия не существует. Фиксируем ориентирующий атлас.
4. Выберем $\forall P$ и проанализируем знак якобиана замены координат
5. Знак якобиана непрерывно зависит от точки, притом не может обращаться в ноль как якобиан диффеоморфизма
6. Итак, в зависимости от знака якобиана, кандидат согласован либо с первым, либо со вторым атласом

13 Ориентация гладкого $(N - 1)$ -мерного подмногообразия пространства R^N . Теорема о непрерывной нормали

13.1 Ориентация гладкого $(N - 1)$ -мерного подмногообразия пространства R^N

Опр Единичный вектор нормали к многообразию

Опр Согласованный единичный вектор нормали и карта

Опр Согласованный с ориентацией многообразия вектор нормали

13.2 Теорема о непрерывной нормали.

Theorem О непрерывной нормали

1. \Rightarrow : покажем непрерывность функции. Зафиксируем $\forall P_0$ и покажем, что частичный предел последовательности стремящихся точек единственен.
2. Зафиксируем карту с P_0 и перейдём к пределу в скалярных произведениях и по модулю
3. Условие согласованности нормали и карты $\Leftrightarrow \det > 0$. Перейдя к пределу, получим равенство пределов нормалей, притом функция нормали непрерывна в любой точке M
4. \Leftarrow : перейдём к карте и возьмём правый базис (или изменим до правого)
5. Пользуемся непрерывностью и линейной связностью для получения правого базиса в каждой точке
6. Полученный атлас будет ориентирующим, так как все карты имеют правые тройки, поэтому они согласованы

14 Теорема о построении ориентирующего атласа для края многообразия на основе ориентирующего атласа исходного многообразия. Согласование ориентации гладкого многообразия и ориентации его края

14.1 Теорема о построении ориентирующего атласа для края многообразия на основе ориентирующего атласа исходного многообразия

Лемма 2

1. Зафиксируем гладкий атлас и перейдём от обычной окрестности к открытому шару или полушару
2. Из предыдущей леммы $\Rightarrow \exists$ диффеоморфизм между областью параметров и (полу)пространством
3. Введём новые обозначения, получим гладкий атлас, а затем и гладкий атлас из (полу)пространства

Лемма 3

1. Пользуясь предыдущей леммой, получим гладкий атлас с нужной областью параметров
2. У всех карт, ориентации которых не совпадают с ориентацией M , поменяем вторую координату (область параметров, заметим, не изменится)

Theorem О построении ориентирующего атласа для края многообразия

1. Сначала получим гладкий атлас на крае, а затем покажем, что \forall две карты атласа согласованы
2. От открытого образа перейдём к открытому прообразу и рассмотрим отображение замены координат. Покажем, что якобиан сужения на крае положителен (то есть атлас ориентирующий)
3. Зафиксируем краевую точку и посчитаем частные производные по координатам.
4. Перейдём к якобианам и получим, что атлас на краю действительно ориентирующий (исходный таковой по условию)

14.2 Согласование ориентации гладкого многообразия и ориентации его края

Опр *Согласованная ориентация края и многообразия*

Опр *Перенос ориентации между многообразиями*

15 Тензорное поле на многообразии. Изменение компонент тензорного поля при замене локальной системы координат. Выражение тензорного поля через его компоненты с помощью операции тензорного произведения

15.1 Тензорное поле на многообразии

Опр *Тензор на пространстве*

Опр *Компоненты (координаты) тензора*

Опр *Тензорное произведение тензора*

Оно не коммутативно

Опр *Векторное, ковекторное поле, скалярное поле*

Опр *Тензорное поле*

Опр *Компоненты тензорного поля*

15.2 Изменение компонент тензорного поля при замене локальной системы координат.

Theorem *О законе изменения компонент тензорного поля при замене ЛСК*

Перейдём к другим координатам по формуле, подставим это в старый тензор, вынесем константы и получим новую формулу

15.3 Выражение тензорного поля через его компоненты с помощью операции тензорного произведения

Опр *Сумма двух тензорных полей (одинакового типа)*

Опр *Произведение тензорного и скалярного полей*

Опр *Тензорное произведение тензорных полей.*

Theorem

16 Дифференциальные формы на гладком многообразии, их представление через внешнее произведение дифференциалов координатных функций. Внешний дифференциал дифференциальной формы, его независимость от локальной системы координат

16.1 Дифференциальные формы на гладком многообразии, их представление через внешнее произведение дифференциалов координатных функций

Опр *Внешняя форма*

Опр *Перестановка чисел, транспозиция*

Опр *Знак перестановки*

Опр *Перестановка набора элементов*

Опр *Альтернирование тензора*

Опр *Внешнее произведение внешних форм*

Опр *Дифференциальная форма*

Опр *Множество гладких дифференциальных форм*

Опр *Внешнее произведение дифференциальных форм*

Опр *Моном*

Опр *Внешний дифференциал*

Из определения внешнего дифференциала и линейности дифференциала скалярного поля следует линейность внешнего дифференциала формы

16.2 Внешний дифференциал дифференциальной формы, его независимость от локальной системы координат

Theorem *Об инвариантности внешнего дифференциала формы относительно ЛСК*

1. Сначала рассмотрим скалярное поле ($q = 0$), для которого утверждение верно из прошлых параграфов
2. В случае $q = 1$ покажем, что мы доказываем и заменим компоненты тензорного поля при замене ЛСК.
3. Сведём к доказываемому, преобразуем и проверим требуемое равенство
4. Переобозначим индексы суммирования, воспользуемся кососимметричностью и получим требуемое
5. Случай $q > 1$ рассматривается аналогично

17 Правило Лейбница для внешнего дифференциала внешнего произведения двух дифференциальных форм.

Theorem *Правило Лейбница для внешнего дифференциала.*

1. Запишем общий вид дифференциальной формы. В силу линейности достаточно рассмотреть суммы из одного слагаемого.
2. Используем определение внешнего дифференциала и правило Лейбница для скалярных полей
3. Далее используем свойство дифференциальных форм по перестановкам и получаем требуемое

18 Перенос касательных векторов. Выражение для переноса базисного вектора касательного пространства через частные производные координатных функций отображения

18.1 Перенос касательных векторов

Опр *Прямой перенос*

18.2 Выражение для переноса базисного вектора касательного пространства через частные производные координатных функций отображения.

Theorem *Выражение для прямого переноса базисного вектора касательного пространства через частные производные координатных функций отображения.*

1. Запишем переход к другой системе координат и преобразуем его
2. Последовательно используем определение прямого переноса, требованием, чтобы функция зависела от аргумента производной при дифференцировании, производной сложной функции и ещё раз определением прямого переноса

19 Перенос дифференциальных форм при отображении многообразий. Выражение для переноса базисного вектора кокасательного пространства через частные производные координатных функций отображения

19.1 Перенос дифференциальных форм при отображении многообразий

Опр *Дифференциал отображения, касательное отображение*

Опр *Обратный перенос*

19.2 Выражение для переноса базисного вектора кокасательного пространства через частные производные координатных функций отображения.

Theorem *Выражение для обратного переноса базисного вектора кокасательного пространства через частные производные координатных функций отображения*

20 Обратный перенос дифференциальных форм при суперпозиции отображений многообразий. Коммутативность операций внешнего дифференцирования и обратного переноса дифференциальной формы

20.1 Обратный перенос дифференциальных форм при суперпозиции отображений многообразий

Лемма 2

Первый пункт доказывается по конспекту, а второй лучше всего по лекции 9 (1:25:00)

20.2 Коммутативность операций внешнего дифференцирования и обратного переноса дифференциальной формы.

Theorem *О коммутативности внешнего дифференцирования и отображения обратного переноса.*

1. Рекомендуется доказывать по лекции 9 (1:50:00)
2. Сначала рассмотрим случай скалярной функции и воспользуемся определением дифференциала отображения и L_2
3. В общем случае рассмотрим лишь моном (из-за линейности). Запишем обратный перенос формы, возьмём дифференциал и применим правило Лейбница (для последнего и остальных слагаемого)
4. Второе слагаемое в этой формуле будет ноль, поэтому слагаемые будут "выноситься".
5. После вынесения всего воспользуемся случаем скалярной функции и получим требуемое.

Опр *Гладкое подмногообразие, каноническая ЛСК*

21 Теорема о разбиении единицы на многообразии

Опр *Компактное многообразие*

Лемма 1

1. Введём обозначение допустимой области параметров и x_0 .
2. Возьмём окрестность поменьше и воспользуемся леммой о функции шапочки. Соорудим новую функцию и обозначение и получим требуемое

Theorem *О разбиении единицы на многообразии*

1. Для любой точки выберем индекс окрестности, которой она принадлежит
2. В силу леммы найдутся окрестность поменьше и гладкая функция.
3. Выделим из компакта конечное подпокрытие и напишем пару следствий из леммы.
4. Введём гладкие функции γ , используя лишь оставшуюся нам часть от единицы. Посчитаем, как выглядит разность этих функций и единицы.
5. В силу второго следствия сумма $\gamma_i = 1$, но пока это разбиение не подчинено покрытию.
6. Введём новые множества S_i , затем определим ρ_i . Сумма таковых по всем картам и будет равна единице

22 Определение интеграла от дифференциальной формы и его корректность. Криволинейный и поверхностный интегралы второго рода

22.1 Определение интеграла от дифференциальной формы и его корректность

Опр Носитель дифференциальной формы

Опр Финитная дифференциальная форма

Опр Интеграл от дифференциальной формы по допустимой области параметров

Опр Интеграл от дифференциальной формы с носителем в районе действия одной карты

Лемма

Благодаря лемме, можно сделать вывод, что оба определения интеграла совпадают (достаточно взять стандартную ЛСК)

Опр Интеграл от дифференциальной формы по гладкому многообразию.

Theorem Корректность определения интеграла

1. Существование интеграла следует из разбиения единицы, поэтому осталось доказать независимость от атласа.
2. Введём новую функцию ρ_{ij} и требуемые суммы просуммируем в нужном порядке. Используя линейности и выражение для суммы ρ_{ij} , получим равенство

Благодаря лемме, можно сделать вывод, что определения 2 и 3 интеграла совпадают (достаточно взять одну карту)

22.2 Криволинейный и поверхностный интегралы второго рода

Опр Криволинейный интеграл второго рода

Для него можно получить формулу через интеграл для отрезка. Для этого достаточно ввести гладкую параметризацию и перейти к другим координатам

Опр Поверхность, поверхностный интеграл второго рода

Для него можно получить формулу через кратный интеграл по "допустимой области". Аналогично криволинейному случаю меняем переменные, применяем теорему о координатном представлении обратного переноса дифференциальной формы и соединяем всё в один интеграл

23 Теорема Стокса.

Theorem Стокса.

24 Условия независимости криволинейного интеграла от пути интегрирования. Связь условий точности и замкнутости дифференциальных форм

24.1 Условия независимости криволинейного интеграла от пути интегрирования

Опр Точная форма, обобщённый потенциал

Опр Потенциальное ковекторное поле, скалярный потенциал.

Theorem Условия независимости криволинейного интеграла от пути интегрирования

1. $3 \Rightarrow 2$: используя представление через компоненты, сведём к производной по времени и после интегрирования получим зависимость от концов, которые совпадают в случае замкнутости.
2. $2 \Rightarrow 1$: тривиально следует после смены ориентации второй кривой.
3. $1 \Rightarrow 3$: фиксируем точку и вводим скалярный потенциал.
4. Введём новые кривые и сведём интеграл по кривой к разности этого потенциала.

5. Теперь рассмотрим малое приращение δ вдоль одной координаты i . Интеграл всей формы обнулится, за исключением компоненты с i .
6. Воспользуемся малостью δ , потом вычислим производную и получим требуемое после цепочки равенств

24.2 Связь условий точности и замкнутости дифференциальных форм

Опр *Замкнутая форма*

Лемма

Необходимость очевидна. Недостаточность докажем от противного, рассмотрев форму дифференциала частного и её интеграл по тригонометру

25 Теорема о цепном равенстве. Лемма Пуанкаре

25.1 Теорема о цепном равенстве

Лемма *О цепном равенстве.*

1. Рекомендуется доказывать по лекции 11 (2:30:00)
2. Введём ЛСК, запишем два возможных вида дифференциальной формы β и определим действие на них. В результате получим линейное отображение.
3. Рассмотрим действие на формах с dt и докажем для них цепное равенство. Аналогично для форм без dt
4. Любая форма может быть представлена как сумма конечного числа слагаемых с и без dt , поэтому доказано

Опр *Стягиваемое в точку многообразие*

Опр *Выпуклое множество*

25.2 Лемма Пуанкаре.

Theorem *Лемма Пуанкаре*

1. Из точности замкнутость следует всегда, поэтому доказываем лишь в обратную сторону.
2. Воспользуемся определением стягиваемости и рассмотрим дифференциальную форму β
3. Применим лемму о цепном равенстве, преобразуем и получим требуемое равенство, из которой следует точность

26 Риманова метрика. Выражение для индуцированной римановой метрики в полярной системе координат на плоскости и сферической системе координат в трехмерном пространстве

26.1 Риманова метрика

Опр *Риманова метрика или (ковариантный) метрический тензор*

Опр *Риманово многообразие*

Опр *Скалярное произведение*

Опр *Длина, угол*

Опр *Матрица Грама на Риманово многообразии*

Опр *Индукцированная метрика*

26.2 Выражение для индуцированной римановой метрики в полярной системе координат на плоскости и сферической системе координат в трехмерном пространстве

Найдём компоненты метрического тензора индуцированной метрики. В итоге, матрица Грама индуцированной метрики определяется через матрицу Якоби гомеоморфизма карты

Теперь можно вычислить матрицы Грама некоторых часто используемых метрик

Опр Первая квадратичная форма (гипер) поверхности

Первая квадратичная форма является значением тензора, то она не зависит от ЛСК на поверхности

27 Определение формы Риманова объёма и ее связь с дифференциальной формой (тензором Леви-Чивиты). Определение интеграла первого рода скалярной функции по гладкому многообразию. Поток векторного поля через двумерное ориентированное подмногообразие пространства R^3 , выражение потока через интеграл от дифференциальной формы и интеграл первого рода

27.1 Определение формы Риманова объёма и ее связь с дифференциальной формой (тензором Леви-Чивиты)

Опр n -мерный параллелепипед в пространстве R^N , n -мерный объём

Опр Форма Риманова объёма

Опр Тензор Леви-Чивиты

Theorem О тензоре Леви-Чивиты

Достаточно показать, что при замене ЛСК значение формы не меняется

Опр Символ Леви-Чивиты

27.2 Определение интеграла первого рода скалярной функции по гладкому многообразию.

Опр Интеграл первого рода

Опр Риманов объём, площадь поверхности

Пример Длина кривой

Пример Площадь поверхности

27.3 Поток векторного поля через двумерное ориентированное подмногообразие пространства R^3 , выражение потока через интеграл от дифференциальной формы и интеграл первого рода

Опр Поток векторного поля через поверхность.

Theorem О выражении потока векторного поля через интеграл от дифференциальной формы

28 Дивергенция и ротор векторного поля в области трехмерного евклидова пространства. Геометрический смысл дивергенции и ротора векторного поля. Условия существования скалярного и векторного потенциалов векторного поля в области трехмерного евклидова пространства

28.1 Дивергенция и ротор векторного поля в области трехмерного евклидова пространства

Опр Свёртка тензора

Опр Свёртка тензорного поля

Опр Свёртка тензоров (или тензорных полей)

Опр Операция опускания индекса

Опр Контравариантный метрический тензор

Опр Ковариантные компоненты векторного поля

Опр Криволинейным интегралом второго рода

Опр Смешанное и векторное произведение векторных полей

Данные определения соответствуют стандартным определениям этих понятий

Опр Градиент

Опр Дивергенция

Опр Ротор (вихрь)

Лемма 1

Используем правило Лейбница; в последнем пункте следует перейти к рассмотрению отдельной компоненты

Лемма 2

1. В первом пункте перейдём к рассмотрению отдельной компоненты и получим смешанную частную производную.
2. Изменим порядок дифференцирования и изменится знак. Получили, что компонента равна минус себе, что возможно лишь в нулевом случае
3. Во втором пункте действуем в лоб и сводим к первому пункту
4. В третьем в лоб

Опр Оператор Гамильтона

28.2 Геометрический смысл дивергенции и ротора векторного поля.

Theorem Геометрическое определение дивергенции.

Theorem Геометрическое определение ротора

28.3 Условия существования скалярного и векторного потенциалов векторного поля в области трехмерного евклидова пространства

Опр Скалярный потенциал

Опр Бизвихревое поле.

Theorem О существовании скалярного потенциала

Опр Векторный потенциал

Опр Бездивергентное поле.

Theorem О существовании векторного потенциала

29 Определение производной Ли тензорного поля через его обратный перенос фазовым потоком. Выражение компонент производной Ли тензорного поля по векторному полю через компоненты этих полей. Выражение производной Ли для тензорных полей типов $(0,0)$, $(1,0)$ и $(0,1)$

29.1 Определение производной Ли тензорного поля через его обратный перенос фазовым потоком

Опр Производная семейства тензорных полей в точке

Опр Фазовый поток

Опр Производная Ли

29.2 Выражение компонент производной Ли тензорного поля по векторному полю через компоненты этих полей

Лемма

1. Рекомендуется доказывать по лекции 14 (2:35:00)

2. Выразим $y(x)$ через координатное представление потока и запишем обратный перенос тензорного поля фазового потока.
3. Возьмём $\frac{dy_t(x_0)}{dt}$ и разложим $y_t(x_0)$ по формуле Тейлора полностью и по координатам.
4. Выразим отсюда компоненты обратного переноса явно и с помощью обратных матриц и разложения по Тейлору.
5. Подставим всё в обратный перенос и перемножим скобки с точностью до $o(t)$. Используем свойство символа Кронекера и получаем итоговую формулу

29.3 Выражение производной Ли для тензорных полей типов $(0,0)$, $(1,0)$ и $(0,1)$

Пример Производная Ли скалярного поля

Опр Первый интеграл

Пример Производная Ли векторного поля

Пример Производная Ли ковекторного поля

30 Коммутативность производной Ли и внешнего дифференциала формы.

Theorem О коммутативности производной Ли и внешнего дифференцирования

31 Правило Лейбница для внутреннего произведения векторного поля на внешнее произведение двух дифференциальных форм

Опр Внутреннее произведение.

Theorem Правило Лейбница для внутреннего умножения

32 Магическое тождество Картана.

Theorem Тождество Картана (формула гомотопии)

Доказывается аналогично правилу Лейбница для внутреннего умножения