

常用公式（答案版）

1.完全平方公式： $(a \pm b)^2 = a^2 + b^2 \pm 2ab$

平方差公式： $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$

立方和公式： $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$

立方差公式： $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$

2.分母（分子）有理化：

分母有理化： $\frac{1}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a} + \sqrt{b}}{(\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b})} = \frac{\sqrt{a} + \sqrt{b}}{a - b}$

分子有理化： $\sqrt{a} - \sqrt{b} = \frac{(\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b})}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \frac{a - b}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}$

3.指数运算法则

(1) $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ ；

(2) $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ ；

(3) $(a^m)^n = a^{mn}$

(4) $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$

4.对数运算法则

常用：(1) $\log_e x = \ln x (\ln 1 = 0)$ ； (2) $\log_{10} x = \lg x (\lg 1 = 0)$ ；

(3) $\log_a MN = \log_a M + \log_a N (M > 0, N > 0)$

(4) $\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N (M > 0, N > 0)$

(5) $\log_a M^k = k \log_a M, a^{\log_a M} = M, \log_a a^x = x (M > 0)$

(6) $\log_a a = 1, \log_a 1 = 0$

5.指数数和对数函数的关系： $a^x = b \Leftrightarrow x = \log_a b$, $\log_a x = b \Leftrightarrow x = a^b$

6. 三角函数公式

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \quad \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}, \quad \sec x = \frac{1}{\cos x}, \quad \csc x = \frac{1}{\sin x}. \quad (\text{切割化弦})$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1, \quad 1 + \tan^2 x = \sec^2 x, \quad 1 + \cot^2 x = \csc^2 x,$$

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x.$$

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x.$$

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}, \quad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}. \quad (\text{降幂公式})$$

$$\sin^2 \frac{x}{2} = \frac{1 - \cos x}{2}, \quad \cos^2 \frac{x}{2} = \frac{1 + \cos x}{2}. \quad (\text{降幂公式})$$

7. $\arcsin x$ 的定义域为 $[-1, 1]$; 值域为 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

$\arccos x$ 的定义域为 $[-1, 1]$; 值域为 $[0, \pi]$

$\arctan x$ 的定义域为 $(-\infty, +\infty)$; 值域为 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$

$\operatorname{arccot} x$ 的定义域为 $(-\infty, +\infty)$; 值域为 $(0, \pi)$

8. 已知直线通过点 $A(x_0, y_0)$, 直线斜率为 k , 则直线方程为: $y - y_0 = k(x - x_0)$

9. 抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 的顶点坐标为 $(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac - b^2}{4a})$

10. 令 $ax^2 + bx + c = 0$ 得方程的根为 $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$