


Поле вращается вместе с полем, результирующее поле имеет следующие свойства: $\vec{E} = \vec{E}_B + \vec{E}_0$



$$U_H = b \cdot E_B = b \cdot \partial B = b \frac{j}{en} B$$

$$U_H = R \cdot b j B; \quad R = \frac{1}{en} - \text{const Холла}$$

$$\sigma = en \frac{U}{E_0} = \frac{U_H}{R} - \text{электропроводность}$$


$U_H = \frac{\partial \varphi}{E_0}$ - напряженность полей, числ. равна скорости, которую они приобретают в з.п.

$$\sigma = \frac{U_H}{R}$$

$$LE = 1 \frac{B}{en}$$

Закон Био-Савара-Лапласа

Универсальная круговая форма. Закон Ампера. Макс. и. Вектор ело




$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} dq \frac{\vec{j} \times \vec{r}}{r^3}$$

$$d\vec{T} = \vec{I} d\vec{l}$$

$$\rho = \frac{dq}{dV}; \quad dq = \rho dV; \quad \rho \vec{j} = \frac{d\varphi N}{d\varphi} = dq n$$


$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \rho \frac{\vec{j} \times \vec{r}}{r^3} \cdot dV = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{\vec{j} \times \vec{r}}{r^3} dV$$

или можно $\vec{j} \cdot dV = \vec{I} \cdot d\vec{l}; \quad d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} I \cdot \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$



связан в возмущении на ток. у.
проб-на с тока, помех. в пересечении
магн. поле, разности потенциалов,
пропорциональной величине тока I и
индукции B .

$F_H = e \cdot u_B$ приводит к отклонению
эл-ов от прямо-го движения и возникновению
создаёт систему зарядов.



Перераспределение
зарядов создаёт
попер-ость

$\vec{u}_H$ $\vec{E}_B$