



Сильные магнитные составы
 обл. к-е не воз. фазовыми с
 магн. хар. к-е - намагниченно.



Осн. св-ва магнитных фазов:

- 1) ориентация по вн. магн. полю
- 2) увелич. обл. за счёт расширения соседних фазов



Условия НА ГРАНИЦЕ ИЗЛУЧ МАГНЕТИКОВ


Исследуют векторы вблизи грани-
 цы раздела 2-х сред, к-ой
 описывается ток проводимости

1. Теорема о циркуляции H

$$\oint_{ABCD} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_{-a}^{+a} \vec{H} \cdot d\vec{l} +$$

$$+ \int_0^a \vec{H}_1 \cdot d\vec{l}_1 + \int_{-a}^0 \vec{H} \cdot d\vec{l}_2$$

$$+ \int_0^a \vec{H}_2 \cdot d\vec{l}_2$$



Рассмотрим прямоуго-
 льник, у к-го
 AD, BC - 0; AB = DC = a

$$\oint_{ABCD} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_0^a H_{1r} \cdot dl + \int_0^a H_{2r} \cdot dl =$$


$$= a (H_{1r} - H_{2r}) = 0$$

Проекция H12 в области между AB
 будет одинаковой:


$$H_{1\tau} = H_{2\tau}, \quad \frac{B_{1\tau}}{\mu_1 \mu_0} = \frac{B_{2\tau}}{\mu_2 \mu_0}$$

2. Т Теорема Гаусса для вектора $\vec{B}$

$$\oint_{SG} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \oint B_n \cdot dS = \int_{B_{1n}} B_{1n} \cdot dS + \int_{B_{2n}} B_{2n} \cdot dS = 0 \quad \text{так}$$



$$B_{1n} = B_{2n}$$



$$\begin{aligned} \tan \alpha_2 &= \frac{B_{2\tau}}{B_{2n}} = \frac{B_{1\tau}}{B_{1n}} = \tan \alpha_1 \\ &= \frac{B_{2\tau}}{B_{1\tau}} = \frac{\mu_2}{\mu_1} \end{aligned}$$

Звешение электромагнитной индукции.

Правильно лемма
Собственные токи в контуре
отсутствуют указательно. $\vec{B}$

замкнутый провод. контуре
при всяком изм. потока магн.
индукции через пов-ть огранич.
элемент контура, возникает эл.
ток

$$E_i = - \frac{d\Phi}{dt}$$

Правильно лемма: индукционный
ток всегда возникает так, чтобы
противодействовать причине, его
вызывающей.

ЭДС числ. = работе по перемеще-
нию ед. позит. заряда по зк. По
происхождению работа соверш.
силами неэлектр. природы.

$$E_i \neq \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

Причины возникновения
индукт. тока в замкнутом
проводнике в магнитном поле