

$$\vec{P} = \frac{1}{\Delta V} \sum_{i=1}^N \vec{p}_i = \frac{N}{\Delta V} \frac{\sum_{i=1}^N \vec{p}_i}{N} = n \cdot \langle \vec{p} \rangle$$

$\vec{P}$ — вектор поляризации
 $\frac{1}{\Delta V}$ — среднее значение
 $\frac{\sum \vec{p}_i}{N}$ — среднее дипольный момент
 n — концентрация молекул

Механизмы поляризации неполярных молекул

1. Электронный механизм поляризации



при наложении поперечного электр. смещаются внеш.

$$\vec{F} = -e\vec{E}$$

2. Ионный ($H_2, O_2, \dots$ простые)

Когда ионы молекулы или атома смещаются под действием эл. поля образуя диполь

Если объект с гомогенной имеет пространственное разделение атомов то называется ориентационной

☞

1. у изотропных диэлектриков вектор поляризации линейно зависит от напря. поля

$$\vec{P} = \chi \epsilon_0 \vec{E} \quad \text{— уравнение}$$

χ — диэлектрическая восприимчивость

это происходит с эл. полем внутри диэлектрика!

(Взаимные заряды создают эл. поле $\vec{E}$, к-ое внутри диэлектрика направлено против внешнего напря. $\vec{E}$ внешнего поля. Этот процесс называется поляризацией диэлектрика. В результате полное эл. поле $\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}$ по модулю меньше чем $\vec{E}_0$)