

Katedra informatiky  
Přírodovědecká fakulta  
Univerzita Palackého v Olomouci

# BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Přesné výpočty s reálnými čísly



2021

Ondřej Slavík

Vedoucí práce:  
doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.

Studijní obor:  
Informatika, prezenční forma

## **Bibliografické údaje**

Autor:	Ondřej Slavík
Název práce:	Přesné výpočty s reálnými čísly
Typ práce:	bakalářská práce
Pracoviště:	Katedra informatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Rok obhajoby:	2021
Studijní obor:	Informatika, prezenční forma
Vedoucí práce:	doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.
Počet stran:	78
Přílohy:	1 CD/DVD
Jazyk práce:	český

## **Bibliographic info**

Author:	Ondřej Slavík
Title:	Precise computation of real numbers
Thesis type:	bachelor thesis
Department:	Department of Computer Science, Faculty of Science, Palacký University Olomouc
Year of defense:	2021
Study field:	Computer Science, full-time form
Supervisor:	doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.
Page count:	78
Supplements:	1 CD/DVD
Thesis language:	Czech

## Anotace

*Fenomén vyčíslitelnosti reálných čísel provází každého informatika, který se někdy snažil používat počítač k počítání. Jakmile se totiž musíme spolehnout na výpočty s čísly uloženými jako hodnoty, narážíme na limity přesnosti a rozsahu takto reprezentovaných čísel. Řešením není zpřesňování pomocí vyšší dotace paměťového prostoru (např. `binary32`  $\rightarrow$  `binary64`) a související změna architektury systému, nýbrž fundamentální změna v přístupu k vyčíslení reálných čísel. Tato práce dává návod, jak takovýto přístup přijmout, a přináší knihovnu, která umožňuje základní výpočty a vyčíslení reálných čísel.*

## Synopsis

*The Real Numbers' computation phenomenon meets every single computer scientist trying to use computer to compute. When one needs to trust to calculations of numbers saved with their values, the limitations of these numbers' precisivity and range appear. The solution is not to assign more memory (e.g. `binary32`  $\rightarrow$  `binary64`) and linked swap of system's architecture but fundamental switch in approach to real numbers' computations. The Work gives a guideline how to admit the access and brings library providing basic real numbers' enumeration and calculation.*

**Klíčová slova:** reálná čísla, funkce, Lisp, líné vyhodnocování, libovolná přesnost

**Keywords:** real numbers, functions, Lisp, lazy evaluation, arbitrary precision

Mockrát děkuji doc. RNDr. Michalu Krupkovi, Ph.D. za vedení práce a rodině za podporu.

*Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou práci včetně příloh vypracoval/a samostatně a za použití pouze zdrojů citovaných v textu práce a uvedených v seznamu literatury.*

datum odevzdání práce

podpis autora

# Obsah

<b>0</b>	<b>Úvod</b>	<b>1</b>
<b>I</b>	<b>Teorie</b>	<b>2</b>
<b>1</b>	<b>Čísla</b>	<b>2</b>
1.1	Přirozená čísla . . . . .	3
1.2	Vyšší obory čísel . . . . .	5
1.3	Operace s čísly . . . . .	6
1.4	Funkce čísel . . . . .	7
<b>2</b>	<b>Čísla v počítači</b>	<b>11</b>
2.1	Čísla uložená jako hodnoty . . . . .	11
2.1.1	Vážený poziční kód . . . . .	11
2.1.2	Záporná čísla . . . . .	11
2.1.3	Plovoucí řádová tečka . . . . .	12
2.2	Přesná reprezentace čísel jako hodnot . . . . .	12
2.2.1	Přirozená čísla . . . . .	12
2.2.2	Celá čísla . . . . .	13
2.2.3	Racionální čísla . . . . .	14
2.3	Přesná reprezentace čísel jako struktur . . . . .	14
2.3.1	Přirozená čísla . . . . .	15
2.3.2	Celá čísla . . . . .	15
2.3.3	Racionální čísla . . . . .	15
2.4	Reálná čísla . . . . .	16
2.4.1	Představa . . . . .	16
2.4.2	Existující nástroje . . . . .	17
<b>II</b>	<b>Implementace</b>	<b>22</b>
<b>3</b>	<b>Tnumy</b>	<b>22</b>
3.1	Vztah čísel a tnumů . . . . .	22
3.2	Ludolfovo číslo . . . . .	24
3.3	Přenasobování numem . . . . .	25
<b>4</b>	<b>Operace tnumů</b>	<b>27</b>
4.1	Aditivní operace . . . . .	27
4.2	Multiplikativní operace . . . . .	28
4.3	Mocninné operace . . . . .	34

<b>5</b>	<b>Funkce tnumů</b>	<b>35</b>
5.1	Aproximace funkcí . . . . .	35
5.2	Exponenciála . . . . .	36
5.2.1	Exponenciála čísla . . . . .	37
5.2.2	Exponenciála tnumu . . . . .	39
5.3	Goniometrické . . . . .	43
5.3.1	Sinus . . . . .	43
5.3.2	Kosinus . . . . .	44
5.3.3	Další goniometrické funkce . . . . .	45
5.4	Logaritmus . . . . .	46
<b>III</b>	<b>Rozhraní</b>	<b>49</b>
<b>6</b>	<b>Uživatelské funkce</b>	<b>49</b>
6.1	Instalace . . . . .	49
6.2	Převody a konstanty . . . . .	50
6.3	Operace . . . . .	52
6.4	Funkce . . . . .	53
6.5	Rychlost . . . . .	54
6.6	Vnější volání . . . . .	54
<b>7</b>	<b>Diskuze</b>	<b>56</b>
7.1	Optimalizace . . . . .	56
7.1.1	Paralelizace . . . . .	56
7.1.2	Databáze . . . . .	56
7.2	Peripetie . . . . .	57
7.2.1	Ideové . . . . .	58
7.2.2	Matematické . . . . .	58
7.2.3	Implementační . . . . .	59
7.2.4	Mezery . . . . .	59
7.3	. . . . .	60
7.3.1	Kontext knihovny . . . . .	60
7.3.2	Kontext práce . . . . .	60
7.3.3	Adakvátnost . . . . .	61
	<b>Závěr</b>	<b>62</b>
	<b>Conclusions</b>	<b>63</b>
	<b>Seznam literatury</b>	<b>64</b>
<b>A</b>	<b>Obsah přiloženého CD/DVD</b>	<b>67</b>

## Seznam tabulek

1	Symboly operací s čísly . . . . .	6
2	Nekonečná vstupně/výstupní tabulka funkce <i>sinus</i> . . . . .	7
3	Doba výpočtů daných výrazů . . . . .	54
4	Funkce nabízené knihovnou <code>tnums</code> . . . . .	55

## Seznam obrázků

1	Seřazení bitů v datovém typu <code>binary32</code> [19] . . . . .	12
2	Přirozená čísla v jazyce C . . . . .	13
3	Celá čísla v jazyce C . . . . .	13
4	Racionální čísla v jazyce C . . . . .	14
5	Používání knihovny <code>mpmath</code> . . . . .	18
6	Používání knihovny <code>JSscience</code> . . . . .	18
7	Používání knihovny <code>GMP</code> . . . . .	19
8	Implicitní používání knihovny <code>CLN</code> . . . . .	20
9	Používání knihovny <code>computable-reals</code> . . . . .	21
10	Obraz přesnosti po průchodu exponenciálou . . . . .	39
11	Vzor přesnosti před průchodem exponenciálou . . . . .	40
12	Zobrazení neznámé $w$ . . . . .	41
13	Načtení knihovny <code>tnum</code> do SBCL . . . . .	50

## Seznam definic

1	Definice (Číslo – naivní [1]) . . . . .	2
4	Definice (Induktivní množina) . . . . .	4
5	Definice (Přirozená čísla) . . . . .	4
8	Definice (Uspořádaná $n$ -tice [4]) . . . . .	7
9	Definice (Kartézský součin [12] [13]) . . . . .	7
11	Definice (Relace [12]) . . . . .	8
12	Definice (Zobrazení [12]) . . . . .	8
13	Definice (Reálná posloupnost [12]) . . . . .	8
14	Definice (Nekonečná číselná řada [15]) . . . . .	8
15	Definice (Posloupnost částečných součtů [15]) . . . . .	8
16	Definice (Konvergence řady [15]) . . . . .	8
17	Definice (Divergence řady [15]) . . . . .	8
18	Definice (Zbytek po $n$ -tém členu řady [15]) . . . . .	8
19	Definice (Reálná funkce reálné proměnné [14]) . . . . .	9
21	Definice (Mocninná řada [15]) . . . . .	9
22	Definice (Taylorova řada [15]) . . . . .	9
23	Definice (Geometrická řada [15]) . . . . .	9
29	Definice (Tnum) . . . . .	22
32	Definice (Ludolfovo číslo [30]) . . . . .	24
39	Definice (Nenulový tnum) . . . . .	28
40	Definice (Bezpečné epsilon) . . . . .	29
57	Definice (Precizní iterátor exponenciály) . . . . .	42
73	Definice (Zlatý řez [37]) . . . . .	52



## Seznam faktů

24	Fakt (Částečný součet geometrické řady [15]) . . . . .	9
25	Fakt (Geometrická řada) . . . . .	10
26	Fakt (Zbytek geometrické řady) . . . . .	10
33	Fakt (Ludolfovo číslo jako řada [32]) . . . . .	24
38	Fakt (Rozdíl tnumů) . . . . .	28
44	Fakt (Součin tnumů) . . . . .	33
45	Fakt (Podíl tnumů) . . . . .	34
47	Fakt (Odmocnina jako mocnina [7]) . . . . .	34
49	Fakt (Taylorova věta [35]) . . . . .	36
51	Fakt (Exponenciála jako Maclaurinova řada [15]) . . . . .	37
52	Fakt (Omezení Taylorova zbytku exponenciály) . . . . .	37
59	Fakt (Sinus jako Maclaurinova řada [15]) . . . . .	43
62	Fakt (Kosinus jako Maclaurinova řada [15]) . . . . .	44
64	Fakt (Tangens jako poměr sinu a kosinu [7]) . . . . .	45
66	Fakt (Kosekans jako obrácená hodnota sinu [7]) . . . . .	46
67	Fakt (Sekans jako obrácená hodnota kosinu [7]) . . . . .	46
68	Fakt (Kotangens jako obrácená hodnota tangentu [7]) . . . . .	46
69	Fakt (Logaritmus jako řada [36]) . . . . .	46
70	Fakt (Tnum logaritmu numu) . . . . .	47
71	Fakt (Tnum logaritmu tnumu) . . . . .	47
74	Fakt (Obecný logaritmus jako podíl přirozených [7]) . . . . .	53

## Seznam vět a lemmat

30	Lemma (O numu jako tnumu) . . . . .	23
31	Lemma (O převodu tnumu na num) . . . . .	23
35	Věta (O přenásobení tnumu racionální konstantou) . . . . .	25
37	Věta (O součtu tnumů) . . . . .	27
41	Lemma (O nenulovém tnumu nenulového čísla) . . . . .	29
42	Věta (O převráceném tnumu) . . . . .	29
43	Věta (O součinu dvou tnumů) . . . . .	31
46	Lemma (O mocnině tnumu) . . . . .	34
56	Lemma (O přesnosti závislé proměnné) . . . . .	42
61	Lemma (O sinu tnumu) . . . . .	44

## Seznam zdrojových kódů

1	Lispový kód (num-to-tnum) . . . . .	23
2	Lispový kód (rat-expt) . . . . .	23
3	Lispový kód (tnum-to-num) . . . . .	23
4	Lispový kód (tnum-pi) . . . . .	25
5	Lispový kód (tnum*num) . . . . .	26
6	Lispový kód (-tnum) . . . . .	26
7	Lispový kód (tnum+) . . . . .	28
8	Lispový kód (tnum-) . . . . .	28
9	Lispový kód (get-nonzero-num+eps) . . . . .	29
10	Lispový kód (/tnum) . . . . .	30
11	Lispový kód (create-list-for-multiplication) . . . . .	33
12	Lispový kód (tnum*) . . . . .	33
13	Lispový kód (tnum/) . . . . .	34
14	Lispový kód (factorial) . . . . .	35
15	Lispový kód (num-exp) . . . . .	38
16	Lispový kód (tnum-e) . . . . .	38
17	Lispový kód (tnum-exp) . . . . .	42
18	Lispový kód (num-sin) . . . . .	43
19	Lispový kód (tnum-sin) . . . . .	44
20	Lispový kód (num-cos) . . . . .	45
21	Lispový kód (tnum-cos) . . . . .	45
22	Lispový kód (tnum-tan) . . . . .	46
23	Lispový kód (tnum-csc) . . . . .	46
24	Lispový kód (tnum-sec) . . . . .	46
25	Lispový kód (tnum-ctan) . . . . .	46
26	Lispový kód (num-ln) . . . . .	47
27	Lispový kód (tnum-ln) . . . . .	48
28	Lispový kód (tnum-expt) . . . . .	48
29	Lispový kód (tnum-root) . . . . .	48
30	Lispový kód (tnum-to-string) . . . . .	51
31	Lispový kód (tnum-1+) . . . . .	52
32	Lispový kód (tnum-1-) . . . . .	52
33	Lispový kód (tnum-sqrt) . . . . .	52
34	Lispový kód (tnum-phi) . . . . .	53
35	Lispový kód (tnum-log) . . . . .	53

## Seznam testů

1	Lispový test (num-to-tnum) . . . . .	50
2	Lispový test (tnum-to-num) . . . . .	50
3	Lispový test (Typ výstupu je číslo) . . . . .	51
4	Lispový test (tnum-string a tnum-pi) . . . . .	51

5	Lispový test ( <code>tnum-string</code> a <code>tnum-e</code> ) . . . . .	52
6	Lispový test ( <code>tnum-phi</code> ) . . . . .	53
7	Lispový test ( <code>tnum-log</code> ) . . . . .	53
8	Lispový test ( <code>tnum-sin</code> ) . . . . .	54

## Seznam zbytku

2	Příklad (Nejnižší přirozená čísla coby množiny) . . . . .	3
3	Poznámka (Provázání hodnot a podmnožin) . . . . .	3
6	Poznámka (Značení přirozených čísel) . . . . .	5
7	Poznámka (Nula je přirozená) . . . . .	5
10	Poznámka (Množinovitost kartézského součinu) . . . . .	7
20	Příklad (Sinus jako zobrazení) . . . . .	9
27	Příklad (Převod z váženého pozičního kódu) . . . . .	11
28	Příklad (Plovoucí číslo – jednoduchá přesnost) . . . . .	12
34	Důsledek (Tnum Ludolfova čísla) . . . . .	24
36	Důsledek (Opačný tnum) . . . . .	26
48	Připomenutí (Taylorova a Maclaurinova řada) . . . . .	35
50	Poznámka (Značení exponenciály) . . . . .	36
53	Důsledek (O tnumu exponenciály numu) . . . . .	37
54	Poznámka (Eulerovo číslo jako exponenciála) . . . . .	38
55	Poznámka (Obecnější přesnost vzoru) . . . . .	41
58	Důsledek (O exponenciále tnumu) . . . . .	42
60	Důsledek (Sinus numu) . . . . .	43
63	Důsledek (Kosinus numu) . . . . .	44
65	Úmluva (O vypuštění některých důsledků) . . . . .	45
72	Poznámka (Dokončení systému) . . . . .	48

## 0 Úvod

Funkcionální programování umožňuje důsledně popsat matematický svět, což v této práci bude ukázáno na příkladu výpočtů reálných čísel. Jako funkcionální jazyk byl zvolen Common Lisp (Lisp) pro jeho syntaktickou jednoduchost, dynamičnost a lenost. Každý Lispový kód následuje vždy za matematickým výrazem a ve stejném znění ho převádí. Lisp představuje nástroj, pomocí něhož realizujeme matematické výpočty, hlavním těžištěm poznání je ale vybudovaná matematická teorie, která není specifická pro konkrétní programovací jazyk.

V první části je teoreticky popsáno, co čísla jsou a jak se rozvrstvují podle vlastností na obory. Také je zde ukázáno, jak se s čísly operuje a je představen pojem zobrazení a jeho dva důležité typy – funkce a posloupnost. Je zde zavedena stěžejní představa, co znamená přesná reprezentace čísla pro jeho různé podoby a představeno několik existujících knihoven.

Ve druhé části práce je popsána konstrukce knihovny `tnums` přesně vyčíslicí reálná čísla. Je využita existence racionálních čísel v Lispu a přidáno Ludolfovo číslo. Zavedená čísla jsou poté kombinována operacemi a měněna svými funkcemi, v návaznosti na to je zavedeno Eulerovo číslo.

V závěrečné části je uvedeno praktické užití řešení a vymezen pojem uživatelské funkce. Je zde ukázáno, jak lze takové funkce přidávat, a je zde demonstrováno, že některé vznikly mimoděk už při programování. Také doplníme poslední konstantu, a to Zlatý řez. V poslední kapitole je představena možnost napsání přesné kalkulačky, nápady na urychlení práce knihovny `tnums` a nakonec její nedostatky.

## Značení

□	konec důkazu
■	konec poznámky
modré pozadí	obrázek
nachové pozadí	tabulka
$(a, b)$	otevřený interval mezi $a$ a $b$
$[a, b]$	uzavřený interval mezi $a$ a $b$
$\rightarrow$	logická implikace nebo „do“
$\leftrightarrow$	logická ekvivalence
$\Leftrightarrow$	„právě tehdy, když“
$\cup$	množinové sjednocení
$\cap$	množinový průnik
$ a $	absolutní hodnota čísla $a$
$:=$	přiřazení
$\frac{d}{dx}f(x)$	derivace funkce $f$ v bodě $x$ , je-li jasná proměnná, pak jen $f'(x)$ .

# Část I

## Teorie

V teoretické části je představena axiomatická teorie množin a naznačeno, jak se z ní dají vytvořit čísla. Je ukázáno, že čísla jsou množinami. Poté stručně představím matematické operace a matematické funkce. Dále vyplyne, že jakékoli číslo lze vyjádřit jako funkci a že funkce je také množina. Závěr teoretické části je zaměřen na problém uložení čísla v paměti počítače, která je fyzicky konečná. Nejprve je rozebrán v čistě teoretické rovině a poté je diskutováno řešení v podobě reálně existujících knihoven.

## 1 Čísla

Číslo je matematický objekt, který na intuitivní úrovni všichni chápeme. To znamená, že každý dokáže o libovolném objektu říci, zda se jedná o číslo, nebo nikoli, a všichni se na tom shodneme. Je číslem 3? Je číslem 2.999...? Je číslem  $e$ ?

Vágní pokus o definici by mohl vypadat tak jako na české wikipedii:

**Definice 1 (Číslo – naivní [1]).** *Číslo je abstraktní entita užívaná pro vyjádření množství nebo pořadí.*

Uvedená definice přiřazuje číslům dvě funkce – kardinální a ordinální. Jinak o povaze čísel neříká mnoho. Víme, že je to abstraktní entita – to znamená, že ji nelze zapsat samu o sobě, ale je třeba použít nějaký symbol. Symbolem reprezentujícím číslo tři je 3,  $\frac{6}{2}$  nebo třeba i 2.999... Symbolický zápis čísla zřejmě není jednoznačný. 3 není to samé jako 2.999..., ale číslo 3 je to samé jako číslo 2.999... Z toho plyne, že symbol s referencí na nějakou entitu a tato entita samotná se od sebe liší. Alenka takhle zjistila rozdíl mezi tím, jak se říká názvu písně, jaké je její jméno, jak se píseň jmenuje a co píseň opravdu je [2]. Známe-li rozdíl mezi koncepty čísla a symbolu, který ho reprezentuje, je možné využít pro reprezentaci čísel i jiné symboly než číslice jako jsou například písmena či složené matematické výrazy – například  $e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{n!}$ .

Číslo je tedy charakterizováno nikoli svým zápisem, ale svým obsahem. Tato vlastnost je společná s jinými matematickými objekty – s množinami. Množina je také dána svým obsahem, nikoli svým zápisem (této vlastnosti se říká princip extenzionality). Například  $\{0, 1, 2, 3\} = \{n | n \in \mathbb{N} \wedge n \leq 3\}$  je stejná množina zapsaná dvěma různými způsoby. Symbol „=” je tedy ekvivalence na hodnotách.

## 1.1 Přirozená čísla

Přirozená čísla jsou čísla, jejichž *kardinalita* určuje počet nedělitelných částí celku. Historicky asi vznikla nejdříve, proto se nazývají přirozená (anglicky *natural* – přírodní). Jedná se o čísla nula, jedna, dva, atd. Běžnými symboly těchto čísel jsou 0, 1, 2, atd. Vlastností přirozených čísel je, že *každé* číslo  $n$  má následníka. Toho značíme  $s(n)$  nebo  $n + 1$  [3].

Hodnota přirozeného čísla je počet entit v nějakém souboru – například počet krav ve stádu, počet prstů na ruce, nebo počet třešniček na dortu. *Následník* takového čísla značí, kolik entit bude v souboru, pokud se do stáda narodí další kráva, na ruku se přišije jeden prst nebo je do krému přidána další třešnička.

I přirozená čísla jsou *množiny*. Konkrétně v tomto textu je zavedu v Zermelově-Fraenkelově (ZF) axiomatici teorii množin. Je snadné nahlédnout, že stačí zkonstruovat číslo nula a *zobrazení*  $s$  přiřazující každému číslu následníka. Poté budeme mít celou nekonečnou množinu přirozených čísel zkonstruovanou. Protože se jedná o výklad teorie množin, celý zbytek této podkapitoly je pouze velmi stručný výtah z [4].

Definice přirozených čísel je induktivní a stojí na jednoduché myšlence Johna von Neumanna, že „přirozené číslo je množina všech menších přirozených čísel“. Číslo nula je zde prázdná množina značená 0,  $\emptyset$  nebo  $\{\}$ . Následník čísla je sjednocení čísla s množinou obsahující toto číslo, čili  $s(n) = n \cup \{n\}$ .

Několik nejmenších přirozených čísel vypadá tedy následovně.

PŘÍKLAD 2 (NEJNIŽŠÍ PŘIROZENÁ ČÍSLA COBY MNOŽINY).

$$0 = \emptyset \tag{1}$$

$$1 = s(0) = 0 \cup \{0\} = \emptyset \cup \{\emptyset\} = \{\emptyset\} \tag{2}$$

$$2 = s(1) = 1 \cup \{1\} = \{\emptyset\} \cup \{\{\emptyset\}\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\} \tag{3}$$

$$3 = s(2) = 2 \cup \{2\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\} \cup \{\{\emptyset, \{\emptyset\}\}\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\} \tag{4}$$

$$\begin{aligned} 4 = s(3) &= 3 \cup \{3\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\} \cup \{\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}\} = \\ &= \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}\} \end{aligned} \tag{5}$$

POZNÁMKA 3 (PROVÁZÁNÍ HODNOT A PODMNOŽIN). Všimněme si, že kardinalita v tomto pojetí znamená počet podmnožin, neboli číslo  $n$  má  $n$  podmnožin. Tím se provázaly dva zdánlivě cizí pojmy a sice *podmnožinovitost* a *hodnota* čísla. V tomto kontextu pak není překvapivá podobnost srovnávacích symbolů  $\subseteq$  a  $\leq$ .

■

Zermelova-Fraenkelova teorie stojí na následujících pěti axiomech a jednom axiomovém schématu (někdy uváděno jako 6 axiomů).

- Axiom extenzionality:  $(\forall u)((u \in x \leftrightarrow u \in y) \rightarrow x = y)$
- Axiom fundovanosti:  $(\forall a)(a \neq \emptyset \rightarrow (\exists x)(x \in a \wedge x \cap a = \emptyset))$
- Axiom sumy:  $(\forall a)(\forall b)(\exists z)(\forall x)(x \in z \leftrightarrow (x = a \vee x = b))$
- Axiom potence:  $(\forall a)(\exists z)(\forall x)(x \in z \leftrightarrow x \subset a)$
- Axiom nekonečna:  $(\exists z)(\emptyset \in z \wedge (\forall x)(x \in z \rightarrow x \cup \{x\} \in z))$
- Schéma axiomů nahrazení: Je-li  $\Psi(u, v)$  formule, která neobsahuje volné proměnné  $w$  a  $z$ , potom formule

$$(\forall u)(\forall v)(\forall w)((\Psi(u, v) \wedge \Psi(u, w)) \rightarrow v = w) \rightarrow \\ \rightarrow (\forall a)(\exists z)(\forall v)(v \in z \leftrightarrow (\exists u)(u \in a \wedge \Psi(u, v)))$$

je axiom nahrazení.

Z těchto axiomů je možné odvodit i (slabší) tvrzení, která se někdy přijímají jako axiomy a sice

- Axiom dvojice:  $(\forall a)(\forall b)(\exists z)(\forall x)(x \in z \leftrightarrow (x = a \vee x = b))$
- Schéma axiomů vydělení: Je-li  $\varphi(x)$  formule, která neobsahuje volnou proměnnou  $z$ , potom formule  $(\forall a)(\exists z)(\forall x)(x \in z \leftrightarrow (x \in a \wedge \varphi(x)))$  je axiom vydělení.

Z axiomů ZF je pro naše zkoumání důležitý například axiom nekonečna – existuje alespoň jedna (nekonečná) množina. Za pomoci dalších axiomů poté konstruujeme další prvky, jako třeba prázdnou množinu – tu dostaneme pomocí axiomu vydělení s jakoukoli množinou  $a$  a formulí  $\varphi(x) = x \neq x$  – prázdná množina je tedy  $\emptyset = \{x | x \in a \wedge x \neq x\}$ . Dále získáváme, že sjednocení množin je také množina, podobně jejich průnik.

**Definice 4 (Induktivní množina).** Množina  $A$  je induktivní, pokud platí  $(\emptyset \in A) \wedge (\forall a \in A)((a \cup \{a\}) \in A)$ .

**Definice 5 (Přirozená čísla).**

$$\mathbb{N} = \bigcap \{A | A \text{ je induktivní}\} \quad (6)$$

Množina přirozených čísel je nejmenší induktivní množina a je podmnožinou každé induktivní množiny.  $\mathbb{N}$  je nejmenší nekonečný *kardinál* a také jediný *početný* kardinál.

POZNÁMKA 6 (ZNAČENÍ PŘIROZENÝCH ČÍSEL). Množina  $\mathbb{Z}$  v axiomu nekonečna je stejná množina jako  $\mathbb{N}$ . V teorii množin se značí  $\omega$ , při zkoumání kardinality pak  $\aleph_0$ . Pro označení přirozených čísel bez nuly zavedme horní index  $+$  ( $\mathbb{N}^+ = \mathbb{N} - \{0\}$ ). ■

POZNÁMKA 7 (NULA JE PŘIROZENÁ). Z definice přirozených čísel podle ZF přímo vyplývá, že součástí přirozených čísel je i číslo nula. Dle mého i stádo, ve kterém není žádná kráva, je stále stádem; ruka bez prstů je stále rukou; dort bez třešniček je i tak dort. ■

## 1.2 Vyšší obory čísel

Vyšším oborem čísel jsou čísla celá, značená  $\mathbb{Z}$ , a jsou to všechna čísla, která mohou vzniknout libovolným odčítáním přirozených čísel. Jejich výčet je diskretní:  $\mathbb{Z} = \{0, 1, -1, 2, -2, \dots\}$  [5]. Zde „ $-$ “ je znaménko odčítání (snížení hodnoty prvního argumentu o hodnotu druhého).

Další číselný obor jsou čísla racionální, pro která se vžilo označení  $\mathbb{Q}$  a racionálním číslem je číslo  $x$ , pokud jde zapsat jako  $y/z$ , kde  $y \in \mathbb{Z}$  a  $z \in (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$  a „ $/$ “ je symbol operace dělení [6]. Množina racionálních čísel je spočetná,  $\mathbb{Q} = \{0, 1, 1/2, -1, 1/3, -1/2, 2, 1/4, \dots\}$ .

Po zavedení racionálních čísel stále v budovaném číselném systému nemáme například délku úhlopříčky jednotkového čtverce – takovéto číslo značíme  $\sqrt{2}$  – nebo třeba poměr obvodu kružnice k jejímu průměru – toto značíme  $\pi$ . Když do systému doplníme všechna tato čísla, získáváme tzv. číselnou osu (přímku) reprezentující čísla reálná, značená  $\mathbb{R}$ . Množině přidaných čísel říkáme iracionální (nejsou racionální) a značíme ji  $\mathbb{I}$ ,  $\mathbb{I} = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$  [7]. Ke každým dvěma reálným číslům  $r$  a  $\varepsilon$  lze najít racionální číslo  $q$  tak, aby

$$|r - q| \leq \varepsilon \quad [8]. \quad (7)$$

V množině reálných čísel matematikové objevili ještě jemnější struktury, než je dělení na obory, které jsem teď představil. První jmenované iracionální číslo  $\sqrt{2}$  je tzv. *algebraické*, protože může vypadnout jako řešení nějaké algebraické rovnice, např.  $x^2 = 2$  nebo  $(-x)^2 = 2$ , zatímco druhé jmenované – tzv. *Ludolfovo číslo* ( $\pi$ ) – takovouto vlastností nedisponuje, je *nealgebraické* (též *transcendentní*) [4]. Dále v oboru reálných čísel existují tzv. *rekurzivní čísla* (*computable reals* – vizte kapitolu 2.4.2.5), která se dají vyčíslit v konečném čase. Pro reálné číslo  $r$  a dané  $\varepsilon$  existuje vyčíslitelná funkce (pro konečný vstup někdy skončí), jejímž výsledkem je racionální číslo  $q$  tak, že platí nerovnice 7. Ostatní čísla jsou *nerekurzivní* a protože Turingových strojů je spočetně mnoho, je nerekurzivních čísel nespočetně mnoho [9]. Přechod od racionálních čísel k rekurzivním, kterým se zabývá tato práce, je velmi složitý. V jednom oboru jsou i složité věci vcelku jednoduché, zatímco v tom druhém jsou i jednoduché věci vcelku složité.

Vyššími obory jsou strukturovaná čísla – uvažujeme více číselných os a číslo má  $2^n$  složek. Jedná se o komplexní čísla ( $\mathbb{C}, n = 1$ ), kvaterniony ( $\mathbb{H}, n = 2$ ),



oktoniony ( $\mathbb{O}, n = 3$ ) – těmto čtyřem (společně s reálnými čísly) oborům říkáme *normované algebry s dělením* (*normed division algebra*) [10]. Existují ještě vyšší obory (sedeniony –  $\mathbb{S}, n = 4$  atd.), tato práce se nicméně dále zabývá pouze jednorozměrnými čísly a v dalším textu je „číslem“ myšleno číslo *reálné*.

### 1.3 Operace s čísly

Již v kapitole 1.2 byly zmíněny 3 operace – *odčítání* (rozdíl), *dělení* (podíl) a *odmocňování* (odmocnina). K nim existují ještě operace opačné, a ty po řadě nazýváme *sčítání* (součet), *násobení* (součin) a *umocňování* (mocnina).

Binární operace se značí znaménkem mezi operandy. Například součet čísel  $x$  a  $y$  značíme  $x + y$  atd. Základní značení operací je uvedeno v tabulce 1. Binárním operacím, které mají jako první operand neutrální prvek (při operaci s číslem je výsledkem toto číslo), budeme říkat unární. Unárními operacemi je číslo opačné (k číslu  $x$  je opak číslo  $0 - x$  a značíme ho  $-x$ ) a převrácené číslo (k číslu  $x \neq 0$  je číseln převráceným číslo  $1/x$  a značíme ho  $/x$  nebo  $x^{-1}$ ).

Operacím  $\langle +, - \rangle$  říkáme aditivní,  $\langle *, / \rangle$  multiplikativní a  $\langle ^, \sqrt{\phantom{x}} \rangle$  mocninné. Operace v uvedených dvojicích jsou příbuzné, příslušné vztahy nazveme „horizontální“. Mezi operacemi však existují též vztahy „vertikální“. Platí

$$x * n = \underbrace{x + x + \dots + x}_{n\text{-krát}} \text{ a také } x^n = \underbrace{x * x * \dots * x}_{n\text{-krát}}. \quad (8)$$

Máme tedy návod, jak teoreticky vytvořit více operací.

Další operace je daná předpisem

$$x \# n = \underbrace{x^{\wedge} x^{\wedge} \dots x^{\wedge}}_{n\text{-krát}} \quad (9)$$

a nazýváme ji tetrace [11].

Pro operace vyšší arity je pak zvykem používat prefixovou notaci jednoho velkého znaménka – součet  $a_0 + a_1 + a_2$  je pak zapsán jako  $+(a_0, a_1, a_2)$  nebo též  $\sum_{i=0}^2(a_i)$ . Součin  $a_0 * a_1 * a_2$  pak  $*(a_0, a_1, a_2)$  nebo  $\prod_{i=0}^2(a_i)$ .

Tabulka 1: Symboly operací s čísly

Operace	Značení
sčítání	$x + y$
odčítání	$x - y$
násobení	$x * y, x \cdot y$ nebo $xy$
dělení	$x / y$ nebo $\frac{x}{y}$
umocňování	$x^y$ nebo $x^{\wedge}y$
odmocňování	$\sqrt[y]{x}$

Tabulka zobrazuje zápis binárních operací s čísly  $x$  a  $y$ .

## 1.4 Funkce čísel

Další manipulace s čísly jsou tzv. funkce, které si představujeme jako nekonečnou tabulku o dvou sloupcích, které představují vstupní a výstupní hodnoty (v tabulce 2 jsou uvedeny některé hodnoty pro funkci sinus). V informatice též mluvíme o argumentu funkce a návratové hodnotě. Příklady funkcí jsou funkce *goniometrické*, funkce *exponenciální* či *logaritmus*.

Tabulka 2: Nekonečná vstupně/výstupní tabulka funkce *sinus*

Vstup	Výstup
0	0
1	0.8414709848078965...
2	0.9092974268256817...
3	0.1411200080598672...
4	−0.7568024953079282...
	⋮

Tabulka obsahuje v prvním sloupci vstupní hodnoty funkce sinus a ve druhém hodnoty výstupní. Tabulka je nekonečná ve vertikálním směru, v horizontálním jsou pouze dva sloupce – pro argument a vrácenou hodnotu.

Funkce jsou velmi užitečným a potřebným nástrojem takřka ve všech odvětvích matematiky a jsou často zdrojem *iracionálních* (*transcendentních*) čísel – například  $\tan(1)$  dá za výsledek čtvrtinu *Ludolfova čísla*.

**Definice 8 (Uspořádaná  $n$ -tice [4]).** Jsou-li dány množiny  $a_1, a_2, \dots, a_m$ , uspořádanou  $n$ -tici množin  $a_1, a_2, \dots, a_n$  pro  $n < m$  definujeme tak, že pro  $n = 1$  položíme

$$\langle a_1 \rangle = a_1 \quad (10)$$

a je-li již definována uspořádaná  $n$ -tice  $\langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle$ , položíme

$$\langle a_1, a_2, \dots, a_{n+1} \rangle = \langle \langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle, a_{n+1} \rangle. \quad (11)$$

**Definice 9 (Kartézský součin [12] [13]).** Necht  $A_0, A_1, \dots, A_n$  jsou množiny. Symbolem  $\times_{i=0}^n A_i$  či  $A_0 \times A_1 \times \dots \times A_n$  označujeme množinu všech uspořádaných  $(n+1)$ -tic tvaru  $\langle a_0, a_1, \dots, a_n \rangle$ , přičemž  $(a_0 \in A_0) \wedge (a_1 \in A_1) \wedge \dots \wedge (a_n \in A_n)$ , neboli

$$A_0 \times A_1 \times \dots \times A_n = \{ \langle a_0, a_1, \dots, a_n \rangle \mid (\forall i \in \mathbb{N}, i \leq n)(a_i \in A_i) \} \quad (12)$$

a tuto množinu nazýváme *kartézským součinem množin*  $A_0, A_1, \dots, A_n$ .

**POZNÁMKA 10 (MNOŽINOVOST KARTÉZSKÉHO SOUČINU).** Že je kartézský součin (KS) množina jsem zavedl definitoricky, jako to udělaly autorky v [12], ovšem

nemusí to být úplně jasné, je to ovšem dokazatelné. V [4] se kartézský součin zavádí jako třída (soubor množin, který množina být nemusí – například třída všech množin množinou není) a poté se pomocí axiomu potence jeho množinovitost dokazuje. ■

**Definice 11 (Relace [12]).** *Relace mezi množinami  $A$  a  $B$  je libovolná podmnožina  $\mathcal{R}$  kartézského součinu  $A \times B$ . Je-li  $A = B$ , mluvíme o relaci na  $A$ . Náleží-li dvojice  $\langle a, b \rangle$  relaci  $\mathcal{R}$ , t.j.  $\langle a, b \rangle \in \mathcal{R}$ , říkáme, že  $a$  a  $b$  jsou v relaci  $\mathcal{R}$ , a zapisujeme též  $a\mathcal{R}b$ .*

**Definice 12 (Zobrazení [12]).** *Relaci  $f \subseteq A \times B$  nazveme zobrazením množiny  $A$  do množiny  $B$ , jestliže platí, že ke každému prvku  $x \in A$  existuje právě jeden prvek  $y \in B$  takový, že  $\langle x, y \rangle \in f$ .*

Je-li relace  $f \subseteq A \times B$  zobrazení, pak skutečnost, že  $\langle x, y \rangle \in f$  zapisujeme ve tvaru  $y = f(x)$ . Rovněž používáme zápis  $f : A \rightarrow B$ , což znamená, že  $f$  je zobrazení  $A$  do  $B$ . Dále  $x$  nazýváme *nezávisle proměnnou* a  $y$  *závisle proměnnou* [14].

**Definice 13 (Reálná posloupnost [12]).** *Zobrazení množiny  $\mathbb{N}$  do množiny  $\mathbb{R}$  nazýváme reálná posloupnost.*

Místo obecného značení  $a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$  pro zobrazení se vžil pro posloupnost značení  $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  nebo  $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ . Obraz bodu  $n$  se značí  $a_n$  a říkáme mu také  $n$ -tý člen posloupnosti  $a$  [12].

**Definice 14 (Nekonečná číselná řada [15]).** *Nechť  $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  je reálná posloupnost. Symbol  $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$  nebo  $a_0 + a_1 + a_2 + \dots$  nazýváme nekonečnou číselnou řadou.*

**Definice 15 (Posloupnost částečných součtů [15]).** *Posloupnost  $\{s_n^a\}$ , kde  $s_n^a = \sum_{i=0}^n a_i$  nazýváme posloupnost částečných součtů řady  $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ .*

**Definice 16 (Konvergence řady [15]).** *Existuje-li vlastní limita  $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n^a = s$ , řekneme, že řada  $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$  konverguje a má součet  $s$ .*

**Definice 17 (Divergence řady [15]).** *Neexistuje-li vlastní limita  $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n^a$ , řekneme, že řada  $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$  diverguje. Pokud limita  $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n^a$  neexistuje, říkáme, že řada osciluje. Pokud je  $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n^a = \infty$ , pak říkáme, že řada diverguje k  $\infty$ . Pokud je  $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n^a = -\infty$ , pak říkáme, že řada diverguje k  $-\infty$ .*

**Definice 18 (Zbytek po  $n$ -tém členu řady [15]).** *Nechť  $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$  je konvergentní řada. Její součet  $s$  lze psát ve tvaru  $s = s_n^a + R_n^a$ , kde  $s_n^a = \sum_{i=0}^n a_i$  je  $n$ -tý částečný součet řady  $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$  a  $R_n^a = \sum_{i=n+1}^{\infty} a_i$  se nazývá zbytek po  $n$ -tém členu*

a znamená velikost chyby, které se doupušitíme, když místo celé řady posčítáme pouze prvních  $n$  členů posloupnosti  $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ .

**Definice 19 (Reálná funkce reálné proměnné [14]).** Buď  $M \subseteq \mathbb{R}$ . Zobrazení  $f : M \rightarrow \mathbb{R}$  nazýváme reálnou funkcí reálné proměnné nebo stručně funkcí jedné proměnné.

Množina  $M$  se nazývá definiční obor funkce  $f$  a značí se  $D(f)$ , množina  $H(f) = \{f(x) | x \in M\}$  se nazývá obor hodnot funkce  $f$ .

**PŘÍKLAD 20 (SINUS JAKO ZOBRAZENÍ).** Funkce  $y = \sin(x)$  je definována pro všechna  $x \in \mathbb{R}$  a její obor hodnot je interval  $[-1, 1]$ , jedná se tedy o reálnou funkci reálné proměnné. Pokud budeme hledět jen na obrazy  $\sin(x)$ ,  $x \in \mathbb{N}$  (jako v tabulce 2), jedná se o reálnou posloupnost.

Zobrazení  $f : A \rightarrow B$  je definováno tak, že  $A$  i  $B$  jsou množiny. Poznámka 10 říká, že je množinou i kartézský součin množin. Tedy lze definovat též zobrazení  $\mathbb{R} \times \mathbb{I} \rightarrow \mathbb{Q} \times \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$  atp., aniž bychom museli definici zobrazení jakkoli upravovat.

Existují podobnosti mezi operacemi a funkcemi. Pokud se odprostíme od infixové notace a místo  $a + b$  napíšeme  $+(\langle a, b \rangle)$ , lze i operace vyjádřit jako funkce. Matematickou operaci pak chápeme jako speciální případ funkce,  $n$ -ární reálná operace je funkce  $\times_{i=1}^n \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ .

Funkce  $\emptyset \rightarrow \mathbb{R}$  je konstanta, neboť podle definice zobrazení, pokud jsou v relaci  $\langle \emptyset, x \rangle$  a  $\langle \emptyset, y \rangle$ , pak  $x = y$ . Funkce se vždy zobrazuje na stejné číslo, a proto se jedná konstantu. Z toho plyne, že funkcemi můžeme modelovat jakákoli čísla i manipulaci s nimi.

**Definice 21 (Mocninná řada [15]).** Buď  $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  posloupnost reálných čísel,  $x_0$  libovolné reálné číslo. Mocninnou řadou se středem v bodě  $x_0$  a koeficienty  $a_n$  rozumíme řadu ve tvaru

$$a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \dots + a_n(x - x_0)^n + \dots = \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n(x - x_0)^n. \quad (13)$$

**Definice 22 (Taylorova řada [15]).** Necht funkce  $f$  má v bodě  $x_0$  derivace všech řádů. Mocninnou řadu ve tvaru  $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$  nazýváme Taylorovou řadou funkce  $f$  v bodě  $x_0$ .

Je-li  $x_0 = 0$ , mluvíme o Maclaurinově řadě funkce  $f$  a je ve tvaru  $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$ .

Zbytek po  $n$ -tém členu Taylorovy řady říkáme  $n$ -tý Taylorův zbytek a značíme ho  $R_n^{f,a}(x)$ .

**Definice 23 (Geometrická řada [15]).** Řadu nazýváme geometrickou, pokud je ve tvaru

$$a + a * q + a * q^2 + a * q^3 + \dots = \sum_{i \in \mathbb{N}} a q^i \quad (14)$$

**Fakt 24 (Částečný součet geometrické řady [15]).** *Pro geometrickou řadu ve tvaru  $\sum_{i \in \mathbb{N}} aq^i$  a  $|q| < 1$  platí*

$$s_n^a = \sum_{i=0}^n a * q^i = a \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \quad (15)$$

**Fakt 25 (Geometrická řada).** *Pro geometrickou řadu ve tvaru  $\sum_{i \in \mathbb{N}} aq^i$  a  $|q| < 1$  platí*

$$\sum_{i \in \mathbb{N}} aq^i = \frac{a}{1 - q} \quad (16)$$

**Fakt 26 (Zbytek geometrické řady).** *Pro  $n$ -tý zbytek geometrické řady  $\sum_{i \in \mathbb{N}} aq^i$  platí*

$$R_n = \frac{aq^{n+1}}{1 - q} \quad (17)$$

## 2 Čísla v počítači

Standardně jsou čísla v počítači uložena jako sled bitů v nějaké reprezentaci vyjadřující hodnotu. Tímto způsobem lze reprezentovat číslo jen s danou přesností a rozsahem, což je však v řadě případů dostačující. Číslo lze reprezentovat i naprosto přesně – pomocí struktur je reprezentujícími a s nimi manipulujícími. I tyto samozřejmě musí být uloženy v paměti, v tomto případě se však nejedná o uložení hodnoty čísla, nýbrž se ukládá abstrakce, která číslo na požádání umí vygenerovat. Tento přístup nazýváme líným. Nejprve bude popsáno ukládání čísel jako hodnot a na jeho přesnost. Poté navrhne struktury pro přesná čísla a nakonec budou ukázány existující knihovny.

### 2.1 Číslo uložené jako hodnoty

Paměť počítače většinou pracuje s tzv. *bity*, pamětovými buňkami nabývajících dvou rozlišitelných hodnot [16]. Ke kódování čísel se tedy používá výhradně dvojková soustava. Celá následující podkapitola pojednává o uložení čísel jejich hodnotami je převzata z [17].

#### 2.1.1 Vážený poziční kód

Číslo v soustavě o základu  $b$  lze dešifrovat následovně:

$$(\dots a_2 a_1 a_0 . a_{-1} a_{-2} \dots)_b = \dots + a_2 b^2 + a_1 b + a_0 + \frac{a_{-1}}{b} + \frac{a_{-2}}{b^2} + \dots \quad (18)$$

kde čísla  $a_n$  nazýváme číslice a symbol „.” řádovou tečkou – speciálně pak tečkou desetinnou ( $b = 10$ ) nebo dvojkovou ( $b = 2$ ).

PŘÍKLAD 27 (PŘEVOD Z VÁŽENÉHO POZIČNÍHO KÓDU).

$$(101010.101)_2 = (42.625)_{10} \quad (19)$$

#### 2.1.2 Záporná čísla

V případě zápisu čísla váženým pozičním kódem lze strukturu pokrývající i záporná čísla přímočaře vytvořit přidáním příznaku (rozšířit jeho reprezentaci o jeden bit), zda se jedná o číslo kladné či nikoliv. V této reprezentaci lze vyjádřit zápornou i kladnou nulu. Tomuto kódování se říká kód *velikostí a znaménkem* (*signed-magnitude*).

Jinou možností je záporná čísla vnímat jako opak čísel kladných i na úrovni reprezentace, čili záporné číslo opačné ke kladnému v binární reprezentaci vypadá jako negace bitů daného kladného čísla. Opět zde vyvstává problém se zápornou nulou. Tomuto kódování se říká *jedničkový doplněk* (*ones' complement*).


Když od všech záporných čísel v jedničkovém doplňku odečteme číslo jedna, rozprostřeme čísla efektivně, tj. odpadne problém s dvojí reprezentací nuly. Tomuto kódování se říká *dvojkový doplněk* (*two's complement*).

### 2.1.3 Plovoucí řádová tečka

U váženého pozičního kódu známe přesně pozici řádové tečky – je mezi číslicemi  $a_0$  a  $a_{-1}$ . Alternativním přístupem je kódování s *plovoucí* řádovou tečkou.

Plovoucí číslo je dáno uspořádanou dvojicí  $\langle e, f \rangle = f * b^{e-q}$ , kde  $e$  nazýváme *exponent* a  $f$  *zlomkovou částí* (*fraction*). Číslo  $b$  a  $q$  jsou konstanty dané použitým typem,  $b$  se nazývá *základ* a  $q$  *přesah*.

**PŘÍKLAD 28 (PLOVOUCÍ ČÍSLO – JEDNODUCHÁ PŘESNOST).** Číslo s jednoduchou přesností (*single* dle IEEE 754-1985, *binary32* dle IEEE 754-2008) je uloženo v paměti jako 32b struktura. První bit je příznak znaménka, dalších 8 bitů je pro exponent a dalších 23 bitů pro fraction. Konstanty jsou ohodnoceny následovně:  $q = 127$ ,  $b = 2$ . V *C*, *C++*, *C#* nebo *Javě* se tento číselný datový typ nazývá *float*, v *Haskellu* *Float* a v *Lispu* pak *single-float* [18].



## 2.2 Přesná reprezentace čísel jako hodnot


Nyní se podívejme, jaká čísla uložená jako hodnoty považujeme za přesná. Projdeme opět všechny obory jako v první kapitole a poprvé propojíme matematickou teorii s informatickou realitou. Jako modelový jazyk nám poslouží *C*.

Všechny ukázky v této kapitole představují reálné chování představených datových typů na konkrétní AMD64 architektuře. Nejde teď tedy o žádnou teorii a jen ukazují reálné limity. Na 128-bitové architektuře mohou být tyto limity jiné a typy použitelnější. Nicméně tato práce směřuje k přesným výpočtům rekurzivních čísel bez ohledu na architekturu.

### 2.2.1 Přirozená čísla

Přirozená čísla jsou uzavřena na operace sčítání a násobení. V počítači se jako hodnoty ukládají pomocí váženého pozičního kódu a tento má horní limit, jak velké číslo lze na dané architektuře uložit. Takto uložená přirozená čísla ovšem nejsou na operace uzavřena, protože může dojít k přetečení – číslo ukládané se liší od čísla uloženého. Příklad tohoto chování vydáme na Obrázku 2.

Obrázek 2: Přirozená čísla v jazyce C



```
ondix@ondix-Lenovo-Legion-5-15ARH05: ~/Documents/p/c/b...  
unsigned long long int a = 0;  
unsigned long long int b = ULLONG_MAX;  
a    >> 0  
b    >> 18446744073709551615  
++b  >> 0  
a==b >> 1  
  
unsigned long long int c = 10000000000;  
unsigned long long int d = 10000000000;  
c+d  >> 20000000000  
c*d  >> 7766279631452241920
```


Největším datovým typem, který pracuje s přirozenými čísly je v jazyce C typ `unsigned long long int` a na 64-bitové architektuře umí uchovat čísla v intervalu  $[0, 2^{64} - 1]$ . Na příkladu vidíme přetečení u inkrementace i násobení.

Pokud ale ukládáme přirozené číslo v intervalu, ve kterém jej zvládne uložit datový typ jako hodnotu, můžeme ho považovat za přesné.

### 2.2.2 Celá čísla

Celá čísla jsou uzavřena na sčítání, odčítání a násobení. V paměti počítače se pak musí používat kódování záporných čísel jako hodnot, často jde o dvojkový komplement. Opět zde vyvstává problém s limity jakéhokoli hodnotového datového typu, totiž že vyjadřitelná čísla jsou ohraničená a hrozí přetečení (a i podtečení). Implementace celého čísla jako hodnoty tedy není na operace uzavřená (Obr. 3).

Obrázek 3: Celá čísla v jazyce C



```
ondix@ondix-Lenovo-Legion-5-15ARH05: ~/Documents/p/c/b...  
signed long long int a = LLONG_MIN;  
signed long long int b = LLONG_MAX;  
a    >> -9223372036854775808  
b    >> 9223372036854775807  
-a   >> 9223372036854775807  
a==b >> 1  
  
signed long long int c = 10000000000;  
signed long long int d = -10000000000;  
c+d  >> 9000000000  
c*d  >> 8446744073709551616
```

Nejširší datový typ jazyka C, který umí uložit celá čísla je `signed long long int`. Ten na 64-bitové architektuře zvládne uložit čísla z intervalu  $[-2^{63}, 2^{63} - 1]$ . Na příkladu vidíme, že není uzavřen vůči operacím a že dochází k podtékání.




Pakliže ukládáme celé číslo jako hodnotu, která se vejde do datového typu bez přetečení nebo podtečení, lze takto vyjádřené číslo považovat za přesné.

### 2.2.3 Racionální čísla

Racionální číslo se v jazyce C ukládá jako číslo s plovoucí řádovou tečkou. S největší přesností se ukládá datový typ `long double`. Není specifikováno, jak má být přesný, pouze že má být minimálně tak přesný jako `double` [20]. Čísla, která jsou různá, ale kvůli zaokrouhlení se vyjádří jako stejná hodnota plovoucího čísla, jsou v tomto směru potom nerozeznatelná. Každý plovoucí typ pak má garantovanou přesnost, na kterou by se různá čísla neměla reprezentovat stejně.

Obrázek 4: Racionální čísla v jazyce C



```
ondix@ondix-Lenovo-Legion-5-15ARH05: ~/Documents/p/c/b...  
long double a = 3.1415926535897932;  
long double b = 3.141592653589793;  
a      >> 3.141593  
b      >> 3.141593  
a==b   >> 1  
  
LDBL_MAX >> 1.189731e+4932  
LDBL_MIN >> 3.362103e-4932  
LDBL_DIG >> 18  
DBL_DIG  >> 15
```

Nejrozsáhlejším datovým typem čísla s plovoucí řádovou tečkou je v jazyce C `long double`. Na příkladu vidíme, že jeho přesnost by měla být 18 desetinných míst, ale už na patnácti místech jsou dvě různá zapisovaná čísla zapsána stejně. Někde se tedy stala chyba a přesnost `long double` je stejná jako `double`, ale knihovna `float.h` to nereflektuje.

Racionální čísla vyjádřená jako plovoucí můžeme považovat za přesná, pokud se nedostaneme mimo interval a přesnost stanovenou typem. Na Obrázku 4 vidíme, že rozsah datového typu `long double` je téměř  $10^4$  řádů a přesnost je maximálně 15 desetinných míst. Čísla s plovoucí řádovou tečkou jsou nejlepší přiblížení k racionálním číslům, které lze vyjádřit jako hodnoty.

## 2.3 Přesná reprezentace čísel jako struktur

Již víme, že některá čísla lze přesně uložit jejich hodnotou. Nicméně standardní datové typy mají své limity, například přetékání nebo nedostatečná přesnost. Číslo je však namísto hodnotového datového typu reprezentovat typem referenčním. V kapitole 1 bylo nastíněno, že stejné číslo lze vyjádřit několika symboly, i když jeho hodnota je pouze jedna. Takto reprezentovaná čísla umíme velmi dobře v počítači vyjadřovat. Struktury v této podkapitole jsou pouze teoretickými koncepty bez konkrétní implementace.

### 2.3.1 Přirozená čísla

Jak bylo ukázáno v minulé podkapitole, přirozená čísla jsou uzavřena na sčítání a násobení, `unsigned int` ovšem nikoli. Cílem je tedy vymyslet strukturu, která dokáže reprezentovat jakékoli přirozené číslo. Jako hodnoty umíme na  $n$  bytech uložit čísla 0 až  $2^n - 1$ , proto by pro přirozená čísla bylo možné adekvátně upravovat toto  $n$ . Velikost čísla by pak byla omezena jen velikostí paměti.

Struktura představující přirozené číslo musí zajišťovat, aby jeho hodnota při aplikaci matematických operací nepřetekla. Pokud struktura obdrží požadavek na násobení nebo sčítání, musí mít připravený další prostor a tam posunout bity, které by normálně přetekly. To je možné zajistit tak, že ve svém pomyslném paměťovém prostoru bude vždy po provedení operace procházet svých levých  $2^{n-1}$  bitů, a pokud zde najde alespoň jednu jedničku, požádá o alokaci dalšího prostoru o velikost  $2^n$ , tedy zvedne  $n$  o jedna.

Pak už bude na operačním systému, kolik paměti bude moci struktuře přiřadit. Tato paměť je vždy prakticky omezená, teoreticky je však neomezená. Strukturu si tedy lze představit jako pouhý chytrý řadič bloků paměti za sebe. Pak lze *naprosto přesně* zapsat jakékoli přirozené číslo. Paměťově toto není příliš efektivní, jedná se však o funkční princip. Optimalizace je ponechána až na konkrétní implementace.

### 2.3.2 Celá čísla

Situace v případě celých čísel je velmi podobná jako u přirozených čísel. Kromě přetečení navíc hrozí také podtečení, protože celá čísla musí být uzavřena i na odčítání.

Vytvořme strukturu pro celé číslo jako dvojici přirozeného čísla a příznaku kladnosti. Metody struktury pak budou jen nastavovat příznak kladnosti – u násobení jako exklusivní disjunkci, odčítání odpovídá sčítání s negací příznaku a u sčítání se příznak nastaví podle příznaku u většího čísla. Takto vytvořené struktury pak *naprosto přesně* reprezentují jakékoli celé číslo.

### 2.3.3 Racionální čísla

Racionální čísla jsme definovali jako podíl celého a nenulového celého čísla. Racionální čísla (bez nuly) jsou uzavřená i na dělení. Zavedme teď racionální číslo jako dvojici celých čísel (čitatele a jmenovatele) s invariantem, že druhé číslo nesmí být nikdy nula a že obě čísla jsou nesoudělná.

Násobení bude fungovat jako násobení na složkách, dělení pak bude jen prohození obou složek druhého argumentu a následné násobení. Odčítání je sčítání s opačným číslem a sčítání musí najít společný jmenovatel a poté specificky přenásobovat jednotlivé operandy.

Metody musí stále kontrolovat, zda nedochází k dělení nulou. Po konci výpočtu musí dojít ke zkrácení obou složek čísla. Predikát rovnosti dvou racionálních čísel kvůli podmínce nesoudělnosti je pak jednoduchý a je to rovnost na složkách.

Tato struktura je *naprosto přesnou* reprezentací racionálních čísel. Jazyk Lisp implementuje racionální čísla zmíněným způsobem a nabízí datový typ `ratio`.

## 2.4 Reálná čísla

Předchozí číselné obory lze s dostatkem paměti naprosto přesně reprezentovat. Zbývají už jen iracionální čísla a máme všechna reálná čísla v přesné reprezentaci. Těch je nepočítatelně mnoho, a tak je není možné vytvořit z přirozených čísel nabalováním struktur jako předchozí obory. Nic jiného ale v paměti, která pracuje s diskrétními hodnotami, neumíme vytvořit.

Dosud jsme mluvili o *naprosto přesných* číslech, struktura vyjadřující přesné číslo však může být i taková, která počítá jen přibližná čísla, nastavitelně vzdálená od (neznámé) přesné hodnoty. Takových čísel je počítatelně mnoho a říkáme jim čísla rekurzivní. Ve skutečnosti je právě hranice mezi racionálními čísly a rekurzivními čísly ta velká bariéra, která odděluje svět, kde vše funguje relativně jednoduše a ten, kde je všechno o řád těžší.

### 2.4.1 Představa

Než struktury definovat imperativně pomocí definic, jak by co měla implementovat, se spíše pokusím o definici struktury deklarativně, čili pomocí vlastností, které by měla splňovat.

Abstraktní struktura reprezentující reálné číslo by měla umožnit

- jeho vyčíslení – když struktura existuje, pak po zavolání vhodného nástroje je výsledkem hodnota, kterou tato struktura představuje;
- přesnost – i když má číslo nekonečný rozvoj nebo je velmi velké, abstrakce umožňuje jeho vyčíslení na danou přesnost v konečném čase;
- podporovat matematické operace – ve smyslu kapitoly 1.3;
- podporovat matematické funkce – ve smyslu kapitoly 1.4;
- být vrácena jako výsledek funkce – mít jasně popsanou strukturu, aby se dala rozšiřovat funkčnost;
- být použita jako argument nějaké funkce – typicky funkce pro vyčíslení.

První dvě podmínky jsou přímo esenciální – zajišťují, že abstrakce mohou reprezentovat reálná čísla na libovolnou (kladnou) přesnost. Kdykoli budu potřebovat číslo dané konkrétní abstrakcí, zavolám příslušnou funkci s parametrem  $\varepsilon$  reprezentujícím přesnost, na kterou toto číslo potřebuji. Obecně totiž nemusí být výsledkem vyčíslovací funkce přesná hodnota hledaného čísla, avšak díky těmto podmínkám budu výsledku vzdálen maximálně o zadanou hodnotu odchylky. *Přesné* číslo tedy představuje číslo, které je od výsledku vzdálené o jasně definovanou hodnotu vyčísitelné konečným výpočtem. Uvažujme strukturu  $s_x$

přesně vyjadřující nějaké číslo  $x$ , zavolejme vyčíslovací funkci *enum* a jako argumenty volme tuto strukturu a libovolné kladné  $\varepsilon$ , pak by výsledkem mělo být číslo  $enum(s_x, \varepsilon)$  splňující nerovnost

$$|enum(s_x, \varepsilon) - x| \leq \varepsilon. \quad (20)$$

Druhé dvě podmínky vštěpují dané struktuře reprezentující reálná čísla vlastnosti reálných čísel, a sice že s nimi jde sčítat, násobit atp. a že mohou být argumentem nějaké matematické funkce. Jistě nejde o to tyto struktury vkládat do stejných operací jako si představujeme s normálními čísly, například ve výrazu  $3 + 4$  nechceme operandy nahrazovat abstraktními strukturami a očekávat správný výsledek, nýbrž chceme existenci ekvivalentní operace pro tyto struktury. To nutně neznamená, že musí být skutečně někde implementována, ale potřebujeme docílit stavu, kdy existence této není dokazatelně vyloučena.

Třetí a poslední dvě podmínky jsou spíše návod pro praktické použití těchto hypotetických struktur, aby se s nimi dalo smysluplně pracovat. To vlastně znamená, že musí být elementy prvního řádu (*first-class citizen*), čili implementovány jako niterná součást použitého jazyka a ne jako svébytná konstrukce, která sice funguje, ale je nekompatibilní s jazykem svého vzniku, takže je vlastně nepoužitelná, uživatelsky nerozšiřitelná.

## 2.4.2 Existující nástroje

Nyní se podíváme, co na poli vyčíslování reálných čísel existuje v současné době.

**2.4.2.1 Mpmath [21]** *mpmath* je velmi rozsáhlá knihovna pro Python. Je publikována pod licenci BSD a je dosažitelná i pomocí *pipu*. Kromě základní funkčnosti pro výpočet funkcí a operací s čísly jsou implementovány i funkce pro výpočet funkcí intervalů, určitých integrálů, podpora tvorby grafů a mnoho dalšího. Dokumentace je velice hezky zpracovaná se spoustou příkladů. Přesnost se nastavuje proměnnou `mp.dps`. Jde o počet vypisovaných míst. Knihovna oplývá tolika možnostmi, že dokonce existuje stránka pro výpočet Ludolfova čísla sty možnými one-linery. Knihovna používá tři vlastní datové typy a sice `mpf` pro reálná čísla, `mpc` pro komplexní čísla a `matrix` pro matice. Příklad použití je na Obrázku 5.

**2.4.2.2 JScience [22]** *JScience* je knihovna pro jazyk Java. Její část pro práci s jednotkami se dostala do knihovny *javax*. Knihovna je široce rozkročena. Přináší podporu pro porovnávání a počítání jednotek z fyziky, geografie nebo ekonomie. Z matematiky je zde podpora pro jednoduchou symbolickou analýzu a strukturální algebru. Nás nejvíce zajímá část `org.jscience.mathematics.number`. Zde jsou zajímavé 3 datové typy a to `Real` umožňující základní výpočty s nastavitelnou přesností, `LargeInteger` ukládající velká celá čísla a `Rational` ukládající dvojice `LargeInteger`ů a umožňující jejich implicitní usměrňování a základní matematické operace. Příklad použití je na Obrázku 6.

Obrázek 5: Používání knihovny `mpmath`

```
ondix@ondix-Lenovo-Legion-5-15ARH05: ~/Documents/p/tex...  
>>> mpf(2) ** mpf('0.5')  
mpf('1.4142135623730951')  
>>> mp.dps=50  
>>> mpf(2) ** mpf('0.5')  
mpf('1.4142135623730950488016887242096980785696718753769468')  
>>> log(2)  
mpf('0.693147180559945309417232121458176568075500134360255')  
>>> log(4, 16)  
mpf('0.5')  
>>> acos(1)  
mpf('0.0')  
>>> atan(1j)  
mpf('1.5707963267948966192313216916397514420985846996875534')  
>>> gamma(4)  
mpf('6.0')  
>>> gamma(8)  
mpf('5040.0')  
>>> zeta(0.5+1j)  
mpc(real='0.14393642707718906032438966648372157903562010555574597', imag='-0.722  
09974353167308912617513458032492501318439535370192')
```

Struktura `mpf` podporuje matematické operace, na příkladu je vyobrazena odmocnina ze dvou. Ta je zde ve dvou provedeních, s defaultní přesností a s nastavenou na 50. Ukázány jsou i další matematické funkce, jmenovitě logaritmus, cyklometrické, gamma a Riemannovu zeta funkci, na jejímž vstupu i výstupu vidíme komplexní číslo.


Obrázek 6: Používání knihovny JScience

[illegible]

Na obrázku je ukázáno používání třídy `Real`. Operace jsou použitelné jako metody, nikoli operátorem. Konkrétně je představeno nastavování přesnosti, výpočet druhé odmocniny, zlatého řezu a zlomkové struktury s implicitním krácením.

[illegible]

Obrázek 8: Implicitní používání knihovny CLN




```
ondix@ondix-Lenovo-Legion-5-15ARH05: ~  
[1]> (setq a 27644437/12)  
27644437/12  
[2]> (setq b 4/35742549198872617291353508645526642567)  
4/35742549198872617291353508645526642567  
[3]> (* a b)  
27644437/107227647596617851874060525936579927701  
[4]> (type-of *)  
RATIO
```

Knihovnu CLN používá CLisp, interpret jazyka Lisp. Využívá implementace čísel. Příklad ukazuje, že se zlomky automaticky zkracují. Že je CLisp založen na CLN usuzují podle osoby Bruna Heible-a, který figuruje jako autor jak u CLN, tak u CLisp-u.

**2.4.2.4 Class Library for Numbers [26] (CLN)** CLN je knihovna pro jazyk C++ a je zdarma šířená pod licencí GPL. Implementuje čísla s plovoucí řádovou tečkou racionální čísla jako zlomky, navíc komplexní čísla. Za přesná se považují racionální čísla a komplexní čísla s přesnou imaginární i reálnou částí. Plovoucí čísla pak typově přesně kopírují Lispovské a lze je tedy použít k Lispovským implementacím. Zkratku CLN je tedy možné chápat i jako „Common Lisp Numbers“. Nepřímé použití je na Obrázku 8.

**2.4.2.5 Computable-reals [27]** `computable-reals` je Lispovská knihovna. Je volně ke stažení a dokonce k dostání pomocí `quicklispu`. Podporuje základní funkcionalitu. Její funkce poznáme tak, že končí koncovkou `-r`. Vracené výsledky nejsou čísla, ale vlastního typu `C-REAL`. Defaultně se tisknou výsledky na 20 míst, ale nastavením proměnné `*print-prec*` se tento počet dá měnit [28]. Kromě odmocniny jsou zde třeba základní násobky čísla  $\pi$ , logaritmy, mocniny, základní goniometrické funkce, arcus tangens. Knihovna se používá jako kalkulačka s nastavitelnou přesností. Příklad použití je na Obrázku 9.

Obrázek 9: Používání knihovny `computable-reals`



```
ondix@ondix-Lenovo-Legion-5-15ARH05: ~  
* (sqrt-r 2)  
+1.41421356237309504880...  
* (setq *PRINT-PREC* 50)  
50  
* (sqrt-r 2)  
+1.41421356237309504880168872420969807856967187537695...  
* (type-of *)  
COMPUTABLE-REALS::C-REAL  
* (sin-r -1)  
-0.84147098480789650665250232163029899962256306079837...  
* (*r 8 +log2-r+)  
+5.54517744447956247533785697166541254460400107488204...  
* (tan-r (/r +2pi-r+ 3))  
-1.73205080756887729352744634150587236694280525381038...
```

Na příkladu vidíme výpis odmocniny ze dvou na různé přesnosti, operace násobení a několik matematických funkcí.

**2.4.2.6 Cíl práce** Tolik tedy k strukturám již nyní implementujícím čísla a jejich operace, případně funkce. V některých implementacích se jedná o třídy, v jiných jde o strukturované datové typy. V následujícím textu se pokusíme navázat tam, kde končí naprostá přesnost nad racionálními čísly jazyka Lisp a naprogramujeme knihovnu přinášející některá iracionální čísla.

V této práci nám jde o přesnost a nikoli o rychlost a proto jako nativní typy budu používat právě zlomky, ačkoli pro rychlé operace s desetinnými čísly se používají plovoucí čísla, které mají často i hardwarovou podporu v jednotce FPU. Ostatně proto jsou v Lispu i plovoucí typy [29].

K programování jsem jako textový editor použil *Visual Studio Code* s rozšířením *Rainbow Brackets* a jako překladač *SBCL*.



## Část II

# Implementace

V implementační části propojíme teoreticky orientované výsledky s aplikovaným aspektem a dáme vzniknout knihovně `tnums`. Jak jsem napsal výše, všechna čísla i manipulaci s nimi lze vyjádřit jako funkce. Nejpřímější aplikace tohoto poznání tedy vede k užití funkcionálního paradigmatu. Jako jeho zástupce byl vedoucím práce zvolen Lisp. Nejprve se podíváme na jednoduché převody mezi reprezentacemi v Lispu a `tnumy`, poté se podíváme na matematické operace `tnumů` a nakonec také na matematické funkce `tnumů`.

### 3 Tnumy

Svoje struktury jsem zvolil jako funkce dvou proměnných – reprezentovaného čísla a přesnosti. Podíváme se, jak se dají matematicky definovat, po Lispovsku vymodelovat a na závěr dokážu několik tvrzení, aby čtenář pochopil, jak se s `tnumy` pracuje. Nebude chybět prvních několik kódů, i když nejvíce programování bude spíše ke konci této části.

#### 3.1 Vztah čísel a `tnumů`

Funkce, kterými budu modelovat rekurzivní čísla a implementovat práci s nimi pomocí jazyka Lisp, budu nazývat *True Numbers*, zkráceně *tnums*. Vystihuje to jejich podstatu a cíl – budou ve výsledku opravdovější a přesnější, než ostatní čísla, která by měla mít nekonečný rozvoj, ale jsou uložena jako hodnoty – často jako nějaká plovoucí čísla (jakási Nil Numbers). Vzniknuvší knihovna se pak jmenuje `tnums`.

**Definice 29 (Tnum).** Funkce  $t^x : (0, 1) \rightarrow \mathbb{Q}$ , která pro všechna  $\varepsilon \in (0, 1)$  vrací hodnotu  $t^x(\varepsilon)$  splňující nerovnost

$$|t^x(\varepsilon) - x| \leq \varepsilon \quad (21)$$

se nazývá *tnum čísla  $x$* .

Množinu všech *tnumů čísla  $x$*  značíme  $\mathcal{T}^x = \{t^x | (\forall x \in \mathbb{R})(\forall \varepsilon \in (0, 1)) : |t^x(\varepsilon) - x| \leq \varepsilon\}$ , množinu všech *tnumů* pak symbolem  $\mathfrak{T}$ .

Tnum  $t^x$  je struktura představující rekurzivní číslo  $x$ . Místo vztahu 21 lze psát  $t^x(\varepsilon) \in [x - \varepsilon, x + \varepsilon]$ . Při výpočtu hodnoty *tnumu* nejprve tento *tnum* vytvoříme (toto bude výpočetně rychlé) a jakmile bude vytvořený, necháme ho vyčíslit (zavolat s přesností) a toto může být na dlouho. Vyčíslení tedy odkládáme na nejpozdější možnou dobu. Mluvíme o líném vyhodnocování.

Tnumy přesných čísel lze vyčíslit s dokonalou přesností. Využijí co nejvíce z přesnosti, kterou nabízí Lisp a ten přesně reprezentuje všechna racionální čísla. To je ve shodě s představou o vyčíslení rekurzivního čísla. Pomocí  $\mathfrak{t}^x(\varepsilon)$  tedy získáváme  $q$  z nerovnice 7. Číslu, jak ho chápe Lisp říkám nadále *num* (number).

**Lemma 30 (O numu jako tnumu).** *Pro všechna  $x \in \mathbb{R}$  a všechna  $\varepsilon \in (0, 1)$  platí: číslo  $\mathfrak{t}^x(\varepsilon)$  lze nahradit číslem  $x$ .*

*Důkaz.* Z nerovnosti 21 získáváme  $|\mathfrak{t}^x(\varepsilon) - x| \leq \varepsilon$ . Po dosazení  $\mathfrak{t}^x(\varepsilon) := x$  pak  $|x - x| = 0 \leq \varepsilon$ , což platí pro všechna myslitelná  $x$  i  $\varepsilon$ .  $\square$

Nejpřesnější reprezentace čísla reprezentovaného tnumem reprezentujícím číslo je toto číslo samotné. Proto je tedy vhodné co nejvíce takových čísel přenechat na reprezentaci Lispu a počítat jen s těmi, které nezvládne. Protože Lisp pracuje i se zlomky (typ `ratio`), nejvyšší obor čísel, který umí vracet s nulovou odchylkou jsou racionální čísla.

```
1 (defun num-to-tnum (num)
2   (let ((rat_num (rationalize num)))
3     (lambda (eps) (declare (ignore eps))
4       rat_num)))
```

**Lispový kód 1 (num-to-tnum):** *Funkce převádějící číslo z interní reprezentace Lispu na tnum*

Převod opačným směrem je přímočarý. Chceme-li číslo  $x$  s přesností  $\varepsilon$ , stačí zavolat  $\mathfrak{t}^x(\varepsilon)$ . Přesnost musí být z  $(0, 1)$ , jiné číslo interpretujeme jako  $10^{-|\varepsilon|}$ .

**Lemma 31 (O převodu tnumu na num).** *Pokud existuje funkce  $\mathfrak{t}^x \in \mathcal{T}^x$ , pak po zavolání s argumentem  $\varepsilon$  vrací hodnotu  $\mathfrak{t}^x(\varepsilon)$  splňující  $(|\mathfrak{t}^x(\varepsilon) - x| \leq \varepsilon)$ .*

*Důkaz.* Plyne přímo z definice 29.  $\square$

```
1 (defun rat-expt (num exp)
2   (rationalize (expt num exp)))
```

**Lispový kód 2 (rat-expt):** *Funkce pro racionální umocňování*

```
1 (defun tnum-to-num (tnum eps)
2   (when (or (>= 0 eps) (<= 1 eps))
3     (setf eps (rat-expt 10 (- (abs eps)))))
4   (funcall tnum (rationalize eps)))
```

**Lispový kód 3 (tnum-to-num):** *Funkce převádějící tnum na číslo*

Zatímco tedy pro převod z čísla na tnum jsme toto mohli udělat pro všechna čísla, opačným směrem toto funguje pouze za předpokladu, že daný tnum existuje. V našem systému teď máme jen tnumy pro racionální čísla a umíme je převádět tam a zpět. V dalším textu tedy půjde hlavně o to zaplnit tuto mezeru a přinést existenci co nejvíce tnumů.

### 3.2 Ludolfovo číslo

Prvním iracionálním číslem, které do knihovny přidáme je číslo Ludolfovo.

**Definice 32 (Ludolfovo číslo [30]).** *Ludolfovým číslem myslíme poměr obvodu kružnice k jejímu průměru.*

Ludolfovo číslo je asi nejslavnější transcendentní konstanta a proto není divu, že pro její vyčíslení existuje bezpočet vzorců. Asi nejpřímější je Leibnizův vzorec, který vypočítává čtvrtinu Ludolfova čísla a plyne z Taylorovy řady funkce  $\arctan$  v bodě 1. Pokud Ludolfovo číslo značím  $\pi$ , pak ho lze zapsat jako  $\pi = 4 \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{(-1)^n}{2n+1}$  [31], tato řada ale konverguje velmi pomalu. Já proto použiji aproximaci jinou. Tento vzorec se jmenuje BBP podle svých tvůrců (Bailey, Borwein, Plouffe) a je zapsán ve formě řady.

**Fakt 33 (Ludolfovo číslo jako řada [32]).** *Nechť  $\pi$  značí Ludolfovo číslo. Pak jej lze zapsat jako*

$$\pi = \sum_{i \in \mathbb{N}} \frac{1}{16^i} \left( \frac{4}{8i+1} - \frac{2}{8i+4} - \frac{1}{8i+5} - \frac{1}{8i+6} \right). \quad (22)$$

Mám tedy řadu, která generuje konstantu, kterou chci přidat do **tnums**. Výraz  $\left( \frac{4}{8i+1} - \frac{2}{8i+4} - \frac{1}{8i+5} - \frac{1}{8i+6} \right)$  je pro  $i > 0$  menší než jedna, proto se každý nenulový člen může zhora omezit  $\frac{1}{16^i}$  a to je geometrická posloupnost, jejíž zbytek je dle faktu 26 roven  $\frac{1}{16^{i+1}} * \frac{16}{15}$ , což je  $\frac{1}{16^i * 15}$ . Platí tedy

$$\left| \pi - \sum_{i=0}^n \frac{1}{16^i} \left( \frac{4}{8i+1} - \frac{2}{8i+4} - \frac{1}{8i+5} - \frac{1}{8i+6} \right) \right| \leq \frac{1}{16^n * 15}. \quad (23)$$

**Důsledek 34 (Tnum Ludolfova čísla).** *Nechť  $t$  je funkce s předpisem  $t(\varepsilon) =$ , „najdi nějaké  $n$  tak, aby platilo  $/(16^n 15) \leq \varepsilon$  a poté vrať  $n$ -tý částečný součet řady ze vztahu 22“, pak  $t \in \mathcal{T}^\pi$ .*

Kód vypadá trochu složitěji, ale není to nic jiného, než co bylo právě popsáno. Nižší čitelnost je zde vykoupena vyšší efektivitou a protože je vyčíslování  $\pi$  jedna z nejdůležitějších funkcionalit, rozhodl jsem se ji zavést takto efektivně, ač na úkor čitelnosti.

```

1 (defun tnum-pi ()
2   (lambda (eps)
3     (let ((/16pown 0) (result 0) (above 1))
4       (loop for n from 0
5             until (<= above eps)
6             do (progn
7                 (setf /16pown (rat-expt 16 (- n)))
8                 (incf result
9                     (* /16pown
10                      (- (/ 4 (+ (* 8 n) 1))
11                         (/ 2 (+ (* 8 n) 4))
12                         (/ 1 (+ (* 8 n) 5))
13                         (/ 1 (+ (* 8 n) 6))))))
14               (setf above (/ /16pown 15)))
15       finally (return result))))

```

**Lispový kód 4 (tnum-pi):** *Funkce na vytvoření tnumu Ludolfova čísla*

### 3.3 Přenásobování numem

Posledním dílkem, který přidám v této kapitole je přenásobování tnumu konstantou. Když už máme všechna racionální čísla a Ludolfovo číslo, zvládneme pak i například  $2\pi$  nebo  $\frac{\pi}{-2}$ .

**Věta 35 (O přenásobení tnumu racionální konstantou).** *Necht  $c \in \mathbb{Q}$ ,  $t^x \in \mathcal{T}^x$ ,  $x \in \mathbb{R}$  a funkce  $t(t^x, c)$  má předpis*

$$t(t^x, c)(\varepsilon) = \begin{cases} c * t^x\left(\frac{\varepsilon}{|c|}\right) & \text{pro } c \neq 0, \\ 0 & \text{jinak,} \end{cases} \quad (24)$$

*pak  $t(t^x, c) \in \mathcal{T}^{x*c}$ .*

*Důkaz.* Pokud přenásobíme hodnotu tnumu nulou, je výsledkem nula, protože je to agresivní prvek vůči násobení. Znění věty pro nenulovou konstantu dokážeme tak, že z předpokladu  $|t^x(\varepsilon) - x| \leq \varepsilon$  odvodíme  $|c * t^x(\frac{\varepsilon}{|c|}) - c * x| \leq \varepsilon$ . Protože pracujeme s nerovnicemi, budeme v důkazu postupovat dvěma větvemi – pro  $c$  kladné a záporné.

Z definice tnumu předpokládáme

$$|t^x(\varepsilon) - x| \leq \varepsilon, \quad (25)$$

po přenásobení kladným  $c > 0$  dostáváme

$$c * |t^x(\varepsilon) - x| \leq c * \varepsilon, \quad (26)$$

protože je ale  $c$  kladné, můžu jím absolutní hodnotu roznásobit

$$|c * \mathfrak{t}^x(\varepsilon) - c * x| \leq c * \varepsilon, \quad (27)$$

a protože na pravé straně potřebuji přesnost  $\varepsilon$ , v argumentu ji podělím  $c$  a pak

$$\left| c * \mathfrak{t}^x\left(\frac{\varepsilon}{c}\right) - c * x \right| \leq \varepsilon. \quad (28)$$

Pro zápornou konstantu je běh důkazu podobný a protože jako argument  $\mathfrak{t}$ numů bereme kladné číslo, přibývá v děliteli v argumentu  $\mathfrak{t}$ numu ještě absolutní hodnota. Dohromady pak získáváme

$$\left| c * \mathfrak{t}^x(\varepsilon)^x \left( \frac{\varepsilon}{|c|} \right) - c * x \right| \leq \varepsilon, \quad (29)$$

což jsme chtěli ukázat. □

```

1 (defun tnum*num (tnum num)
2   (let ((rat_num (rationalize num)))
3     (lambda (eps)
4       (if (zerop num)
5           (num-to-tnum 0)
6           (* (tnum-to-num tnum (/ eps (abs rat_num))) rat_num))))))

```

**Lispový kód 5** ( $\mathfrak{t}$ num\*num): *Funkce přenásobující  $\mathfrak{t}$ num racionální konstantou*

**Důsledek 36** (Opačný  $\mathfrak{t}$ num). *Nechť  $\mathfrak{t}^x \in \mathcal{T}^x$ ,  $x \in \mathbb{R}$  a funkce  $\mathfrak{t}(\mathfrak{t}^x)$  má předpis*

$$\mathfrak{t}(\mathfrak{t}^x)(\varepsilon) = -\mathfrak{t}^x(\varepsilon), \quad (30)$$

*pak  $\mathfrak{t}(\mathfrak{t}^x) \in \mathcal{T}^{-x}$ .*

*Důkaz.* Protože  $-x = (-1)x$  a  $|-1| = 1$ , pak podle přechozí věty dostáváme  $-\mathfrak{t}^x(\varepsilon) = (-1)\mathfrak{t}^x(\varepsilon) = (-1)\mathfrak{t}^x(\frac{\varepsilon}{1}) = (-1)\mathfrak{t}^x(\frac{\varepsilon}{|-1|}) = \mathfrak{t}^{(-1)x}(\varepsilon) = \mathfrak{t}^{-x}(\varepsilon) \in \mathcal{T}^{-x}$ . □

```

1 (defun -tnum (tnum)
2   (tnum*num tnum -1))

```

**Lispový kód 6** ( $-\mathfrak{t}$ num): *Funkce pro opačný  $\mathfrak{t}$ num*

## 4 Operace tnumů

Matematické operace se neimplementují všechny stejně složitě. Zatímco aditivní vyřešíme relativně rychle, multiplikativní budou o úroveň těžší, tak mocinné v této kapitole ani nezvládneme a budeme na ně muset počkat až na konec další kapitoly. Začneme tedy operacemi sčítání a odčítání, pak se přesuneme k násobení a dělení.

### 4.1 Aditivní operace

Součet je operace neomezeného počtu argumentů, pro žádný vrací nulu (neutrální prvek aditivní grupy [13]), pro jeden vrací tento a pro více se pak jedná o postupné zvětšování výsledku o hodnoty argumentů. Rozdíl potom vyžaduje alespoň jeden argument, v případě zadání pouze tohoto se vrací tnum k němu opačný, v případě více pak součet prvního a opačného tnumu součtu ostatních.

**Věta 37 (O součtu tnumů).** *Nechť  $\mathbf{t}^{x_0} \in \mathcal{T}^{x_0}, \mathbf{t}^{x_1} \in \mathcal{T}^{x_1}, \dots, \mathbf{t}^{x_n} \in \mathcal{T}^{x_n}$  a funkce  $\mathbf{t}(\mathbf{t}^{x_0}, \mathbf{t}^{x_1}, \dots, \mathbf{t}^{x_n})$  má předpis*

$$\mathbf{t}(\mathbf{t}^{x_0}, \mathbf{t}^{x_1}, \dots, \mathbf{t}^{x_n})(\varepsilon) = \sum_{i=0}^n \mathbf{t}^{x_i} \left( \frac{\varepsilon}{n+1} \right), \quad (31)$$

pak  $\mathbf{t}(\mathbf{t}^{x_0}, \mathbf{t}^{x_1}, \dots, \mathbf{t}^{x_n}) \in \mathcal{T}^{\sum_{i=0}^n x_i}$ .

*Důkaz.* Předpokládejme  $\mathbf{t}^{x_i}(\varepsilon) + \varepsilon \geq x_i$  a  $\mathbf{t}^{x_i}(\varepsilon) - \varepsilon \leq x_i$  pro  $i \in \{0, 1, \dots, n\}$  a ukažme  $\sum_{i=0}^n \mathbf{t}^{x_i} \left( \frac{\varepsilon}{n+1} \right) + \varepsilon \geq \sum_{i=0}^n x_i$  a  $\sum_{i=0}^n \mathbf{t}^{x_i} \left( \frac{\varepsilon}{n+1} \right) - \varepsilon \leq \sum_{i=0}^n x_i$ .

Z definice tnumu předpokládáme

$$\begin{aligned} \mathbf{t}^{x_0} \left( \frac{\varepsilon}{n+1} \right) + \frac{\varepsilon}{n+1} &\geq x_0 \wedge \mathbf{t}^{x_0} \left( \frac{\varepsilon}{n+1} \right) - \frac{\varepsilon}{n+1} \leq x_0, \\ \mathbf{t}^{x_1} \left( \frac{\varepsilon}{n+1} \right) + \frac{\varepsilon}{n+1} &\geq x_1 \wedge \mathbf{t}^{x_1} \left( \frac{\varepsilon}{n+1} \right) - \frac{\varepsilon}{n+1} \leq x_1, \\ &\vdots \\ \mathbf{t}^{x_n} \left( \frac{\varepsilon}{n+1} \right) + \frac{\varepsilon}{n+1} &\geq x_n \wedge \mathbf{t}^{x_n} \left( \frac{\varepsilon}{n+1} \right) - \frac{\varepsilon}{n+1} \leq x_n. \end{aligned} \quad (32)$$

Sečteme teď všechny výrazy a získáváme

$$\sum_{i=0}^n \mathbf{t}^{x_i} \left( \frac{\varepsilon}{n+1} \right) + \sum_{i=0}^n \frac{\varepsilon}{n+1} \geq \sum_{i=0}^n x_i \wedge \sum_{i=0}^n \mathbf{t}^{x_i} \left( \frac{\varepsilon}{n+1} \right) - \sum_{i=0}^n \frac{\varepsilon}{n+1} \leq \sum_{i=0}^n x_i, \quad (33)$$

dále  $\sum_{i=0}^n \frac{\varepsilon}{n+1} = \varepsilon$ , takže

$$\sum_{i=0}^n \mathbf{t}^{x_i} \left( \frac{\varepsilon}{n+1} \right) + \varepsilon \geq \sum_{i=0}^n x_i \wedge \sum_{i=0}^n \mathbf{t}^{x_i} \left( \frac{\varepsilon}{n+1} \right) - \varepsilon \leq \sum_{i=0}^n x_i, \quad (34)$$

což jsme chtěli ukázat.  $\square$

```

1 (defun tnum+ (&rest tnums)
2   (if (null tnums)
3       (num-to-tnum 0)
4       (lambda (eps)
5         (let ((new-eps (/ eps (list-length tnums))))
6           (apply '+
7                 (mapcar (lambda (tnum)
8                           (tnum-to-num tnum new-eps))
9                           tnums)))))))

```

**Lispový kód 7** (tnum+): *Funkce na součet tnumů*

Odčítání využívá právě dokázané věty a také důsledku 36.

**Fakt 38 (Rozdíl tnumů).** *Nechť  $t^{x-1} \in \mathcal{T}^{x-1}$ ,  $t^{x_0} \in \mathcal{T}^{x_0}$ ,  $\dots$ ,  $t^{x_n} \in \mathcal{T}^{x_n}$  a funkce  $t(t^{x-1}, t^{x_0}, \dots, t^{x_n})$  má předpis*

$$t(t^{x-1}, t^{x_0}, \dots, t^{x_n})(\varepsilon) = t^{x-1-\sum_{i=0}^n x_n}(\varepsilon) = t^{x-1+(-\sum_{i=0}^n x_n)}(\varepsilon), \quad (35)$$

*pak  $t(t^{x-1}, t^{x_0}, \dots, t^{x_n}) \in \mathcal{T}^{x-1-x_0-\dots-x_n}$ .*

Kód odpovídá Lispovskému  $-$ , tedy pro jeden argument vrací opačný tnum onoho a pro více argumentů vrací jejich rozdíl.

```

1 (defun tnum- (tnum1 &rest tnums)
2   (if (null tnums)
3       (-tnum tnum1)
4       (tnum+ tnum1 (-tnum (apply 'tnum+ tnums)))))

```

**Lispový kód 8** (tnum-): *Funkce pro rozdíl tnumů, případně opačný tnum*

## 4.2 Multiplikativní operace

Jako první multiplikativní operaci představím převrácení hodnoty tnumu. Je to podobná operace jako opačný tnum, jen jde o jinou inverzi. Protože převrácení pracuje pouze s nenulovými čísly, přidáme do našeho aparátu ještě práci s tnumy nenulových čísel.

**Definice 39 (Nenulový tnum).** *Tnum  $t$ , který nikdy nenabývá nulové hodnoty, neboli  $(\forall \varepsilon \in (0, 1))(t(\varepsilon) \neq 0)$  budeme nazývat nenulový tnum a budeme ho značit  $t_\emptyset$ .*

Čísla, která nenabývají nuly tedy budeme moci reprezentovat nenulovými tnumy.

**Definice 40 (Bezpečné epsilon).** *K libovolnému  $\varepsilon \in (0, 1)$  a tnumu  $\mathbf{t}^x \in \mathcal{T}^x, x \neq 0$  uvažujeme číslo  $\varepsilon_\emptyset$  tak, že*

1.  $0 < \varepsilon_\emptyset \leq \varepsilon$ ,
2.  $\mathbf{t}^x(\varepsilon_\emptyset) \neq 0$  a
3.  $|\mathbf{t}^x(\varepsilon_\emptyset)| > \varepsilon_\emptyset$ .

*a nazýváme jej bezpečným epsilonem. Lze použít též symbol  $\varepsilon_\emptyset(\mathbf{t}^x, \varepsilon)$ , pokud z kontextu není jasné, jaký tnum a  $\varepsilon$  se uvažují.*

**Lemma 41 (O nenulovém tnumu nenulového čísla).** *Tnum nenulového čísla lze vyčíslit nenulově, čili  $(\forall x \in (\mathbb{R} \setminus \{0\}))((\exists \mathbf{t}^x) \rightarrow (\exists \mathbf{t}_\emptyset^x))$ .*

*Důkaz.* Vezměme za  $\mathbf{t}_\emptyset^x$  funkci  $\mathbf{t}$ , která místo  $\varepsilon$  dosadí  $\varepsilon_\emptyset$ , neboli  $\mathbf{t}(\varepsilon) = \mathbf{t}^x(\varepsilon_\emptyset)$ . Pak díky podmínce 1 v definici 40 se přesnost nemůže zhoršit a tudíž vyčíslení proběhne v pořádku. Dále díky bodu 2 ve stejné definici bude vyčíslení nenulové, takže se jedná o nenulový tnum.  $\square$

Bezpečných epsilonů je nekonečně mnoho, stačí nám najít jediný. Funkce pro jeho výpočet potřebuje tnum a epsilon. To je ve shodě se zavedeným symbolem  $\varepsilon_\emptyset(\mathbf{t}^x, \varepsilon)$ . Dále musí kvůli kontrole nenulovosti vypočítat i num zadaného tnumu a musí také vracet nové epsilon. Aby se tnum nevyčísloval vícekrát, když už jeho hodnotu známe, vrací funkce i tento num.

```

1 (defun get-nonzero-num+eps (tnum eps)
2   (let ((num (tnum-to-num tnum eps)))
3     (if (and (zerop num) (<= (abs num) eps))
4         (get-nonzero-num+eps tnum (/ eps 10))
5         (values num eps))))

```

**Lispový kód 9 (get-nonzero-num+eps):** *Funkce pro nalezení přesnosti, při které nebude po aplikaci tnumu nulový výsledek a následně vrácení výsledku i epsilonu*

**Věta 42 (O převráceném tnumu).** *Nechť  $\mathbf{t}^x \in \mathcal{T}^x, x \neq 0$  a funkce  $\mathbf{t}(\mathbf{t}^x)$  má předpis*

$$\mathbf{t}(\mathbf{t}^x)(\varepsilon) = / [ \mathbf{t}^x(\varepsilon_\emptyset(\mathbf{t}^x, (\varepsilon * |\mathbf{t}^x(\varepsilon_\emptyset(\mathbf{t}^x, \varepsilon))| * (|\mathbf{t}^x(\varepsilon_\emptyset(\mathbf{t}^x, \varepsilon))| - \varepsilon_\emptyset(\mathbf{t}^x, \varepsilon))))], \quad (36)$$

*pak  $\mathbf{t}(\mathbf{t}^x) \in \mathcal{T}^{/x}$ .*

*Důkaz.* Podle rovnice 21 platí

$$|\mathbf{t}^x(\varepsilon) - x| \leq \varepsilon, \quad (37)$$



což lze díky lemmatu 41 a předpokladu nenulovosti  $x$  přepsat na

$$|\mathbf{t}^x(\varepsilon_\emptyset(\mathbf{t}^x, \varepsilon)) - x| \leq \varepsilon, \quad (38)$$

díky absolutní hodnotě pak platí

$$|x - \mathbf{t}^x(\varepsilon_\emptyset(\mathbf{t}^x, \varepsilon))| \leq \varepsilon. \quad (39)$$

Nerovnici vydělíme kladným číslem  $|\mathbf{t}^x(\varepsilon_\emptyset(\mathbf{t}^x, \varepsilon)) * x|$

$$\frac{|x - \mathbf{t}^x(\varepsilon_\emptyset(\mathbf{t}^x, \varepsilon))|}{|\mathbf{t}^x(\varepsilon_\emptyset(\mathbf{t}^x, \varepsilon)) * x|} \leq \frac{\varepsilon}{|\mathbf{t}^x(\varepsilon_\emptyset(\mathbf{t}^x, \varepsilon)) * x|} \quad (40)$$

a protože  $|a| * |b| = |a * b|$ , po dvojí aplikaci platí

$$\left| \frac{x - \mathbf{t}^x(\varepsilon_\emptyset(\mathbf{t}^x, \varepsilon))}{\mathbf{t}^x(\varepsilon_\emptyset(\mathbf{t}^x, \varepsilon)) * x} \right| \leq \frac{\varepsilon}{|\mathbf{t}^x(\varepsilon_\emptyset(\mathbf{t}^x, \varepsilon))| * |x|} \quad (41)$$

a po roztržení levého výrazu na rozdílné jmenovatele dostáváme

$$\left| \frac{1}{\mathbf{t}^x(\varepsilon_\emptyset(\mathbf{t}^x, \varepsilon))} - \frac{1}{x} \right| \leq \frac{\varepsilon}{|\mathbf{t}^x(\varepsilon_\emptyset(\mathbf{t}^x, \varepsilon))| * |x|}. \quad (42)$$

Dále díky předpokladu 3 z definice 40  $|x| \geq |\mathbf{t}^x(\varepsilon_\emptyset(\mathbf{t}^x, \varepsilon))| - \varepsilon_\emptyset(\mathbf{t}^x, \varepsilon)$  a proto

$$\left| \frac{1}{\mathbf{t}^x(\varepsilon_\emptyset(\mathbf{t}^x, \varepsilon))} - \frac{1}{x} \right| \leq \frac{\varepsilon}{|\mathbf{t}^x(\varepsilon_\emptyset(\mathbf{t}^x, \varepsilon))| * (|\mathbf{t}^x(\varepsilon_\emptyset(\mathbf{t}^x, \varepsilon))| - \varepsilon_\emptyset(\mathbf{t}^x, \varepsilon))}, \quad (43)$$

takže po úpravě přesnosti dostáváme

$$\left| \frac{1}{\mathbf{t}^x(\varepsilon_\emptyset(\mathbf{t}^x, (\varepsilon * |\mathbf{t}^x(\varepsilon_\emptyset(\mathbf{t}^x, \varepsilon))| * (|\mathbf{t}^x(\varepsilon_\emptyset(\mathbf{t}^x, \varepsilon))| - \varepsilon_\emptyset(\mathbf{t}^x, \varepsilon))))} - \frac{1}{x} \right| \leq \varepsilon. \quad (44)$$

□

```

1 (defun /tnum (tnum)
2   (lambda (eps)
3     (multiple-value-bind (num eps0)
4       (get-nonzero-num+eps tnum eps)
5       (let* ((absnum (abs num))
6              (neweps (* eps absnum (- absnum eps0))))
7         (/ (if (>= neweps eps) num
8              (get-nonzero-num+eps tnum neweps))))))

```

**Lispový kód 10 (/tnum):** Funkce pro převracení hodnoty tnumu. Pokud je nové epsilon větší nebo stejné, vrací se již vypočtený tnum.

Násobení bere libovolně mnoho argumentů. Pro žádný vrátí jedničku (jednotka v multiplikativní grupě [13]), pro jeden vrátí tento a pro více pak jejich součin.

**Věta 43 (O součinu dvou tnumů).** *Nechť  $\mathfrak{t}^x \in \mathcal{T}^x, \mathfrak{t}^y \in \mathcal{T}^y, x, y \in \mathbb{R}$  a funkce  $\mathfrak{t}(\mathfrak{t}^x, \mathfrak{t}^y)$  má předpis*

$$\mathfrak{t}(\mathfrak{t}^x, \mathfrak{t}^y)(\varepsilon) = \mathfrak{t}^x \left( \frac{\varepsilon}{2(|\mathfrak{t}^y(\varepsilon)| + \varepsilon + 1)} \right) * \mathfrak{t}^y \left( \frac{\varepsilon}{2(|\mathfrak{t}^x(\varepsilon)| + \varepsilon + 1)} \right), \quad (45)$$

*pak  $\mathfrak{t}(\mathfrak{t}^x, \mathfrak{t}^y) \in \mathcal{T}^{x*y}$ .*

*Důkaz.* Nejprve si dokážeme dvě nerovnice, které posléze použijeme v těle důkazu. První nerovnicí je

$$\frac{|y|}{|\mathfrak{t}^y(\varepsilon)| + \varepsilon + 1} \leq 1. \quad (46)$$

To je ekvivalentní s

$$|y| \leq |\mathfrak{t}^y(\varepsilon)| + \varepsilon + 1 \quad (47)$$

a protože  $\mathfrak{t}^y(\varepsilon) + \varepsilon \geq y$ , platí

$$|y| \leq |y| + 1, \quad (48)$$

což je jistě pravda.

Druhá nerovnice je

$$\frac{|\mathfrak{t}^x(\frac{\varepsilon}{2(|\mathfrak{t}^y(\varepsilon)| + \varepsilon + 1)})|}{|\mathfrak{t}^x(\varepsilon)| + \varepsilon + 1} \leq 1. \quad (49)$$

Ekvivalentní zápis je

$$\left| \mathfrak{t}^x \left( \frac{\varepsilon}{2(|\mathfrak{t}^y(\varepsilon)| + \varepsilon + 1)} \right) \right| \leq |\mathfrak{t}^x(\varepsilon)| + \varepsilon + 1 \quad (50)$$

a protože  $\mathfrak{t}^x(\varepsilon) + \varepsilon \geq x$ , platí

$$\left| \mathfrak{t}^x \left( \frac{\varepsilon}{2(|\mathfrak{t}^y(\varepsilon)| + \varepsilon + 1)} \right) \right| \leq |x| + 1 \quad (51)$$

a stejným postupem rozepíšeme levou stranu, takže dostáváme

$$|x| + \left| \frac{\varepsilon}{2(|\mathfrak{t}^x(\varepsilon)| + \varepsilon + 1)} \right| \leq |x| + 1 \quad (52)$$

a po odečtení  $|x|$  zbyde

$$\left| \frac{\varepsilon}{2(|\mathfrak{t}^x(\varepsilon)| + \varepsilon + 1)} \right| \leq 1 \quad (53)$$

což ale platí, protože

$$|\mathbf{t}^x(\varepsilon)| + \varepsilon \geq 0. \quad (54)$$

Nyní přejdeme k důkazu věty. Aby věta platila, musíme dokázat

$$\left| \mathbf{t}^x \left( \frac{\varepsilon}{2(|\mathbf{t}^y(\varepsilon)| + \varepsilon + 1)} \right) * \mathbf{t}^y \left( \frac{\varepsilon}{2(|\mathbf{t}^x(\varepsilon)| + \varepsilon + 1)} \right) - xy \right| \leq \varepsilon. \quad (55)$$

Rozepíšeme proto levou stranu

$$\left| \mathbf{t}^x \left( \frac{\varepsilon}{2(|\mathbf{t}^y(\varepsilon)| + \varepsilon + 1)} \right) * \mathbf{t}^y \left( \frac{\varepsilon}{2(|\mathbf{t}^x(\varepsilon)| + \varepsilon + 1)} \right) - xy \right| = \quad (56)$$

přičtením a odečtením členu  $\mathbf{t}^x \left( \frac{\varepsilon}{2(|\mathbf{t}^y(\varepsilon)| + \varepsilon + 1)} \right) y$  dostáváme

$$\begin{aligned} &= \left| \mathbf{t}^x \left( \frac{\varepsilon}{2(|\mathbf{t}^y(\varepsilon)| + \varepsilon + 1)} \right) * \mathbf{t}^y \left( \frac{\varepsilon}{2(|\mathbf{t}^x(\varepsilon)| + \varepsilon + 1)} \right) - \right. \\ &\quad \left. - \mathbf{t}^x \left( \frac{\varepsilon}{2(|\mathbf{t}^y(\varepsilon)| + \varepsilon + 1)} \right) y + \mathbf{t}^x \left( \frac{\varepsilon}{2(|\mathbf{t}^y(\varepsilon)| + \varepsilon + 1)} \right) y - xy \right| \leq \end{aligned} \quad (57)$$

a z trojúhelníkové nerovnosti a po vytknutí  $\left| \mathbf{t}^x \left( \frac{\varepsilon}{2(|\mathbf{t}^y(\varepsilon)| + \varepsilon + 1)} \right) \right|$  z prvních dvou členů a  $|y|$  z druhých dvou máme

$$\begin{aligned} &\leq \left| \mathbf{t}^x \left( \frac{\varepsilon}{2(|\mathbf{t}^y(\varepsilon)| + \varepsilon + 1)} \right) \right| \left| \mathbf{t}^y \left( \frac{\varepsilon}{2(|\mathbf{t}^x(\varepsilon)| + \varepsilon + 1)} \right) - y \right| + \\ &\quad + |y| \left| \mathbf{t}^x \left( \frac{\varepsilon}{2(|\mathbf{t}^y(\varepsilon)| + \varepsilon + 1)} \right) - x \right| \leq \end{aligned} \quad (58)$$

a po dvojím použití pravidla  $|\mathbf{t}^x(\varepsilon) - x| \leq \varepsilon$  získáváme

$$\begin{aligned} &\leq \left| \mathbf{t}^x \left( \frac{\varepsilon}{2(|\mathbf{t}^y(\varepsilon)| + \varepsilon + 1)} \right) \right| \left| \frac{\varepsilon}{2} \right| \left| \frac{1}{(|\mathbf{t}^x(\varepsilon)| + \varepsilon + 1)} \right| + \\ &\quad + |y| \left| \frac{\varepsilon}{2} \right| \left| \frac{1}{(|\mathbf{t}^y(\varepsilon)| + \varepsilon + 1)} \right| = \end{aligned} \quad (59)$$

a zjednodušíme-li zápis pomocí zlomku, dostáváme

$$= \left| \frac{\varepsilon}{2} \right| \frac{\left| \mathbf{t}^x \left( \frac{\varepsilon}{2(|\mathbf{t}^y(\varepsilon)| + \varepsilon + 1)} \right) \right|}{(|\mathbf{t}^x(\varepsilon)| + \varepsilon + 1)} + \left| \frac{\varepsilon}{2} \right| \frac{|y|}{(|\mathbf{t}^y(\varepsilon)| + \varepsilon + 1)} \leq \quad (60)$$

a díky dokázaným nerovnostem 46 a 49 pak platí

$$\leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \quad (61)$$

□

Právě dokázaná věta mluví o součinu dvou tnumů. Zobecnění na konečný počet tnumů by v tomto bodě šlo naprogramovat akumulací. To je ale neefektivní řešení a proto by bylo dobré najít obecnou funkci. Následující vztah není dokázaný, vychází však z tvaru násobení pro dva tnumy.

**Fakt 44 (Součin tnumů).** *Nechť  $t^{x_i} \in \mathcal{T}^{x_i}$ ,  $x_i \in \mathbb{R}$  pro  $i = 0, 1, \dots, n$  a funkce  $t(t^{x_0}, t^{x_1}, \dots, t^{x_n})$  má předpis*

$$t(t^{x_0}, t^{x_1}, \dots, t^{x_n})(\varepsilon) = \prod_{i=0}^n t^{x_i} \left( \frac{\varepsilon}{(n+1) * \prod_{j=0, i \neq j}^n (|t^{x_j}(\varepsilon)| + \varepsilon + 1)} \right), \quad (62)$$

*pak  $t(t^{x_0}, t^{x_1}, \dots, t^{x_n}) \in \mathcal{T}^{\prod_{i=0}^n x_i}$ .*

Věta mluví o nenulových číslech. Nesnižujeme ale obecnost, protože nula je agresivní prvek a výsledkem násobení čehokoli s nulou je nula, takže se ostatní numy ani nemusejí počítat a výsledek se může vrátit.

Samotná implementace pak využívá pomocnou mapovací funkci, která vypadá trochu složitěji, ale velmi zlepšila porozumění funkci `tnum*`, o kterou nám teď jde především. Nejprve tedy pomocná

```

1 (defun create-list-for-multiplication (tnums eps)
2   (let ((result nil)
3         (nums
4           (mapcar (lambda (tnum) (tnum-to-num tnum eps)) tnums)))
5     (dotimes (i (list-length tnums) result)
6       (let ((actual-eps (/ eps (list-length tnums))))
7         (dotimes (j (list-length tnums))
8           (unless (= i j)
9             (setf actual-eps (/ actual-eps
10                                (+ (nth j nums) eps 1)))))
11         (setf result (cons
12                     (tnum-to-num (nth i tnums) actual-eps)
13                     result))))))

```

**Lispový kód 11** (`create-list-for-multiplication`): *Pomocná funkce pro násobení*

a konečně už slíbená hlavní funkce.

```

1 (defun tnum* (&rest tnums)
2   (if (null tnums)
3       (num-to-tnum 1)
4       (lambda (eps)
5         (apply '* (create-list-for-multiplication tnums eps)))))

```

**Lispový kód 12** (`tnum*`): *Funkce pro násobení tnumů*

Druhou obecnou multiplikativní funkcí je dělení.

**Fakt 45 (Podíl tnumů).** *Nechť  $\mathfrak{t}^{x_i} \in \mathcal{T}^{x_i}$  pro  $x = -1, 0, \dots$ , na funkce  $\mathfrak{t}(\mathfrak{t}^{x_{-1}}, \mathfrak{t}^{x_0}, \dots, \mathfrak{t}^{x_n})$  má předpis*

$$\mathfrak{t}(\mathfrak{t}^{x_{-1}}, \mathfrak{t}^{x_0}, \dots, \mathfrak{t}^{x_n}) = \mathfrak{t}^{x_{-1} / \prod_{i=0}^n x_i} = \mathfrak{t}^{x_{-1} * (\prod_{i=0}^n x_i)}, \quad (63)$$

*pak  $\mathfrak{t}(\mathfrak{t}^{x_{-1}}, \mathfrak{t}^{x_0}, \dots, \mathfrak{t}^{x_n}) \in \mathcal{T}^{x_{-1}/x_0/\dots/x_n}$ .*

Jedná se o tnumovský protějšek funkce  $/$ . Pro jeden argument vrací jeho převrácení, pro více pak jejich postupný podíl.

```

1 (defun tnum/ (tnum1 &rest tnums)
2   (if (null tnums)
3       (/tnum tnum1)
4       (tnum* tnum1 (/tnum (apply 'tnum* tnums)))))

```

**Lispový kód 13** (tnum/): *Funkce pro dělení tnumů*

Pro tnumy  $a, b \in \mathfrak{T}$  existuje tnum  $a + b$  a  $a * b$ . Tyto operace jsou tedy uzavřené. Tnum i v tomto smyslu dobře reprezentuje rekurzivní číslo, rekurzivní čísla totiž tvoří číselné těleso [33].

### 4.3 Mocninné operace

Jak už sem psal v úvodu k této kapitole, na mocnění a odmocňování ještě nemáme v našem systému dostatečný aparát. K implementaci mocninných operací totiž potřebujeme funkce přirozeného logaritmu a exponenciály, které přidáme až v další kapitole.

**Lemma 46 (O mocnině tnumu).** *Mějme  $a > 0$  a  $b \in \mathbb{R}$ , pak jejich mocninu  $a^b$  lze vyjádřit jako  $e^{(b*\ln(a))}$ .*

*Důkaz.* Kladné číslo  $a$  lze vyjádřit jako  $e^{(\ln(a))}$ ,  $a^b$  je pak  $e^{(\ln(a))^b}$ , což je pak  $e^{(b*\ln(a))}$ .  $\square$

Odmocninu potom přijmeme jako mocninu obrácené hodnoty.

**Fakt 47 (Odmocnina jako mocnina [7]).** *Mějme  $a, b \in \mathbb{R}^+$ . Pak platí*

$$\sqrt[a]{b} = b^{(a^{-1})} \quad (64)$$

Operace dokončíme na konci následující kapitoly.

## 5 Funkce tnumů

Knihovna `tnums` v této chvíli umí přidávat racionální čísla, Ludolfovo číslo a provádět mezi nimi multiplikativní a aditivní operace. Bylo by vhodné teď přidat další rekurzivní čísla. Jejich dobrým zdrojem, jak jsem napsal již v podkapitole 1.4, jsou matematické funkce. V této kapitole se podíváme na funkci exponenciální, šest funkcí goniometrických a přirozený logaritmus. Na konci potom dodělám matematické operace a tím bude knihovna v použitelné verzi hotová.

### 5.1 Aproximace funkcí

Představa funkce `tnumu` je, že bude opět vracet `tnum`. Chci totiž opět libovolnou přesnost a také umožnit zřetězování funkcí. Hledám pak formu aproximace, která bude umožňovat libovolně škálovat, jak blízko ke kýženému číslu se výpočet ukončí. Dobrým nástrojem k tomu jsou Taylorovy polynomy. Ty se snaží hledat hodnotu  $T(x)$  tak, aby byla co nejbližší hledané hodnotě  $f(x)$  tak, že z nějakého bodu, kterému budeme říkat počátek, se co nejlépe snaží nepodobit průběh funkce, kterou aproximují. Pro funkci  $f$  budu Taylorův polynom stupně  $n$  se středem v  $a$  značit  $T_n^{f,a}$ . Pro práci s Taylorovými polynomy potřebujeme ještě naprogramovat faktoriál přirozeného čísla. To bývá typická úloha na rekurzi – té se ale vyhýbáme, protože pro velké vstupy může přetékat zásobník. Iterativní verze by tímto neduhem neměla trpět.

```
1 (defun factorial (n)
2   (let ((result 1))
3     (loop for i from n downto 1
4           do (setf result (* result i)))
5     result))
```

**Lispový kód 14 (factorial):** *Funkce pro výpočet faktoriálu přirozeného čísla*

Podívejme se teď na to, jak se prakticky dá počítat aproximace funkce v bodě  $x$ . Nejjednodušší je vzít funkci  $T_0^{f,a}(x) = f(a)$ . Je to jednoduchá aproximace, která na velmi blízkém okolí bodu  $a$  může fungovat i velmi uspokojivě. Lepší nápadem je vzít přímkou, která se bude dotýkat grafu funkce  $f$  v bodě  $a$ . Předpis takového bude  $T_1^{f,a}(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$ . To už je lepší aproximace, protože nebere v úvahu jen hodnotu funkce  $f$  v bodě  $a$  ale i její první derivaci, takže víme více o směru, kam se možná bude pohybovat. Ještě lepším nápadem pak je vzít parabolou přimknutou k grafu funkce  $f$  jako  $T_2^{f,a}(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2}(x - a)^2$ . Teď už zohledňujeme funkční hodnotu, směr křivky i konvexnost. Ještě lepším nápadem je použít  $T_3^{f,a}(x) : y = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2}(x - a)^2 + \frac{f'''(a)}{6}(x - a)^3 \dots$  [34].

PŘIPOMENUTÍ 48 (TAYLOROVA A MACLAURINOVA ŘADA). Kdybychom takto postupovali donekonečna (v limitním smyslu), dostali bychom Taylorovu řadu z definice 22. Pro  $a = 0$  pak Taylorovu řadu nazýváme řadou Maclaurinovou.

Lze odvodit, že pokud Taylorovy zbytky konvergují k nule, lze Taylorovou řadou  $T_{\infty}^{f,a}$  nahradit funkcí  $f$  [15]. Nám ale nestačí pouhá konvergence zbytků, ale chtěli bychom jejich velikost nějak omezovat. Nejprve si zkusme nějakou formou zbytky vyjádřit.

**Fakt 49 (Taylorova věta [35]).** *Nechť  $f$  má spojité derivace až do řádu  $n + 1$  na nějakém intervalu obsahujícím  $a$ . Pak pro každé  $x$  z tohoto intervalu máme Taylorův vzorec*

$$f(x) = T_n^{f,a}(x) + R_n^{f,a}(x), \text{ kde} \quad (65)$$

$$T_n^{f,a}(x) = \sum_{i=0}^n \frac{f^{(i)}(a)}{i!} (x - a)^i, \quad (66)$$

$$R_n^{f,a}(x) = \int_a^x \frac{(x - t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt. \quad (67)$$

Navíc existuje číslo  $\xi$ , z intervalu s krajními body  $x$  a  $a$  takové, že

$$R_n^{f,a}(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n + 1)!} (x - a)^{n+1}. \quad (68)$$

Pro důkaz vizte kapitolu 7.5 v [35].

Součet v rovnici 66 nazýváme Taylorův polynom funkce  $f$  stupně  $n$  v bodě  $a$ ,  $R_n^{f,a}(x)$  nazýváme  $n$ -tým Taylorovým zbytkem. Vyjádření 67 pak říkáme *integrální tvar* zbytku a 68 je Lagrangeův tvar zbytku [34].

Když už máme vyjádřeny zbytky, můžeme se pokusit je zhora omezovat, stejně jako tomu bylo u geometrické řady. Ve skutečnosti nám na celou kapitolu vystačí pouze tyto dva mechanismy, tedy *Taylorův zbytek* a *Zbytek geometrické řady*.

## 5.2 Exponenciála

Exponenciála je funkce s předpisem  $\exp(x) = e^x$  kde  $e$  je tzv. *Eulerovo číslo* definované  $e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$  [12]. To je transcendentní konstanta a je to též základ přirozeného logaritmu. Exponenciále se proto také dá říkat přirozená mocnina. Ještě podotkněme, že  $\frac{d}{dx} \exp(x) = \exp(x)$ .

POZNÁMKA 50 (ZNAČENÍ EXPONENCIÁLY). Mimo informatickou oblast jsem si nikde nevšiml, že by se exponenciála čísla  $x$  značila jinak než  $e^x$ , mé značení  $\exp(x)$  tedy možná působí neadekvátně. V dalším textu ale používám i pouze funkci  $(\exp)$ , nikoli její hodnotu  $(\exp(x))$  a předpis  $e^x$  umožňuje jen toto druhé

použití. Proto se omlouvám matematickému čtenáři za neintuitivní značení, ale je zde důvodné. Navíc lépe vyjadřuje, že je exponenciála funkcí. ■

### 5.2.1 Exponenciála čísla

**Fakt 51 (Exponenciála jako Maclaurinova řada [15]).** Funkci  $\exp(x)$  lze vyjádřit jako Maclaurinovu řadu ve tvaru

$$\exp(x) = \sum_{i \in \mathbb{N}} \frac{x^i}{i!} = \frac{1}{1} + \frac{x}{1} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \quad (69)$$

Podívejme se nyní na zbytek této řady. Když rozepíšeme Lagrangeův tvar, získáváme pro nějaké  $\xi \in (0, x)$

$$R_n^{\exp,0}(x) = \frac{e^\xi}{(n+1)!} x^{n+1}. \quad (70)$$

Podotkněme, že exponenciála je rostoucí a že  $e < 2.72$  a proto

$$(\forall \xi \in (0, x))(\exp(\xi) < \exp(x) < 2.72^x). \quad (71)$$

Když vše poskládáme dohromady, získáváme aproximaci exponenciály na shora omezenou přesnost, pro  $x \in \mathbb{R}$  platí

**Fakt 52 (Omezení Taylorova zbytku exponenciály).**

$$|R_n^{\exp,0}(x)| = \left| \exp(x) - \sum_{i=0}^n \frac{x^i}{i!} \right| \leq \left| \frac{2.72^x}{(n+1)!} x^{n+1} \right|. \quad (72)$$

**Důsledek 53 (O tnumu exponenciály numu).** Pro všechna  $\varepsilon$  existuje  $n \in \mathbb{N}^+$  tak, aby  $\left| \frac{2.72^x}{(n+1)!} x^{n+1} \right| \leq \varepsilon$  a nechť funkce  $\mathfrak{t}(x)$  má předpis

$$\mathfrak{t}(x)(\varepsilon) = \sum_{i=0}^n \frac{x^i}{i!}, \quad (73)$$

pak  $\mathfrak{t}(x) \in \mathcal{T}^{\exp(x)}$ ,  $x \in \mathbb{Q}$ .

*Důkaz.* Existence čísla  $n$  je zřejmá z definice limity posloupnosti a z toho, že limita podílu polynomu a faktoriálu je rovna nule.

Dále protože  $\exp(x) = T_n^{\exp,0}(x) + R_n^{\exp,0}(x)$ , lze psát

$$T_n^{\exp,0}(x) \in [\exp(x) - |R_n^{\exp,0}(x)|, \exp(x) + |R_n^{\exp,0}(x)|], \quad (74)$$

přičemž dle předchozího faktu platí

$$T_n^{\exp,0}(x) \in \left[ \exp(x) - \left| \frac{2.72^x}{(n+1)!} x^{n+1} \right|, \exp(x) + \left| \frac{2.72^x}{(n+1)!} x^{n+1} \right| \right] \quad (75)$$



a z předpokladu pak

$$T_n^{\exp,0}(x) \in [\exp(x) - \varepsilon, \exp(x) + \varepsilon]. \quad (76)$$

□

Při implementaci stačí jen iterovat přes  $n$ , dokud nebude právě odvozené omezení zbytku menší než kýžená přesnost. Stejný přístup jsme viděli již u Ludolfova čísla.

```

1 (defun num-exp (num eps)
2   (let ((above (rat-exp 272/100 num)) (n 0)
3         (nfact 1) (xpown 1) (result 1))
4     (loop
5       until (<= (/ (* above xpown) nfact) eps)
6       do (progn
7           (incf n)
8           (setf nfact (factorial n)
9                 xpown (expt num n))
10          (incf result (/ xpown nfact)))
11       finally (return result))))

```

**Lispový kód 15** (`num-exp`): *Funkce pro výpočet exponenciály čísla na danou přesnost*

POZNÁMKA 54 (EULEROVO ČÍSLO JAKO EXPONENCIÁLA). Protože triviálně platí  $e = e^1$ , můžu do knihovny přidat i samotné Eulerovo číslo jako jednoduchou uživatelskou funkci.

```

1 (defun tnum-e ()
2   (lambda (eps)
3     (num-exp 1 eps)))

```

**Lispový kód 16** (`tnum-e`): *Funkce pro tnum Eulerova čísla* ■

Už tedy umíme exponenciálu čísla na danou přesnost. Teď jsme tedy ve stádiu, kdy lze pro  $q \in \mathbb{Q}$  napsat


$$(\text{num-exp } q) \in \mathcal{T}^{\exp(q)}. \quad (77)$$

To není malý výsledek, bohužel nás ale sotva uspokojí. Nyní ještě musíme rozšířit funkcionalitu na všechna reálná čísla, která mají tnum. Opět jde o linku rozdílu mezi racionálními a rekurzivními čísly, která prochází celou prací.


### 5.2.2 Exponenciála tnumu

Víme, že  $t^x(\varepsilon) \in [x - \varepsilon, x + \varepsilon]$ , podívejme se, jak se chová přesnost čísla po projití exponenciální funkcí.

Obrázek 10: Obraz přesnosti po průchodu exponenciálou



Horní interval je vyšší než spodní.




Interval  $[x - \varepsilon, x + \varepsilon]$  se nezobrazí na  $[e^x - \varepsilon, e^x + \varepsilon]$ . Tím pádem  $t^{\exp(t^x(\varepsilon))} \notin \mathcal{T}^{\exp(x)}, x \in \mathbb{R}$ .

Vidíme, že  $|(x - \varepsilon) - x| = |(x + \varepsilon) - x|$ , ale  $|\exp(x - \varepsilon) - \exp(x)| \neq |\exp(x + \varepsilon) - \exp(x)|$ .


$\varepsilon) - \exp(x)|$ , tedy že přesnost se průchodem nelineární funkcí deformuje a proto se interval  $[\exp(x - \varepsilon), \exp(x + \varepsilon)]$  neshoduje s intervalem  $[\exp(x) - \varepsilon, \exp(x) + \varepsilon]$ . Důsledkem pak je, že nelze rozšířit funkce racionálních čísel na tnumy ve smyslu  $\mathbf{t}(\varepsilon) := \mathbf{t}^{\exp(\mathbf{t}^x(\varepsilon))}(\varepsilon)$ , ale budeme to muset udělat šetrněji.

Pátráme po metodě, která nám řekne, jak přesné má být číslo na vstupu do funkce, aby jeho obraz byl v zadané přesnosti.

Obrázek 11: Vzor přesnosti před průchodem exponenciálou



Levý interval je širší než pravý.




Hledáme, jaké okolí bodu  $x$  se zobrazí na  $\varepsilon$ -okolí bodu  $e^x$ .

Když si to vyneseme do rovnice, bude vypadat

$$\exp(x) + \varepsilon = \exp(x + w), \quad (78)$$

kde hledaná neznámá je  $w$ .



Podívejme se nyní, jaký vztah je mezi  $w$  a  $\varepsilon$ . Pro úhel  $\alpha$  při vrcholu  $W$  platí, že  $\text{ctan}(\alpha) = \frac{\varepsilon}{w}$ . Tedy

$$w = \frac{\varepsilon}{\text{ctan}(\alpha)} = \frac{\varepsilon}{\tan(\frac{\pi}{2} - \alpha)} = \frac{\varepsilon}{\exp(x + w)}. \quad (79)$$

Poslední úprava je přepsání skutečnosti, že tangens je v tomto bodě roven derivaci a derivace exponenciály je exponenciála. Vychází rekursivní vztah pro  $w$ , po jeho dosazení do vztahu 78 dostáváme

$$\exp(x) + \varepsilon = \exp\left(x + \frac{\varepsilon}{\exp\left(x + \frac{\varepsilon}{\exp(x + \dots)}\right)}\right). \quad (80)$$

Podobným způsobem lze odvodit i vztah pro opačný kraj okolí a to

$$\exp(x) - \varepsilon = \exp\left(x - \frac{\varepsilon}{\exp\left(x - \frac{\varepsilon}{\exp(x - \dots)}\right)}\right), \quad (81)$$

dohromady to pak po propojení s notací  $\mathfrak{t}$ numů dává vztah

$$\mathfrak{t}^{\exp(x)}(\varepsilon) \in \left[ \exp\left(x - \frac{\varepsilon}{\exp\left(x - \frac{\varepsilon}{\exp(x - \dots)}\right)}\right), \exp\left(x + \frac{\varepsilon}{\exp\left(x + \frac{\varepsilon}{\exp(x + \dots)}\right)}\right) \right]. \quad (82)$$

**POZNÁMKA 55 (OBEČNĚJŠÍ PŘESNOST VZORU).** Odložím si zde obecnější tvrzení, které vychází z právě dokázaného vztahu pro exponenciálu, jeho platnost by nyní měla být jasná pro všechny neklesající funkce spojitě v  $x$ .

**Lemma 56 (O přesnosti závislé proměnné).**

$$f(x) + \varepsilon = f(x + w), \text{ kde } w = f\left(x + \frac{\varepsilon}{f'(x + w)}\right). \quad (83)$$

*Důkaz.* Tělo důkazu je již v řádcích a obrázcích nad tímto lemmatem. Protože  $\varepsilon$  může být jakkoli malé, je úhel  $\alpha$  roven derivaci v bodě  $x + w$  a proto pak platí právě uvedený vztah.  $\square$

Z výše uvedených vztahů by mělo být jasné, že při implementaci budeme hledat pevný bod a proto si zavedeme tzv. *precizní iterátor*.

**Definice 57 (Precizní iterátor exponenciály).** *Definujme následující posloupnost:*

$$[t^x]_0^{\text{exp}, \varepsilon} = t^{\text{exp}(t^x(\varepsilon))}(\varepsilon), \quad (84)$$

$$[t^x]_{n+1}^{\text{exp}, \varepsilon} = t^{\text{exp}\left(t^x\left(\frac{\varepsilon}{|[t^x]_n^{\text{exp}, \varepsilon}| + \varepsilon}\right)\right)}(\varepsilon) \quad (85)$$

a pokud existuje  $m$  tak, že

$$[t^x]_m^{\text{exp}, \varepsilon} = [t^x]_{m+1}^{\text{exp}, \varepsilon}, \text{ pak klademe } [t^x]_{\infty}^{\text{exp}, \varepsilon} := [t^x]_m^{\text{exp}, \varepsilon}. \quad (86)$$

**Důsledek 58 (O exponenciále tnumu).** *Necht  $t^x \in \mathcal{T}^x, x \in \mathbb{R}$  a  $t^{\text{exp}(q)} \in \mathcal{T}^{\text{exp}(q)}, q \in \mathbb{Q}$  a funkce  $t(t^x)$  má předpis*

$$t(t^x)(\varepsilon) = [t^x]_{\infty}^{\text{exp}, \varepsilon}, \quad (87)$$

pak  $t(t^x) \in \mathcal{T}^{\text{exp}(x)}, x \in \mathbb{R}$ .

*Důkaz.* Vychází přímo ze vztahu 82.  $\square$

```

1 (defun tnum-exp (tnum)
2   (lambda (eps)
3     (loop for i from 0
4           for num = (if (zerop i) (tnum-to-num tnum eps) new)
5           for new = (if (zerop i) 1
6                       (if (> expnum 1)
7                           (tnum-to-num tnum (/ eps
8                                           (+ expnum eps)))
9                           num))
10          for expnum = (num-exp num eps)
11          until (= num new) finally (return expnum))))

```

**Lispový kód 17 (tnum-exp):** *Funkce pro rozšíření funkcí z racionálních čísel na tnumy*

## 5.3 Goniometrické

Goniometrické funkce jsou opět reálné funkce reálné proměnné. Poznamenejme, že  $\frac{d}{dx}\sin(x) = \cos(x)$ ,  $\frac{d}{dx}\cos(x) = -\sin(x)$  a že  $H(\sin) = [-1, 1] = H(\cos)$ .

### 5.3.1 Sinus

**Fakt 59 (Sinus jako Maclaurinova řada [15]).** Funkci  $\sin(x)$  lze vyjádřit jako Maclaurinovu řadu ve tvaru

$$\sin(x) = \sum_{i \in \mathbb{N}} (-1)^i \frac{x^{2i+1}}{(2i+1)!} = \frac{x}{1} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots \quad (88)$$

Dále protože jsou funkční hodnoty všech možných derivací v intervalu  $[-1, 1]$ , lze Lagrangeův tvar zbytku vyjádřit bez znaménka a pak díky Taylorově větě platí

$$|\mathcal{R}_n^{\sin,0}(x)| \leq \left| \frac{x^{2n+1+1}}{(2n+1+1)!} \right| = \left| \frac{x^{2n+2}}{(2n+2)!} \right|. \quad (89)$$

**Důsledek 60 (Sinus numu).** Pro všechna  $\varepsilon$  existuje  $n \in \mathbb{N}^+$  tak, aby  $\left| \frac{x^{2n+2}}{(2n+2)!} \right| \leq \varepsilon$  a nechť funkce  $\mathbf{t}(x)$  má předpis

$$\mathbf{t}(x)(\varepsilon) = \sum_{i=0}^n (-1)^i \frac{x^{2i+1}}{(2i+1)!}, \quad (90)$$

pak  $\mathbf{t}(x) \in \mathcal{T}^{\sin(x)}, x \in \mathbb{Q}$ .

*Důkaz.* Běží podobně jako u exponenciály. Jde opět o exponenciálu nad faktoriálem, proto je jasná limita i existence  $n$ . Dále z omezení  $R_n^{\sin,0}$  lze odvodit  $T_n^{\sin,0} \in [\sin(x) - |R_n^{\sin,0}|, \sin(x) + |R_n^{\sin,0}|]$  a pak  $T_n^{\sin,0} \in [\sin(x) - \left| \frac{x^{2n+2}}{(2n+2)!} \right|, \sin(x) + \left| \frac{x^{2n+2}}{(2n+2)!} \right|]$  a tudíž  $T_n^{\sin,0} \in [\sin(x) - \varepsilon, \sin(x) + \varepsilon]$ , z čehož pak  $\mathcal{T}^{\sin(x)}(\varepsilon) = T_n^{\sin,0}(x)$ .  $\square$

```

1 (defun num-sin (x eps)
2   (let ((result 0))
3     (loop for n from 0
4           for 2n+1 = (1+ (* 2 n))
5           do (incf result
6                 (/ (rat-expt x 2n+1)
7                   (factorial 2n+1) (expt -1 n)))
8           until (< (abs (/ (rat-expt x (1+ 2n+1))
9                           (factorial (1+ 2n+1))))
10                  eps)
11           finally (return result))))

```

**Lispový kód 18 (num-sin):** Funkce pro sinus čísla

Protože derivace sinu je kosinus, který nabývá hodnot mezi  $-1$  a  $1$ , nebude nutné provádět korekce přesnosti podle funkční hodnoty derivace a tato skutečnost vede na jednoduchý vztah.

**Lemma 61 (O sinu tnumu).** *Nechť  $\mathbf{t}^x \in \mathcal{T}^x, x \in \mathbb{R}$  a  $\mathbf{t}^{\sin(q)} \in \mathcal{T}^{\sin(q)}, q \in \mathbb{Q}$  a funkce  $\mathbf{t}(\mathbf{t}^x)$  má předpis*

$$\mathbf{t}(\mathbf{t}^x)(\varepsilon) = \mathbf{t}^{\sin(\mathbf{t}^x(\varepsilon))}(\varepsilon), \quad (91)$$

*pak  $\mathbf{t}(\mathbf{t}^x) \in \mathcal{T}^{\sin(x)}, x \in \mathbb{R}$ .*

*Důkaz.* Plyne nepřímo z lemmatu 56 a z omezení absolutních funkčních hodnot kosinu jedničkou. Lemma nelze použít doslovně, protože kosinus není neklesající funkce, ale z argumentu o omezení funkčních hodnot plyne, že nás stejně přesný tvar vzoru přesnosti a tudíž ani bod derivace nezajímá.  $\square$

```

1 (defun tnum-sin (tnum)
2   (lambda (eps)
3     (num-sin (tnum-to-num tnum eps) eps)))

```

Lispový kód 19 (tnum-sin): *Funkce pro sinus tnumu*

### 5.3.2 Kosinus

**Fakt 62 (Kosinus jako Maclaurinova řada [15]).** *Funkci  $\cos(x)$  lze vyjádřit jako Maclaurinovu řadu ve tvaru*

$$\cos(x) = \sum_{i \in \mathbb{N}} (-1)^i \frac{x^{2i}}{(2i)!} = \frac{1}{1} - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots \quad (92)$$

Z Taylorovy věty získáváme omezení Taylorova zbytku

$$|R_n^{\cos}(x)| \leq \left| \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \right| \quad (93)$$

a proto opět hledáme takové  $n$ , že když pro jakékoli  $\varepsilon$  je  $\left| \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \right| \leq \varepsilon$ , pak

**Důsledek 63 (Kosinus numu).** *Nechť  $\mathbf{t}(x)$  je funkce s předpisem  $\mathbf{t}(x)(\varepsilon)$  = „najdi nějaké  $n$  tak, aby  $\left| \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \right| \leq \varepsilon$  a pak vrať  $n$ -tý částečný součet řady ze vztahu 92“, pak  $\mathbf{t} \in \mathcal{T}^{\cos(x)}, x \in \mathbb{Q}$ .*

```

1 (defun num-cos (x eps)
2   (let ((result 0))
3     (loop for n from 0
4           for 2n = (* 2 n)
5           do (incf result
6                 (/ (rat-expt x 2n)
7                   (factorial 2n)
8                     (expt -1 n)))
9           until (< (abs (/ (rat-expt x (1+ 2n))
10                          (factorial (1+ 2n))))
11                  eps)
12   finally (return result))))

```

**Lispový kód 20** (num-cos): *Funkce pro výpočet kosinu čísla*

A nakonec právě naprogramovanou funkci využijeme ke kosinování jakékoli proměnné s tnumem. Postup je stejný jako u sinu a proto už nepíši příslušné lemma.

```

1 (defun tnum-cos (tnum)
2   (lambda (eps)
3     (num-cos (tnum-to-num tnum eps) eps)))

```

**Lispový kód 21** (tnum-cos): *Funkce pro výpočet kosinu tnumu*

Zbylé goniometrické funkce už naprogramujeme uživatelsky.

### 5.3.3 Další goniometrické funkce

Další goniometrickou funkcí je tangens. Dá se vyjádřit pomocí sinu a kosinu, díky čemuž ho nemusím vyjadřovat jako řadu, i když pro všechny goniometrické funkce řady existují. Nejsou ale konvergentní na celé reálné ose, takže se pro naši knihovnu nehodí.

**Fakt 64** (Tangens jako poměr sinu a kosinu [7]).

$$\operatorname{tg}(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)} \quad (94)$$

ÚMLUVA 65 (O VYPUŠTĚNÍ NĚKTERÝCH DŮSLEDKŮ). Nyní by měl následovat důsledek že  $t(t^x) = t^{t^{\sin(x)}/t^{\cos(x)}} \in \mathcal{T}^{\tan(x)}$ ,  $x \in \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ , což je ale myslím jasné a proto zde ani u dalších zřejmých přepsání vzorečků do jazyka tnumů tyto důsledky neuvádím. ■



```

1 (defun tnum-tan (tnum)
2   (tnum/ (tnum-sin tnum) (tnum-cos tnum)))

```

**Lispový kód 22 (tnum-tan):** *Funkce pro výpočet tangentu tnumu*

Zbylé funkce jsou obrácenou hodnotou již napsaných.

**Fakt 66 (Kosekans jako obrácená hodnota sinu [7]).**

$$\csc(x) = \sin^{-1}(x) \quad (95)$$

```

1 (defun tnum-csc (tnum)
2   (/tnum (tnum-sin tnum)))

```

**Lispový kód 23 (tnum-csc):** *Funkce pro výpočet kosekantu tnumu*

**Fakt 67 (Sekans jako obrácená hodnota kosinu [7]).**

$$\sec(x) = \cos^{-1}(x) \quad (96)$$

```

1 (defun tnum-sec (tnum)
2   (/tnum (tnum-cos tnum)))

```

**Lispový kód 24 (tnum-sec):** *Funkce pro výpočet sekantu tnumu*

**Fakt 68 (Kotangens jako obrácená hodnota tangentu [7]).**

$$\cotg(x) = \tan^{-1}(x) = \frac{\cos(x)}{\sin(x)} \quad (97)$$

```

1 (defun tnum-ctan (tnum)
2   (tnum/ (tnum-cos tnum) (tnum-sin tnum)))

```

**Lispový kód 25 (tnum-ctan):** *Funkce pro výpočet kotangentu tnumu*

## 5.4 Logaritmus

Logaritmus je inverzní funkce k exponenciále. Je opět vyjadřitelná řadou.

**Fakt 69 (Logaritmus jako řada [36]).** *Pro  $x \in \mathbb{R}^+$  platí*

$$\ln(x) = 2 \sum_{i \in \mathbb{N}} \frac{1}{2i+1} \left( \frac{x-1}{x+1} \right)^{2i+1} \quad (98)$$

Člen  $\frac{1}{2i+1}(\frac{x-1}{x+1})^{2i+1}$  je menší než  $(\frac{x-1}{x+1})^{2i+1}$  a tento je menší než  $(\frac{x-1}{x+1})^{2i}$ . Toto je geometrická posloupnost, jejíž  $n$ -tý zbytek je roven  $\frac{(\frac{x-1}{x+1})^{2n+2}}{1-\frac{x-1}{x+1}}$  podle faktu 26.

**Fakt 70 (Tnum logaritmu numu).** *Funkce  $\mathfrak{t}(x)$  s předpisem  $\mathfrak{t}(x)(\varepsilon) = „\text{najdi } n \text{ tak, aby platilo } \frac{(\frac{x-1}{x+1})^{2n+2}}{1-\frac{x-1}{x+1}} \leq \varepsilon \text{ a pak vrať } n\text{-tý částečný součet řady ze vztahu 98“}$ , pak  $\mathfrak{t}(x) \in \mathcal{T}^{\ln(x)}$ .*

```

1 (defun num-ln (x eps)
2   (setf eps (/ eps 2))
3   (let ((n 0) (result 0) (q (/ (1- x) (1+ x))))
4     (loop
5       until (<= (/ (expt q (* 2 (1+ n))) (- 1 q))
6                eps)
7       do (progn
8           (incf result
9              (/ (expt q (1+ (* 2 n))) (1+ (* 2 n))))
10          (incf n))
11       finally (return (* 2 result))))

```

**Lispový kód 26 (num-ln):** *Funkce pro logaritmus čísla*

Tím bychom měli přirozený logaritmus pro čísla. Podívejme se nyní, jak vypadá omezení nezávislé proměnné pro logaritmus. Po dosazení do vztahu 83 získáváme

$$\ln(x) + \varepsilon = \ln\left(x + \frac{\varepsilon}{\ln'(x+w)}\right) \quad (99)$$

a protože  $\ln(x+w) = (x+w)^{-1}$ , pak

$$\ln(x) + \varepsilon = \ln(x + \varepsilon(x+w)), \quad (100)$$

tedy násobíme přesnost hodnotou proměnné a protože přesnost nemůže být nulová, použijeme k vyčíslení  $\mathfrak{t}^x$  nenulový tnum a tím je problém vyřešen. Vezmeme totiž pesimistický odhad  $\mathfrak{t}^x(\varepsilon_\emptyset) - \varepsilon_\emptyset$  a přenásobíme jím epsilon. Díky třetí podmínce v definici 40 toto mohu udělat.

**Fakt 71 (Tnum logaritmu tnumu).** *Nechť  $\mathfrak{t}^x \in \mathcal{T}^x$ ,  $x \in \mathbb{R}$  a  $\mathfrak{t}^{\ln(q)} \in \mathcal{T}^{\ln(q)}$ ,  $q \in \mathbb{Q}$  a funkce  $\mathfrak{t}(\mathfrak{t}^x)$  má předpis*

$$\mathfrak{t}(\mathfrak{t}^x)(\varepsilon) = \mathfrak{t}^{\ln(\mathfrak{t}^x(\varepsilon(\mathfrak{t}^x(\varepsilon_\emptyset) - \varepsilon_\emptyset)))}(\varepsilon), \quad (101)$$

*pak  $\mathfrak{t}(\mathfrak{t}^x) \in \mathcal{T}^{\ln(x)}$ ,  $x \in \mathbb{R}$ .*

```

1 (defun tnum-ln (tnum)
2   (lambda (eps)
3     (multiple-value-bind (num eps0)
4       (get-nonzero-num+eps tnum eps)
5       (num-ln (tnum-to-num tnum eps) (* eps (- num eps0)))))))

```

**Lispový kód 27 (tnum-ln):** *Funkce pro logaritmus tnumu*

POZNÁMKA 72 (DOKONČENÍ SYSTÉMU). Pomocí logaritmu v kombinaci s exponenciálou lze přinést i mocninné operace a ucelím tak základní funkcionalitu knihovny `tnums`, kterou jsem si předsevzal. Mocninu udělám jako v lemmatu 46.

```

1 (defun tnum-expt (tnum1 tnum2)
2   (tnum-exp (tnum* tnum2 (tnum-ln tnum1))))

```

**Lispový kód 28 (tnum-expt):** *Funkce pro umonování tnumů*

Odmocninu pak píší podle faktu 47. Oproti mocnině jsou prohozené argumenty, ale `tnum-tou` odmocninu `tnumu` chápou tak, že odmocnitel je jako první a odmocněnec jako druhý, říká se „třetí odmocnina z osmi“.

```

1 (defun tnum-root (tnum1 tnum2)
2   (tnum-expt tnum2 (/tnum tnum1)))

```

**Lispový kód 29 (tnum-root):** *Funkce pro odmocňování tnumu* ■

Takto je tedy dokončena základní funkcionalita knihovny `tnums` a v další části se podíváme na její používání, perspektivu a doprogramujeme nějaké uživatelské funkce.

## Část III

# Rozhraní

V uživatelské části pojednám o vlastním používání knihovny `tnums`. Nejprve zkusíme převádět čísla mezi interními reprezentacemi Lispu a `tnumů`. Poté se podíváme, jak se používají matematické operace a poté spočítáme nějaké matematické funkce. Také ještě několik funkcí doprogramujeme, ale nezávisle na vnitřní implementaci `tnumů`. Nakonec se podíváme na nedostatky knihovny a její výhled jak v oblasti rozšiřování funkcionality, tak na poli zvyšování efektivity.

## 6 Uživatelské funkce

Při tvorbě knihovny pracující s `tnumy` jsem už některé funkce, které bych prohlásil za uživatelské napsal. Uživatelskou funkcí myslím takovou funkci, která nezná vnitřní implementaci `tnumů` (jako funkcí přesnosti) a volá jen funkce rozhraní zobrazené v Tabulce 4. V této kapitole některé další uživatelské funkce dopíšeme, aby bylo vidět, jak se knihovna `tnums` používá. Poté, co si projdeme proces instalace se podíváme na jednoduché převody a vyčíslování konstant, poté přidáme operace a na závěr funkce. Ukážeme, že síla knihovny spočívá v jednoduchém vytváření nových `tnumů` a ve velmi silně oddělené vnitřní implementaci od vnějšího chování.


### 6.1 Instalace

Knihovna `tnums` je k dostání na githubu na odkaze <https://github.com/slavon00/tnums> nebo pro čtenáře tištěné verze na přiloženém fyzickém disku. Je to Lispová knihovna a od uživatele předpokládá základy práce s Lispem a REPLem.

Vše, co jsme doposud naprogramovali najdeme v souboru `src/tnums.lisp` a všechny funkce, které přidáme v této kapitole pak v `src/user-functions.lisp`. Testy, které budu ukazovat jsou v souboru `src/tests.lisp`. Vše je možné jednoduše načíst jen evaluací souboru `load.lisp`, jak ukazuje Obrázek 13. Pro kompletní obsah adresáře vizte přílohu A.

Knihovna se v budoucnosti může měnit, takže tyto informace mohou zastarat. Pro zpětnou kompatibilitu ale knihovna na githubu bude vždy obsahovat soubor `README.md` nebo ekvivalentní, aby mohla instalace proběhnout bez problémů.

Obrázek 13: Načtení knihovny `tnum` do SBCL



```
ondix@ondix-Lenovo-Legion-5-15ARH05: ~/Desktop/tnums
ondix@ondix-Lenovo-Legion-5-15ARH05:~/Desktop/tnums$ sbcl
This is SBCL 2.1.1.debian, an implementation of ANSI Common Lisp.
More information about SBCL is available at <http://www.sbcl.org/>.

SBCL is free software, provided as is, with absolutely no warranty.
It is mostly in the public domain; some portions are provided under
BSD-style licenses. See the CREDITS and COPYING files in the
distribution for more information.
* (load "load.lisp")
T
* (num-to-tnum 42.123)
#<FUNCTION (LAMBDA (EPS) :IN NUM-TO-TNUM) {100206184B}>
* (tnum-to-num * 0.1)
34246/813
* (type-of *)
RATIO
* (float **)
42.123
```

Aby se nemusely ručně načítat všechny soubory, lze knihovnu `tnums` též načíst jen evaluací souboru `load.lisp`.

## 6.2 Převody a konstanty

Téměř všechny naprogramované funkce berou jako vstup `tnumy`. To jsou abstraktní struktury, které interně reprezentujeme jako funkce malých čísel. Pokud chceme vytvořit `tnum` z nějakého čísla, které již máme nějak uložené v Lispu, slouží k tomu funkce `num-to-tnum`.

```
1 * (num-to-tnum 42.123)
2 #<FUNCTION (LAMBDA (EPS) :IN NUM-TO-TNUM) 10020A056B>
```

**Lispový test 1** (`num-to-tnum`): Představení funkce pro převod *numu* na *tnum*

Pro převod opačným směrem máme inverzní funkci `tnum-to-num`, která kromě `tnumu` bere i druhý argument představující přesnost, se kterou chceme daný `tnum` vyčíslit.

```
1 * (tnum-to-num * 0.1)
2 34246/813
```

**Lispový test 2** (`tnum-to-num`): Představení funkce na převod *tnumu* na *num*

Jak vidno, `num` vrácený funkcí `tnum-to-num` je racionální číslo.

```

1 * (type-of *)
2 RATIO
3 * (float **)
4 42.123

```

**Lispový test 3** (Typ výstupu je číslo): *Ověření typu vráceného numu*

Protože knihovna vrací čísla jak je chápe Lisp, jsou výsledky vyčíslení plně kompatibilní s ostatními funkcemi pro čísla. Naprogramujme nyní funkci, která bude tnumy převádět na textové řetězce. Takto získáme dlouhé rozvoje v čitelné podobě, ne jen jako lidskému oku nic neříkající velké zlomky.

```

1 (defun tnum-to-string (tnum count)
2   (let ((num (tnum-to-num tnum (1+ count))) (output ""))
3     (when (< num 0) (setf output "-" num (- num)))
4     (multiple-value-bind (digit rem)
5       (floor num)
6       (setf output (concatenate 'string output
7                                (write-to-string digit) ".")
8                                num (* 10 rem)))
9     (dotimes (i count (concatenate 'string output "..."))
10      (multiple-value-bind (digit rem)
11        (floor num)
12        (setf output (concatenate 'string output
13                                  (write-to-string digit))
14                                  num (* 10 rem))))))

```

**Lispový kód 30** (tnum-to-string): *Funkce na převod tnumu na textový řetězec*

Funkce bere jako vstup tnum a přirozené číslo značící počet desetinných míst. Otestujeme ji na výpisu Ludolfova čísla.

```

1 * (tnum-to-string (tnum-pi) 50)
2 "3.14159265358979323846264338327950288419716939937510..."

```

**Lispový test 4** (tnum-string a tnum-pi): *Vyčíslení Ludolfova čísla na 50 desetinných míst*

Vzhledem k rozšíření množiny přípustných hodnot funkce **tnum-to-num** je možné pohodlně přepínat mezi návratovou hodnotou jako číslem a textovým řetězcem. Ukážeme si to na vyčíslení Eulerova čísla.

```

1 * (tnum-to-num (tnum-e) 20)
2 611070150698522592097/224800145555521536000
3 * (tnum-to-string (tnum-e) 20)

```

```
4 "2.71828182845904523536..."
```

**Lispový test 5** (`tnum-string` a `tnum-e`): *Vyčíslení Eulerova čísla na 20 desetinných míst a jeho vrácení jako čísla a jako stringu*

## 6.3 Operace

Operace `tnumu` je funkce  $\times_{i=0}^{n-1} \mathfrak{T} \rightarrow \mathfrak{T}$ , kde  $n \in \mathbb{N}$  nazýváme aritou. Operace `tnum+` a `tnum*` mohou mít libovolný počet argumentů, jsou tedy  $(n \in \mathbb{N})$ -ární, operace `-tnum` a `/tnum` jsou striktně unární, operace `tnum-` a `tnum/` potřebují alespoň jeden argument, jsou  $(n \in \mathbb{N}^+)$ -ární a operace `tnum-expt` a `tnum-root` jsou binární.

V lispu jsou dvě hezké funkce na inkrementaci a dekrementaci čísla. To samé nyní přidáme pro `tnumy`.

```
1 (defun tnum-1- (tnum)
2   (tnum- tnum (num-to-tnum 1)))
```

**Lispový kód 31** (`tnum-1+`): *Funkce pro inkrementaci tnumu o jedničku*

Funkce pro dekrementaci se také dá napsat pohodlně uživatelsky.

```
1 (defun tnum-1- (tnum)
2   (tnum- tnum (num-to-tnum 1)))
```

**Lispový kód 32** (`tnum-1-`): *Funkce pro dekrementaci tnumu o jedničku*

Také by šla napsat nejpoužívanější odmocnina a sice druhá.

```
1 (defun tnum-sqrt (tnum)
2   (tnum-root (num-to-tnum 2) tnum))
```

**Lispový kód 33** (`tnum-sqrt`): *Funkce pro druhou odmocninu tnumu*

Výše naprogramované použijeme k zavedení další konstanty, zlatého řezu.

**Definice 73 (Zlatý řez [37]).** *Zlatý řez představuje kladné řešení rovnice  $x^2 - x - 1 = 0$ , je tedy roven hodnotě*

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \quad (102)$$

Jedná se o další iracionální konstantu, tentokrát algebraickou, protože je řešením algebraické rovnice a její `tnum` je jen syntaktický přepis uvedené definice.

```

1 (defun tnum-phi ()
2   (tnum/ (tnum-1+ (tnum-sqrt (num-to-tnum 5))) (num-to-tnum 2)))

```

**Lispový kód 34** (tnum-phi): *Funkce vracející tnum představující zlatý řez*

A ještě test.

```

1 * (tnum-to-string (tnum-phi) 50)
2 "1.61803398874989484820458683436563811772030917980576..."

```

**Lispový test 6** (tnum-phi): *Představení funkce pro zlatý řez*

## 6.4 Funkce

Funkce tnumů jsou všechny unární. Jedná se o přirozený logaritmus, goniometrické funkce a přirozenou exponenciálu. Omezení definičního oboru jsou stejná jako jsme zvyklí, naprogramované funkce tedy nejsou o nic „slabší“.

Exponenciálu jsme využili už při psaní obecné mocniny. V podobném duchu nyní zavedeme obecný logaritmus. Vyjdeme z faktu, že lze převádět mezi různými základy.

**Fakt 74** (Obecný logaritmus jako podíl přirozených [7]). *Pro  $a > 1$  a  $x \in \mathbb{R}^+$  platí*

$$\log_a(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(a)} \quad (103)$$

Nová funkce bude brát dva argumenty a proto nejde tak úplně o funkci tnumu, jak ji v této práci chápeme, ale spíše o matematickou operaci, nicméně na eleganci zápisu to nic neubírá.

```

1 (defun tnum-log (tnum1 tnum2)
2   (tnum/ (tnum-ln tnum2) (tnum-ln tnum1)))

```

**Lispový kód 35** (tnum-log): *Funkce pro výpočet obecného logaritmu*

Uživatelská funkce potom podobně jako u odmocniny prohazuje argumenty, protože mluvíme vždy o nějakém logaritmu něčeho, například „devítkový logaritmus dvou“. Ten je i předmětem následujícího testu.

```

1 * (tnum-to-string (tnum-log (num-to-tnum 9) (num-to-tnum 2)) 50)
2 "0.31546487678572871854976355717138042714979282006594..."

```

**Lispový test 7** (tnum-log): *Výčíslení devítkového logaritmu dvou*

Goniometrické funkce jsou z velké části napsány též uživatelsky, takže by mělo být jasné, jak se s nimi z tohoto pohledu pracuje. Ukážu tedy jen vyčíslení, aby bylo vidět, že funkce opravdu fungují. Následuje výpočet sinu jedničky.



```

1 * (coerce (tnum-to-num (tnum-sin (num-to-tnum 1)) -20)
2   'long-float)
3 0.8414709848078965d0

```

### Lispový test 8 (tnum-sin): Představení funkce na výpočet sinu tnumu

Pokud má čtenář pocit, že takovéto číslo už někdy viděl, je tento pocit správný, protože přesně tímto způsobem jsem naplnil tabulku [2](#).

## 6.5 Rychlost

Tabulka [3](#) zobrazuje, jak dlouho běžně trvá vyhodnocení výrazů. Hodnoty budou vždy závislé na konkrétním stroji a jeho momentálním zatížení, obecnou představu o časové náročnosti výpočtů by ale měly poskytnout.

Tabulka 3: Doba výpočtů daných výrazů

Výraz	Doba vyhodnocení (s)
((let ((tn (tnum/ (tnum-pi) (tnum-e) (tnum-phi)))) (tnum-to-string tn 50))	-
(tnum-to-string (tnum-sin tn) 50)	1.367339
(tnum-to-string (tnum-csc tn) 50)	28.180623
(tnum-to-string (tnum-ctan tn) 50))	3600.500439
	25431.702944

Tabulka v prvním sloupci zobrazuje výrazy, které byly vyhodnocovány a ve druhém čas, který toto vyhodnocení zabralo. Doba byla měřena makrem `time` a hodnoty jsou z řádku „(...) seconds of total run time“.

## 6.6 Vnější volání

Pro přehlednost, jaké rozhraní knihovna `tnums` nabízí následuje souhrnná tabulka zobrazující všechny funkce určené k volání uživatelem.

Tabulka 4: Funkce nabízené knihovnou `tnums`

Název	Argumenty	Význam
<code>tnum-to-num</code>	<code>tnum:tnum, eps:num</code>	převod <code>tnumu</code> na číslo s přesností <code>eps</code>
<code>tnum-to-string</code>	<code>tnum:tnum, count:num</code>	převod <code>tnumu</code> na textový řetězec o <code>count</code> desetinných místech
<code>num-to-tnum</code>	<code>num:num</code>	převod <code>numu</code> na <code>tnum</code>
<code>tnum-pi</code>	$\emptyset$	Ludolfovo číslo jako <code>tnum</code>
<code>tnum-e</code>	$\emptyset$	Eulerovo číslo jako <code>tnum</code>
<code>tnum-phi</code>	$\emptyset$	Zlatý řez jako <code>tnum</code>
<code>-tnum</code>	<code>tnum:tnum</code>	$-tnum$
<code>tnum+</code>	$0+tnumů$	součet <code>tnumů</code>
<code>tnum-</code>	$1+tnumů$	rozdíl <code>tnumů</code>
<code>/tnum</code>	<code>tnum:tnum</code>	$1/tnum$
<code>tnum*</code>	$0+tnumů$	součin <code>tnumů</code>
<code>tnum/</code>	$1+tnumů$	podíl <code>tnumů</code>
<code>tnum-expt</code>	<code>arg1:tnum, arg2:tnum</code>	$arg1^{arg2}$
<code>tnum-sqrt</code>	<code>arg1:tnum, arg2:tnum</code>	$arg1^{\sqrt{arg2}}$
<code>tnum-log</code>	<code>arg1:tnum, arg2:tnum</code>	$\log_{arg1}(arg2)$
<code>tnum-1+</code>	<code>tnum:tnum</code>	$tnum + 1$
<code>tnum-1-</code>	<code>tnum:tnum</code>	$tnum - 1$
<code>tnum-exp</code>	<code>tnum:tnum</code>	přirozená mocnina <code>tnumu</code>
<code>tnum-ln</code>	<code>tnum:tnum</code>	přirozený logaritmus <code>tnumu</code>
<code>tnum-sqrt</code>	<code>tnum:tnum</code>	druhá odmocnina <code>tnumu</code>
<code>tnum-sin</code>	<code>tnum:tnum</code>	sinus <code>tnumu</code>
<code>tnum-cos</code>	<code>tnum:tnum</code>	kosinus <code>tnumu</code>
<code>tnum-tan</code>	<code>tnum:tnum</code>	tangens <code>tnumu</code>
<code>tnum-csc</code>	<code>tnum:tnum</code>	kotangens <code>tnumu</code>
<code>tnum-sec</code>	<code>tnum:tnum</code>	sekans <code>tnumu</code>
<code>tnum-ctan</code>	<code>tnum:tnum</code>	kosekans <code>tnumu</code>

Tabulka v prvním sloupci zobrazuje funkční symbol, v posledním význam funkce aplikované na argumenty z prostředního sloupce. Čtyři části rozdělené horizontálními čarami jsou po řadě funkce pro převody, konstanty, operace a matematické funkce. Součástí jsou i uživatelské funkce.

## 7 Diskuze

V poslední kapitole probereme možné budoucí směřování knihovny `tnums` a její nedostatky. Krátce se zastavíme u optimalizace implementace, kde popíšu dva hlavní směry, kterým bychom se při optimalizaci mohli vydat. Nakonec se ohlédneme na proces vzniku knihovny.

### 7.1 Optimalizace

Namísto rozšiřování funkčnosti – což jsme vesměs dělali až doteď – se nyní podívejme, jak by se dala zrychlit práce knihovny. Mimo triviálního „koupit lepší stroj“ mě napadají dva směry, kudy by se optimalizace mohla ubírat. Jak jsme totiž viděli v tabulce 3, vyčíslení `tnumu` nemusí být dílem okamžiku, ale může trvat i velmi dlouho. První je využití paralelizace, druhý vložení databáze.

#### 7.1.1 Paralelizace

Dosud napsaný kód je sekvenční. Při vyčíslování `tnumu` se postupně rozkrývá jeho struktura a hloubkově se prochází. Důležité je to slovo *postupně*. Když vyčíslujeme `tnum-pi`, po vypočtení prvního členu se jde na další, ten se přičte a takto se to opakuje až po ukončení cyklu. Rychlejší by ale bylo, kdyby jeden proces byl zodpovědný pouze za sčítání řady a jednotlivé členy sčítané posloupnosti delegoval na výpočet ostatním procesům, aby celý výpočet nemusel běžet jen v jednom procesu, na jednom jádře.

Dalším vhodným místem použití paralelizace je funkce `tnum+`. Ta sčítá namapovaný seznam `tnumů`. Mapování je postupné aplikování funkce jedné proměnné na prvky seznamu a tvorba seznamu nového. Jde tedy o proces, kde jednotlivé výsledky mohou přijít v různých časech a hlavní vlákno by se staralo jen o vytvoření výsledného seznamu a výpočet jednotlivých členů by mohl běžet pro každý člen zvlášť, ve vlastním procesu.

Další vhodným místem je funkce `create-list-for-multiplication`, která také vrací seznam. Jde o seznam čísel, která byla nezávisle na ostatních vypočtena funkcí `tnum-to-num`. Tyto výpočty mohou opět vykonávat paralelní procesy a je to vhodné místo pro nasazení paralelizace.

U funkcí platí to samé jako u  $\pi$  a sice, že jednotlivé členy se mohou počítat zvlášť a až poté sčítat. Kvůli komutativitě sčítání mohou dokonce přijít v různé časy a pokud budou všechny, bude výsledek v pořádku.

#### 7.1.2 Databáze

Druhým podstatným vylepšením by bylo vytvoření nástroje pro přístup k již vypočteným výsledkům. Moje představa je taková, že když uživatel zadá příkaz k vypočtení nějakého `tnumu`, systém se podívá, zda už nemá záznam, že by někdo takovýto `tnum` s takovouto přesností počítal. Pokud ano, vrátí tento výsledek.

Pokud ne, podívá se na nejbližší výsledek s menší přesností a do očekávané přesnosti jej dopočte.

Nemá smysl, aby se vždy vracel ten nejlepší výsledek. Pokud se v databázi žádný výsledek pro daný tnum nenajde, je vše vypočítáno načisto. Po ukončení výpočtu se do databáze přidá nový záznam, aby ostatní uživatelé mohli využívat vypočtených výsledků. Takhle by časem vznikla databáze s výsledky a namísto optimalizace přímo v kódu bychom se jen zeptali na již někdy vypočtený výsledek. Pokud v knihovně `tnums` není chyba, měl by mít tento výsledek věčnou platnost.

Otázek s tímto zlepšením je několik:

- Jak ukládat tnumy?
- Jak navazovat na výpočet, pokud záznam uložený jako výsledek není přesně ten, který hledáme?
- Jak zabránit, aby nám někdo nahrával chybné výsledky?
- Je morální užívat výsledků, za které zaplatil strojovým časem někdo jiný?

Struktura tnumu je abstraktní a není jen tak uložitelná. Kvůli této nadstavbě by se musela změnit reprezentace tnumů a byly by to třeba textové řetězce představující  $\lambda$  funkce. Zní to sice trochu bizarně, ale mohlo by to vést k cíli. Také je zde velký prostor pro ušetření výpočtů. Například pokud již bude v databázi záznam čísla, jehož chceme opačné číslo, může se vrátit opačný výsledek.

Také může přijít příklad, kdy ve struktuře bude přičítána nula nebo bude násobeno jedničkou. Bez těchto operací je však tnum stejný jako původní a není tedy důvod vést různé záznamy pro stejné tnumy, ačkoli mají jinou strukturu. Vynořuje se zde princip, který jsem již popsal v první kapitole. Tedy, že číslo je dáno svým obsahem, nikoli symbolem. Symboly  $2.999\dots$  a  $3$  jsou jiné, ale čísla, která představují jsou stejná. To samé platí pro tnumy  $t^x$  a  $t^{x+1}$ , podobně pro  $x$  a  $(\text{tnum} + x \text{ (num-to-tnum 0)})$ . Pokud totiž  $1 + 1 = 2$ , pak i  $\mathcal{T}^{1+1} = \mathcal{T}^2$ , neboli ekvivalence čísel se přenáší i na jejich tnumy, ikdyž tnumy nejsou stejné.

Další ekvivalence tnumů už může být mnohem skrytější. Číslo  $x^3$  lze napsat jako  $x * x * x$ . Číslo  $x * 3$  lze napsat jako  $x + x + x$ . To už nejsou tak triviální vztahy a přitom jejich souvislost může vést k mnohem rychlejšímu výpočtu. A že platí rovnost  $4 * \sum_{i \in \mathbb{N}} \frac{(-1)^i}{2i+1} = \pi = \sum_{i \in \mathbb{N}} \frac{1}{16^i} \left( \frac{4}{8i+1} - \frac{2}{8i+4} - \frac{1}{8i+5} - \frac{1}{8i+6} \right)$ ? To už je velmi složité.

## 7.2 Peripetie

V této podkapitole bych rád popsal hlavní překážky, které se během programování knihovny vyjevily a krátce okomentoval možné chyby a nedostatky.

### 7.2.1 Ideové

Celkem jednoduchá otázka, ale asi nejhlubší se týkala samotné reprezentace tnumů. Jak je patrné, nakonec jsou tnumy vytvořeny jako funkce přesnosti a to velmi dobře koresponduje s jejich posláním. Tento nápad ale nepřišel jako první a vpravdě k němu vedla dlouhá cesta. Je to v pořadí třetí reprezentace tnumů. První byla reprezentace pomocí řad a druhá pomocí posloupností.

Nápad využít řady byl jako první z jednoduchého důvodu. Bylo to nejjednodušší. Když jsem se začal zabývat návrhem tnumů, bylo jasné, že musím umět vyčíslovat Ludolfovo číslo. Leibnitzův vzorec je vyjádřen ve formě řady. Také funkce čísel jsou řady – buď Taylorovy nebo Fourierovy. Eulerovo číslo nabízí vyjádření řadou i posloupností, vše ale do sebe zapadalo a bylo přímočaré vzít existující vzorce a jen je přetavit do kódu. Takhle vznikla verze knihovny, která při vyčíslování tnumu vracela částečné součty. Při vnořování řad do řad se ale mnohé výpočty prováděly vícekrát a působilo to těžkopádně. Další problém přišel, když jsem se snažil dokázat korektnost. To bylo v době, kdy v podstatě celá knihovna byla naprogramována. Nebyl jsem schopen najít jasné souvislosti mezi přesností a počty sčítaných členů. Celková neohrabanost narůstala s každou novou funkcí. Při hledání optimalizace výpočtů funkcí a převrácených hodnot jsem si uvědomil, že lepší než používat řady bude rychlejší přejít na posloupnosti.

Posloupnosti byly výhodné například na poli rychlosti operací. Tam, kde se u řad sčítaly dlouhé posloupnosti nul, posloupnosti rovnou vracely správné výsledky v konstantní rychlosti. Stále ale byl problém s korektností převodu přesnosti na přirozené číslo, aby se mohl zavolat příslušný člen. To tedy vedlo na nápad použít přesnost jako niternou součást tnumů a vyjadřovat je jako funkce právě přesnosti.

Idea byla, že oproti posloupnostem by se neměla snížit rychlost, ale velmi zstručnit kód a celkový návrh zjednodušit. Místo přepočítávání počtu členů, případně pořadí členu na přesnost se teď děje obráceně. Využívají se k tomu jen dva mechanismy a sice Taylorův zbytek a zbytek geometrické řady. Po předchozích změnách interpretace jsem před samotným programováním a poté dokazováním začal postupovat opačně a velmi se to nakonec otisklo do vyznění této práce. Než opět zahazovat velké části kódu nejprve na papír zkusím, jestli nepůjde o slepou uličku. Takto vznikla i notace množiny tnumů  $x$  jako  $\mathcal{T}^x$ . V původní představě to ale mělo být  $\mathcal{T}(x)$ , ale pak se začaly množit závorky při volání s argumenty a musel jsem v zájmu čitelnosti přejít na notaci s horním indexem. Poté, co přišly problémy s jednoznačností tnumů, vznikl ještě zápis konkrétního tnumu jako  $t^x$ .

Příští implementace možná bude muset zohledňovat zaměření knihovny na uložitelnost do databáze výsledků, jak bylo konstatováno výše.

### 7.2.2 Matematické

Celkově práce vyznívá velmi matematicky. Tvrdí, že informatický problém jako je efektivní uložení a manipulace s teoreticky nekonečnými čísly není tak o inženýrském přístupu kódování paměti, ale o výsledcích základního kurzu matematické

analýzy.

Vše je psáno s důrazem na čitelnost a preciznost. To znamená, že u velkého množství použité matematiky je důkaz nebo se jedná o fakt – v tomto případě je buď na úrovni středoškolských znalostí nebo je u něj odkaz do literatury.

Dále jsem řešil praktické nalezení řad funkcí a jejich důkazy. Dobře se chovají exponenciála, kosinus a sinus. U ostatních řad jsem řešil, že jejich konvergence je omezena pouze na nějaký interval. Když se počítá normálně s čísly, není toto takový problém a střed řady se posune k hodnotě hledaného obrazu. Protože ale `tnums` nejsou čísla a jejich vyčíslování probíhá líně, není možné před výpočtem upravit střed řady. Konvergence by se musela kontrolovat během vyčíslování a interaktivně měnit střed a to celé hloubkově. Naštěstí jsem našel řadu pro logaritmus, která konverguje pro všechna kladná čísla a goniometrické funkce jsem pak přepsal podle středoškolských vzorečků pomocí již existujících. Mimochodem řady dalších goniometrických funkcí jsou nesmírně zajímavé a používají posloupnosti jako Bernoulliho nebo Eulerova čísla.

### 7.2.3 Implementační

Implementace je relativně jednoduchá v tom smyslu, že velmi přesně kopíruje matematický jazyk, a tak není moc prostoru pro chyby. Také kód vypadá – až na výjimku v podobě funkce `create-list-for-multiplication` – velmi spořádaně a v základní verzi (po začátek poslední části) ho tvoří jen 174 řádků. To je také důvod, proč jsem si dovilil celý zdrojový kód vpravit i do této práce, ačkoli mi to zpočátku přišlo jako moc násilné. Nakonec mi ale nepříjde, že by kódy překážely a působily jako výplň, nýbrž podtrhují použitelnost odvozené matematiky a díky tomu přibližují abstraktní svět matematiky čísel aplikovanějšímu čtenáři v osobě informatika.

### 7.2.4 Mezery

Při psaní knihovny `tnums` i tohoto textu bylo mým cílem přinést produkt co nejvíce neprůstřelný a pokud se někde vyskytuje mezera, aby byla přesně lokalizovatelná.

**7.2.4.1 Matematické** Uvědomuji si, že můj jazyk a především zápis jsou na některých místech chaotické. Snad ale na druhé přečtení plně pochopíte nosnou myšlenku veškeré matematiky a proč byla přijímána.

Mimo kostrbatého vyjádření o žádných chybách nevím a pokud tam nějaké jsou, jsou nevědomé. Ikdyž jsem se snažil vše psát co nejvíce precizně, samozřejmě se mi tam něco mohlo vloudit a takováto chyba mě mrzí. Mým cílem jistě není nějaké chyby zamlčovat. Naopak budu rád, pokud čtenář nalezne chybu nebo lépe i její řešení a kontaktuje mě na [ondrej.slavik01@upol.cz](mailto:ondrej.slavik01@upol.cz).

**7.2.4.2 Implementační** Ohledně kódu celkem věřím, že je napsán dobře. Důkazem může být i že jsem se ho nebál otisknout do této práce a nepřidávám

pouze odkaz na repozitář. Jeho vysoká stručnost a čitelnost je vykoupena spoustou práce na matematickém pozadí. V kódu by doufám žádná chyba právě pro jeho stručnost neměla být. Pokud se tak ale stalo, beru to jako menší chybu, než kdybych ji měl v matematice.

Pokud je chyba v implementaci, i když matematicky to bylo správně, pak je to hloupá chyba, protože kód je velmi podobný odvozeným tvrzením, v podstatě se jedná jen o syntaktický převod. Tam, kde to bylo důležité a byl na to prostor jsem si dovilil nějaké optimalizace, takže tam se kód od matematiky odchýlil, ale všechny funkce jsou pouze na několik řádků, a tak doufám, že jsem tam žádné chyby neudělal. I tak se samozřejmě mohlo stát.

**7.2.4.3 Funkcionalita** Co se týče funkčnosti, je velmi základní. V dalších verzích by měly přibýt cyklometrické funkce a některé konstanty. Možná ještě funkce více proměnných a tetrace. V tuto chvíli mi ale funkčnost přijde dostačující.

**7.2.4.4 Rychlost** Co se týče rychlosti, v minulé podkapitole jsem navrhl nějaké směry, kudy by se mohla ubírat optimalizace. Přímo v existujícím kódu bez přidání paralelizace nebo databáze myslím nelze o mnoho rychlost výpočtů zlepšit. Systém jsem navrhl tak, aby byl syntakticky jednoduchý a přitom plně funkční. Možná nějaké dílčí zapamatovávání proměnných by ho mohlo zrychlit, ale bez fundamentálního přepracování jeho plynulost příliš nezlepší. Knihovna je tedy relativně pomalá, ale její poslání je přesnost a nikoli rychlost.

## 7.3

### 7.3.1 Kontext knihovny

Knihovna `tnums` je unikátní ve své kompatibilitě se svým jazykem. Sice vytváří abstraktní struktury, výsledkem vyčíslení je ale vždy číslo. Narozdíl od ostatních představených knihoven tedy může zajišťovat přesné výpočty v části systému kritické na přesnost a s těmito výsledky lze přímo pracovat a nemusí se kopírovat nebo převádět na zlomky. Knihovna toho neumí tolik jako třeba `mpmath`, naopak umí více než `computable reals`. Při pohledu zvenějšku bere čísla a tři konstanty a vrací opět čísla. Uživatel je tedy odstíněn od implementace a v této bariéře je velká síla. Ostatní knihovny, které vracejí vlastní typy pak na mě působí, že jsou samy pro sebe a dají se použít jen jako kalkulačky.

### 7.3.2 Kontext práce

Když jsem pročítal bakalářské práce absolventů, přišla mi škoda, že si nemohu prohlédnout jejich kódy. Protože se odevzdávají na CD a do STAGu se nenahrávají. Pro čtenáře jsem tedy přidal odkaz (<https://github.com/slavon00/tnums>), na kterém je aktuální verze knihovny k dostání.

### 7.3.3 Adakvátnost

Nyní v rychlosti zopakuji 6 podmínek, které jsem stanovil, že musí abstraktní struktury splňovat a připomenu, že je tnumy dodržují.

- Vyčíslování tnumů zajišťuje funkce `tnum-to-num`,
- přesnost zajišťuje samotná podstata tnumů jako funkcí přesnosti,
- matematické operace tnumy podporují,
- matematické funkce tnumy podporují,
- tnumy se dají vracet jako výsledky funkcí,
- tnumy se dají použít jako argumenty funkcí.

Tnumy tak splňují podmínky na abstraktní datové struktury. Tnumy jsou adekvátní pro realizaci přesných výpočtů s reálnými čísly.



## Závěr

Popsal jsem, jak jsou vytvořena přirozená čísla pomocí teorie množin, také jak na tomto základě vznikají další číselné obory. Dále jsem popsál, jak se s **číslly** pracuje v paměti v počítače.

Také bylo zmíněno, že číselná osa je tvořena **reálnými čísly** a pokud použijeme více os, dostáváme strukturovaná čísla. Zamysleli jsme se, jestli jsou všechna reálná čísla rekursivní a bohužel jsme dostali negativní odpověď.

Představil jsem, jak vypadají **výpočty s reálnými čísly**. Kromě matematických operací to byly matematické funkce. Zjistili jsme, že všechny tyto výpočty, včetně samotných reálných konstant lze reprezentovat jako funkce.

V textu jsme se věnovali i produktu celého tohoto snažení a sice programování Lispovské knihovny **tnums** implementující **přesné výpočty s reálnými čísly**. Také jsem přinesl několik příkladů, jak uživatelsky funkcionalitu rozšiřovat.

## Conclusions

I have described how natural numbers are created using set theory, as well as on this basis, other numerical fields are created. I also described how to deal with **numbers** in memory of a computer.

It was also mentioned that the numerical axis is made up of **real numbers** and if we use more axes, we get structured numbers. We wondered if all real numbers are computable and unfortunately we got a negative answer.

I introduced what **real numbers' computation** looks like. In addition to mathematical operations there were mathematical functions. We found that all these calculations, including the real constants themselves, can be represented as functions.

In the text, we also focused on the product of all this effort, namely programming Lisp **tnums** library implementing **precise real numbers' computation**.

I also brought some examples of how user can extend functionality.

## Seznam literatury

1. PŘISPĚVATELÉ WIKIPEDIE. *Číslo* [online]. Wikipedie: Otevřená encyklopedie, 2021 [cit. 2021-02-21]. Dostupné z: <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%5C%C4%5C%8C%5C%C3%5C%ADslo&oldid=19341576>.
2. CARROLL, Lewis. *Alenka v kraji divů a za zrcadlem*. 1. vyd. Praha: Městská knihovna v Praze, 2018. ISBN 978-80-7602-231-7.
3. ROJAS, Raul. *A Tutorial Introduction to the Lambda Calculus* [online]. Berlin: Freie Universität, 2015 [cit. 2021-04-27]. Dostupné z: [http://www.inf.fu-berlin.de/inst/ag-ki/rojas\\_home/documents/tutorials/lambda.pdf](http://www.inf.fu-berlin.de/inst/ag-ki/rojas_home/documents/tutorials/lambda.pdf).
4. BALCAR, Bohuslav; ŠTĚPÁNEK, Petr. *Teorie množin*. 2., opravené a rozšířené. Praha: Academia, nakladatelství AV ČR, 2001. ISBN 80-200-0470-X.
5. SLOANE, Neil James Alexander. *A001057: Canonical enumeration of integers: interleaved positive and negative integers with zero prepended* [online] [cit. 2021-04-27]. Dostupné z: <https://oeis.org/A001057>.
6. SPIVAK, Michael. 3. vyd. Houston: Publish or Perish, 2006. ISBN 9780521867443.
7. MIKULČÁK, Jiří; CHARVÁT, Jura; MACHÁČEK, Martin; ZEMÁNEK, František. *Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy*. 1. vyd. Havlíčkův brod: Prometheus, 2012. ISBN 9788071962649.
8. HALAŠ, Radomír. *Teorie čísel*. 2., upravené. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. ISBN 978-80-244-4068-2.
9. PŘISPĚVATELÉ WIKIPEDIE. *Computable number* [online]. Wikipedie: Otevřená encyklopedie, 2020 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: [https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Computable\\_number&oldid=997421913](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Computable_number&oldid=997421913).
10. BAEZ, John C. *Division Algebras and Quantum Theory* [online]. 2011 [cit. 2021-04-27]. Dostupné z: <https://arxiv.org/pdf/1101.5690.pdf>.
11. RUBSTOV, Constantin A.; ROMERIO, Giovanni F. *Ackerman's Function and New Arithmetical Operations* [online]. 2004 [cit. 2021-04-27]. Dostupné z: [http://www.rotarysaluzzo.it/Z\\_Vecchio\\_Sito/filePDF/Iperoperazioni%5C%20\(1\).pdf](http://www.rotarysaluzzo.it/Z_Vecchio_Sito/filePDF/Iperoperazioni%5C%20(1).pdf).
12. PELANTOVÁ, Edita; VONDRÁČKOVÁ, Jana. *Matematická analýza I*. Praha: České vysoké učení technické, 2004. Dostupné také z: <http://km.fjfi.cvut.cz/ma/data/uploads/skripta-matematika-analyza-1.pdf>.
13. HORT, Daniel; RACHŮNEK, Jiří. *Algebra 1*. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003.
14. DOŠLÁ, Zuzana; KUBEN, Jaromír. *Diferenciální počet funkcí jedné proměnné*. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. ISBN 80-210-3121-2.

15. DOŠLÁ, Zuzana; NOVÁK, Vítězslav. *Nekonečné řady*. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. ISBN 80-210-1949-2.
16. KEPRT, Aleš. *Operační systémy*. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. Dostupné také z: <https://phoenix.inf.upol.cz/esf/ucebni/OpSys.pdf>.
17. KNUTH, Donald Ervin. *Umění programování. 2. díl: Seminumerické algoritmy*. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2898-5.
18. PŘÍSPĚVATELÉ WIKIPEDIE. *Single-precision floating-point format* [online]. Wikipedie: Otevřená encyklopedie, 2021 [cit. 2021-02-20]. Dostupné z: [https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Single-precision\\_floating-point\\_format&oldid=1005180810](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Single-precision_floating-point_format&oldid=1005180810).
19. STANNERED. *Binary representation of a 32-bit floating-point number* [online]. Wikimedia Commons, 2008 [cit. 2021-03-29]. Dostupné z: [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Float\\_example.svg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Float_example.svg). Dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0.
20. PŘÍSPĚVATELÉ WIKIPEDIE. *Long double* [online]. Wikipedie: Otevřená encyklopedie, 2021 [cit. 2021-03-18]. Dostupné z: [https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Long\\_double&oldid=1003717804](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Long_double&oldid=1003717804).
21. JOHANSSON, Fredrik a kol. *mpmath: a Python library for arbitrary-precision floating-point arithmetic* [online]. 2013 [cit. 2021-03-29]. Dostupné z: <http://mpmath.org>.
22. DAUTELLE, Jean-Marie. *jscience: Tools & Libraries for the Advancement of Sciences* [online]. GitHub.io, 2017 [cit. 2021-03-29]. Dostupné z: <https://github.com/javolution/jscience>.
23. GRANLUND, Torbjörn a kol. *GNU MP: The GNU Multiple Precision Arithmetic Library* [online]. 2020 [cit. 2021-03-29]. Dostupné z: <https://gmplib.org/gmp-man-6.2.1.pdf>.
24. *GNU MPFR: The Multiple Precision Floating-Point Reliable Library* [online]. 2020 [cit. 2021-03-29]. Dostupné z: <https://www.mpfr.org/mpfr-current/mpfr.pdf>.
25. GRANLUND, Torbjörn; HART, William; GLADMAN, Brian a kol. *MPFR: The Multiple Precision Integers and Rationals Library* [online]. 2017 [cit. 2021-03-29]. Dostupné z: <http://mpir.org/mpir-3.0.0.pdf>.
26. HAIBLE, Bruno; KRECKEL, Richard B. *CLN: a Class Library for Numbers* [online]. 2019 [cit. 2021-03-29]. Dostupné z: <https://www.ginac.de/CLN/cln.pdf>.
27. STOLL, Michael. *computable-reals: Arbitrary precision, automatic re-computing real numbers in Common Lisp* [online]. GitHub.io, 2021 [cit. 2021-03-29]. Dostupné z: <https://github.com/stylewarning/computable-reals>.

28. THE COMMON LISP COOKBOOK PROJECT. *The Common Lisp Cookbook: Numbers* [online]. GitHub.io, 2020 [cit. 2021-03-29]. Dostupné z: <https://lispcookbook.github.io/cl-cookbook/numbers.html>.
29. SEIBEL, Peter. *Practical Common Lisp*. 1. vyd. New York: Apress, 2005. ISBN 1590592395.
30. RICHESON, David. *Circular Reasoning: Who First Proved That  $C/d$  Is a Constant?* [Online]. Dickinson College, 2010 [cit. 2021-04-27]. Dostupné z: <https://arxiv.org/pdf/1303.0904.pdf>.
31. JANSSON, Madeleine. *Approximation of  $\pi$*  [online]. Lund University, 2019 [cit. 2021-04-27]. Dostupné z: <https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordId=8983341&fileId=8983342>.
32. BAILEY, David; BORWEIN, Peter; PLOUFFE, Simon. *On the Rapid Computation of Various Polylogarithmic Constants* [online]. 1997 [cit. 2021-04-27]. Dostupné z: <https://www.ams.org/journals/mcom/1997-66-218/S0025-5718-97-00856-9/S0025-5718-97-00856-9.pdf>.
33. RICE, Henry Gordon. Recursive Real Numbers. *Proceedings of the American Mathematical Society* [online]. 1954, roč. 5, č. 5, s. 784–791 [cit. 2021-07-22]. Dostupné z: <https://www.ams.org/journals/proc/1954-005-05/S0002-9939-1954-0063328-5/home.html>.
34. HABALA, Petr. *Taylorův polynom* [online]. Praha: České vysoké učení technické [cit. 2021-03-29]. Dostupné z: <https://math.fel.cvut.cz/mt/txtc/4/txc3ca4e.htm>.
35. APOSTOL, Tom M. *Calculus: Volume I*. 2. vyd. USA: John Wiley & Sons, 1967. ISBN 0-471-00005-1.
36. ABRAMOWITZ, Milton; STEGUN, Irene A. *Handbook of Mathematical Functions: With Formulas, Graphs and Mathematical Tables* [online]. 10, with corrections. Washington: U.S. Government Printing Office, 1964 [cit. 2021-04-28]. Dostupné z: [http://www.math.ubc.ca/~cbm/aands/abramowitz\\_and\\_stegun.pdf](http://www.math.ubc.ca/~cbm/aands/abramowitz_and_stegun.pdf).
37. SPIRA, Michel. *On the Golden Ratio* [online]. Universidade Federal de Minas Gerais [cit. 2021-04-27]. Dostupné z: [https://www.mathunion.org/fileadmin/ICMI/Conferences/ICME/ICME12/www.icme12.org/upload/submission/1948\\_F.pdf](https://www.mathunion.org/fileadmin/ICMI/Conferences/ICME/ICME12/www.icme12.org/upload/submission/1948_F.pdf).

## A Obsah přiloženého CD/DVD

Na samotném konci textu práce je uveden stručný popis obsahu přiloženého CD/DVD, tj. jeho závazné adresářové struktury, důležitých souborů apod.

### **doc/**

Adresář se soubory

- **OndrejSlavikBP.pdf** – tento text ve formátu PDF a
- **bak/** – adresář se všemi soubory pro vysázení tohoto textu, stačí dvakrát přeložit **PDFLaTeXem**.

### **load.lisp**

Přeložením tohoto souboru ve vašem oblíbeném interpretu/kompilátoru Lispu získáte plnou funkcionalitu knihovny **tnums**, kterou jsme právě doprogramovali. Načítá soubory **src/tnums.lisp** a **src/user-functions.lisp**.

### **src/**

Adresář se soubory

- **tnums.lisp** – základ knihovny z části 2 této práce,
- **user-function.lisp** – rozšíření knihovny o vědomě uživatelské funkce ze šesté kapitoly a
- **tests.lisp** – zakomentované výrazy, které zde byly popsány jako Lispový test i s výsledky, na které se vyhodnotí.

### **README.md**

Soubor představující knihovnu **tnums** a obsahující i několik příkladů výpočtů, které podporuje. Součástí je i kapitola o načtení knihovny evaluací souboru **load.lisp**, nejedná se tedy o instalaci v pravém slova smyslu.

### **install/**

Adresář se soubory

- **sbcl-2.1.6-source.tar.bz2** – instalátor SBCL, konzolového kompilátoru ANSI Common Lispu,
- **code-1.57.1-1623937013-amd64.deb** – instalátor VS code, rozšířitelného textového editoru a
- **2gua.rainbow-brackets-0.0.6.vsix** – instalátor rozšíření Rainbow Brackets pro přehledné obarvování závorek.

### **LISENCE**

Licenší soubor – knihovna je publikována pod GNU GPLv3.