

Gruppe
1

Velislav Slavov, 2385786

Σ8

ucsmm@student.kit.edu

A2

$$a) \varphi_1: \mathbb{Q}^2 \rightarrow \mathbb{Q}(\sqrt{2})$$
$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \mapsto \sqrt{2}a + \frac{b}{\sqrt{2}}$$

6

(i) Seien $q_1 := \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \end{pmatrix}, q_2 := \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{Q}^2$

$$\varphi_1(q_1 + q_2) = \varphi_1\left(\begin{pmatrix} a_1 + a_2 \\ b_1 + b_2 \end{pmatrix}\right) = \sqrt{2}(a_1 + a_2) + (b_1 + b_2) \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Distr. Ges.

$$= (\sqrt{2}a_1 + \sqrt{2}a_2) + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}b_1 + \frac{1}{\sqrt{2}}b_2\right)$$

Komm. Ges.

$$= \left(\sqrt{2}a_1 + \frac{1}{\sqrt{2}}b_1\right) + \left(\sqrt{2}a_2 + \frac{1}{\sqrt{2}}b_2\right)$$

$$= \varphi_1\left(\begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \end{pmatrix}\right) + \varphi_1\left(\begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \end{pmatrix}\right) \quad \checkmark$$

(ii) Seien $q := \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \in \mathbb{Q}^2, \lambda \in \mathbb{Q}$

$$\lambda q = \begin{pmatrix} \lambda a \\ \lambda b \end{pmatrix}$$

$$\varphi_1(\lambda q) = \sqrt{2}(\lambda a) + \frac{1}{\sqrt{2}}(\lambda b)$$

Assoz. Ges.

$$= \lambda(\sqrt{2}a) + \lambda\left(\frac{1}{\sqrt{2}}b\right)$$

Distr. Ges.

$$= \lambda\left(\sqrt{2}a + \frac{1}{\sqrt{2}}b\right)$$

$$= \lambda(\varphi_1\left(\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}\right)) = \lambda \cdot \varphi_1(q) \quad \checkmark$$

φ_1 erfüllt beide Bedingungen einer linearen Abbildung. ✓

$$\ker(\varphi_1) := \{q \in \mathbb{Q}^2 \mid \varphi_1(q) = 0\}$$

$$\varphi_1\left(\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}\right) = 0 \Leftrightarrow \sqrt{2}a + \frac{b}{\sqrt{2}} = 0 \quad | \cdot \sqrt{2}$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{2}\left(\sqrt{2}a + \frac{b}{\sqrt{2}}\right) = \sqrt{2} \cdot 0$$

$$\Leftrightarrow 2a + b = 0$$

$$\Rightarrow \ker(\varphi_1) := \left\{ \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \in \mathbb{Q}^2 \mid b = -2a \right\} \quad \checkmark$$

$$\text{Sei } B := \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix} \right\} \quad \text{Ein Basis ist dann z.B. } \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}$$

4/5

$$(i) \quad \forall q \in \ker(\varphi_1): q = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ -2a \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + a \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow q \in \text{Lin}(B)$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \notin \ker \varphi_1, \text{ denn } \varphi_1\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \sqrt{2} \neq 0$$

$$(ii) \quad \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} \lambda \\ -2\beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \lambda = 0 \wedge -2\beta = 0$$

$$\Leftrightarrow \lambda = 0 \wedge \beta = 0$$

$$\Rightarrow B \text{ ist linear unabhängig über } \ker(\varphi_1)$$

$$\text{Aus (i) und (ii)} \Rightarrow B \text{ ist Basis von } \ker(\varphi_1)$$

$$b) \varphi_2 := \mathbb{F}_5^3 \longrightarrow \mathbb{F}_5^3$$

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} a+2b+2c \\ 2a+3b+c \\ a+c \end{pmatrix}$$

$$\text{Seien } f_1 := \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{pmatrix}, f_2 := \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \\ c_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_5^3$$

$$(i) \varphi_2(f_1 + f_2) = \varphi_2 \begin{pmatrix} a_1 + a_2 \\ b_1 + b_2 \\ c_1 + c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (a_1 + a_2) + 2(b_1 + b_2) + 2(c_1 + c_2) \\ 2(a_1 + a_2) + 3(b_1 + b_2) + (c_1 + c_2) \\ (a_1 + a_2) + (c_1 + c_2) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} (a_1 + 2b_1 + 2c_1) + (a_2 + 2b_2 + 2c_2) \\ (2a_1 + 3b_1 + c_1) + (2a_2 + 3b_2 + c_2) \\ (a_1 + c_1) + (a_2 + c_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (a_1 + 2b_1 + 2c_1) \\ (2a_1 + 3b_1 + c_1) \\ (a_1 + c_1) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} (a_2 + 2b_2 + 2c_2) \\ (2a_2 + 3b_2 + c_2) \\ (a_2 + c_2) \end{pmatrix}$$

$$= \varphi_2(f_1) + \varphi_2(f_2) \quad \blacksquare \quad \checkmark$$

$$(ii) \text{ Seien } f \in \mathbb{F}_5^3, \lambda \in \mathbb{F}_5$$

$$\varphi_2(\lambda f) = \varphi_2 \begin{pmatrix} \lambda a \\ \lambda b \\ \lambda c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda a + 2\lambda b + 2\lambda c \\ 2\lambda a + 3\lambda b + \lambda c \\ \lambda a + \lambda c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda(a + 2b + 2c) \\ \lambda(2a + 3b + c) \\ \lambda(a + c) \end{pmatrix}$$

$$= \lambda \begin{pmatrix} a + 2b + 2c \\ 2a + 3b + c \\ a + c \end{pmatrix} = \lambda \varphi_2(f) \quad \blacksquare$$

Aus (i) und (ii) $\Rightarrow \varphi_2$ ist linear \checkmark

ok, wofür? Du solltest doch den Kern bestimmen!

Behauptung: φ_2 ist NICHT injektiv

$$\Rightarrow \exists f_1 := \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{pmatrix}, f_2 := \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \\ c_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_5^3 \text{ mit } a_1 \neq a_2, b_1 = b_2, c_1 = c_2$$

$$\text{und es gilt: } \varphi_2(f_1) = \varphi_2(f_2)$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} a_1 + 2b_1 + 2c_1 \\ 2a_1 + 3b_1 + c_1 \\ a_1 + c_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_2 + 2b_2 + 2c_2 \\ 2a_2 + 3b_2 + c_2 \\ a_2 + c_2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow a_1 + 2b_1 + 2c_1 = a_2 + 2b_2 + 2c_2$$

Def von f_1, f_2

$$\Rightarrow a_1 = a_2 \quad \nLeftarrow \text{Somit ist } \varphi_2 \text{ injektiv}$$

$$\Rightarrow \ker(\varphi_2) := \left\{ \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_5^3 \mid \begin{pmatrix} a + 2b + 2c \\ 2a + 3b + c \\ a + c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\text{Sei } B := \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$$

$$(i) \forall f \in \ker(\varphi_2) : f = 0 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow f \in \mathcal{LH}(B) \Rightarrow \mathcal{LH}(B) = \ker(\varphi_2) \quad \left\{ \varphi_2 \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right.$$

$$(ii) \text{ Seien } \lambda, \beta, \rho \in \mathbb{F}_5$$

$$\lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \rho \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} \lambda \\ 2\beta \\ 3\rho \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \lambda = 0, \beta = 0, \rho = 0$$

$$\Rightarrow B \text{ ist lin. unabhängig} \quad \checkmark$$

2/5

Aus (i) und (ii) $\Rightarrow B$ ist Basis von $\ker(\varphi_2)$ ■

A4 $(V, +, \cdot) := n$ -dimensionaler \mathbb{C} -Vektorraum

2

a) $(V, +, \cdot|_{\mathbb{R} \times V})$

$$\forall z \in \mathbb{C} : z := a + ib \text{ mit } a, b \in \mathbb{R}$$

$$\forall x \in \mathbb{R} : x := a + 0i \in \mathbb{C} = a$$

Seien $\lambda, \mu \in \mathbb{R}, x_1 := a_1 + 0i, x_2 := a_2 + 0i \in \mathbb{C}$

$$\begin{aligned} \text{(ii)} \quad \lambda(x_1 + x_2) &= \lambda((a_1 + 0i) + (a_2 + 0i)) = \lambda((a_1 + a_2) + i(0 + 0)) \\ &= \lambda(a_1 + a_2) = \lambda a_1 + \lambda a_2 = \lambda x_1 + \lambda x_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(iii)} \quad (\lambda + \mu) \cdot x_1 &= (\lambda + \mu)(a_1 + 0i) = (\lambda + \mu)a_1 + (\lambda + \mu)0i \\ &= (\lambda + \mu)a_1 = \lambda a_1 + \mu a_1 = \lambda x_1 + \mu x_1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(iv)} \quad (\lambda \mu) x_1 &= (\lambda \mu)(a_1 + 0i) = (\lambda \mu)a_1 + (\lambda \mu)0i \\ &= (\lambda \mu)a_1 = \lambda(\mu a_1) = \lambda(\mu x_1) \end{aligned}$$

$$\text{(v)} \quad 1 \cdot x_1 = 1(a_1 + 0i) = a_1 + 0i = x_1$$

Aus (ii), (iii), (iv), (v) $\Rightarrow (V, +, \cdot|_{\mathbb{R} \times V})$ ist ein \mathbb{R} -Vektorraum

b) Es gilt: $\mathbb{C} := (\mathbb{R}^2, +, \cdot)$? 2/2
somit gilt $\forall v \in V : v \in \mathbb{R}^2$

$$|\mathbb{R}^2| = 2 \quad \dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^2) = 2$$

$$|V \text{ als } \mathbb{C}\text{-Vektorraum}| = n \Rightarrow |V \text{ als } \mathbb{R}\text{-Vektorraum}| = 2$$

0/3