

中山大学本科生课程考试试题答案和评分标准

考试科目：《数理统计》（B 卷）

学年学期：2023 学年第 1 学期

开课单位：数学学院（珠海）

考试方式：闭卷

考试时长：120 分钟

课程编码：MAZ317

课程负责人：任玉杰

课程类别：专必

一、填空题（共5小题，每小题2分，共10分）

1. $E \left\{ \left[\frac{\partial \log f(x; \theta)}{\partial \theta} \right]^2 \right\}$ 或 $-E \left[\frac{\partial^2 \log f(x; \theta)}{\partial \theta^2} \right]$ 或 $\text{Var} \left[\frac{\partial \log f(x; \theta)}{\partial \theta} \right];$

1.评分标准：写对其中一个费希尔信息公式即可满分。

2. $\sum_{j=1}^b \sum_{i=1}^a (X_{ij} - \bar{X}_{\cdot j})^2$; 3. 完备充分;

4. $\frac{f(x_1; \theta) f(x_2; \theta) \cdots f(x_n; \theta)}{f_{Y_1}(u_1(x_1, x_2, \cdots, x_n); \theta)} = H(x_1, x_2, \cdots, x_n);$ 5. $\frac{L(\theta_0)}{L(\theta)}$

二、讨论题（共2小题，每小题6分，共12分）

1.解：因为 $e_i = X_i - \theta$ 具有共同pdf $f(x)$ ，所以 X_i 的共同概率密度函数为 $f_X(x; \theta) = f(x - \theta)$, $x \in (-\infty, +\infty)$,

1分

取对数得 $\log f_X(x; \theta) = \log f(x - \theta)$,

对 θ 求导数得 $\frac{d \log f_X(x; \theta)}{d\theta} = -\frac{f'(x - \theta)}{f(x - \theta)}$

2分

由 $f(x)$ 满足正则条件，从而有费希尔信息为

$$I(\theta) = \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\frac{d \log f(x; \theta)}{d\theta} \right]^2 \cdot f(x; \theta) dx$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \left[-\frac{f'(x - \theta)}{f(x - \theta)} \right]^2 \cdot f(x - \theta) dx \stackrel{z=x-\theta}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\frac{f'(z)}{f(z)} \right]^2 \cdot f(z) dz$$

2分

因此,位置模型的信息确实不依赖于 θ .

1分

2.解：均匀族 $\{f(x; \theta), 0 < \theta < +\infty\}$ 不是正则指数类.

2分

因为 $f(x; \theta)$ 服从 $U(0, \theta)$ ，所以均匀密度函数是

$$Z = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - E(\bar{X} - \bar{Y})}{\sqrt{\text{Var}(\bar{X} - \bar{Y})}} = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sigma \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim N(0,1) \quad 4\text{分}$$

这作为T统计量的分子. 设 $S_p^2 = \frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$

$$ES_p^2 = \frac{(n_1-1)ES_1^2 + (n_2-1)ES_2^2}{n_1 + n_2 - 2} = \frac{(n_1-1)\text{Var}(X) + (n_2-1)\text{Var}(Y)}{n_1 + n_2 - 2} = \sigma^2$$

所以 σ^2 的混合估计量 S_p^2 是 σ^2 的无偏估计量. 2分

$$\therefore \frac{(n_1-1)S_1^2}{\sigma^2} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n_1-1),$$

$$\frac{(n_2-1)S_2^2}{\sigma^2} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^{n_2} (Y_i - \bar{Y})^2 \sim \chi^2(n_2-1),$$

且 S_1^2 与 S_2^2 相互独立, 根据书123页推论3.3.1(卡方分布的可加性)得

$$\frac{(n_1 + n_2 - 2)S_p^2}{\sigma^2} = \frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n_1 + n_2 - 2) \quad 3\text{分}$$

因为 S_1^2 与 $\bar{X}$ 相互独立, S_2^2 与 $\bar{Y}$ 相互独立, 两个样本是彼此相互独立的, 根据书143页

$$t\text{分布定义, 得 } T = \frac{Z}{\sqrt{\frac{(n_1 + n_2 - 2)S_p^2}{\sigma^2}}} = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2) \quad 2\text{分}$$

$$(2) \quad 1 - \alpha = P\{-t_{\alpha/2} < T \leq t_{\alpha/2}\} = P\left\{-t_{\alpha/2} < \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \leq t_{\alpha/2}\right\}$$

$$1 - \alpha = P\left\{(\bar{x} - \bar{y}) - t_{\alpha/2} S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \leq \mu_1 - \mu_2 < (\bar{x} - \bar{y}) + t_{\alpha/2} S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}\right\} \quad 2\text{分}$$

$\triangle = \mu_1 - \mu_2$ 的精确度为 $(1-\alpha) 100\%$ 置信区间为

$$((\bar{x} - \bar{y}) - t_{\alpha/2} S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}, (\bar{x} - \bar{y}) + t_{\alpha/2} S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}) \quad 2\text{分}$$