

Examen d'Algèbre 3

Exercice 1

Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ une application linéaire définie par

$$f(x, y, z) = (x - y + 2z, -2x + y - 3z, -x + y - 2z),$$

1. Donner la matrice A de f relativement à la base canonique \mathcal{B} de \mathbb{R}^3 .
2. Soit $u = (1, 1, 0)$. Calculer $f(u)$, $f^2(u)$ et $f^3(u)$ (rappel : $f^2 = f \circ f$, $f^3 = f \circ f \circ f$).
3. Montrer que $\mathcal{B}_0 = (u, f(u), f^2(u))$ est une base de \mathbb{R}^3 .
4. Écrire la matrice A_0 de f dans une base \mathcal{B}_0 .
5. Donner la matrice P de passage de la base \mathcal{B} à la base \mathcal{B}_0 puis calculer P^{-1} .
6. Donner la relation entre A , A_0 et P . Utiliser celle-ci pour vérifier la réponse à la question 4.
7. Échelonner la matrice A et en déduire le rang de f .
8. Donner les dimensions du noyau et de l'image de f puis déterminer une base de $\text{Ker } f$ et une base de $\text{Im } f$.
9. A-t-on $\mathbb{R}^3 = \text{Ker } f \oplus \text{Im } f$?

Exercice 2

On se place dans $\mathbb{R}_2[X]$ l'espace vectoriel des polynômes de degré au plus 2. On rappelle que la base canonique de $\mathbb{R}_2[X]$ est la famille de polynômes $(1, X, X^2)$. Soient f et g les applications définies sur $\mathbb{R}_2[X]$ par

$$\forall P \in \mathbb{R}_2[X], \quad f(P) = P(X+1) \quad \text{et} \quad g(P) = P(X-1).$$

1. Soit $P = a + bX + cX^2$ un polynôme quelconque de $\mathbb{R}_2[X]$. Montrer que $f(P) = a + b + c + (b + 2c)X + cX^2$ et calculer $g(P)$.
2. Montrer que f est linéaire, on admettra que g l'est aussi.
3. Montrer que les applications f et g sont inverses l'une de l'autre.
4. Donner U et V , matrices respectivement de f et g dans la base canonique de $\mathbb{R}_2[X]$.
5. Vérifier que U et V sont inverses l'une de l'autre.

Exercice 3

1. Résoudre le système linéaire en utilisant la méthode de Gramer:

$$\begin{cases} -x + y + z = 1 \\ x - y + z = 1 \\ x + y - z = 1 \end{cases}$$

2. Résoudre le système linéaire en utilisant la méthode de Gauss:

$$\begin{cases} x + 3y + 2z = 1 \\ 2x - 2y = 2 \\ x + y + z = 2 \end{cases}$$

Exercice 4

Soit E un espace vectoriel de dimension finie, f une application linéaire de E dans E ; montrer que

- 1.

$$\ker(f) = \ker(f^2) \iff \ker(f) \cap \text{Im}(f) = \{0\}$$

- 2.

$$\text{Im}(f) = \text{Im}(f^2) \iff E = \ker(f) + \text{Im}(f)$$