



Correction d'Examen d'Analyse 2 – Intégration – SMA

Exercice 1 (Questions du cours 3 pts).

Voir le polycopie du cours.

Exercice 2 (3 pts).

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose

$$I_n = \int_0^1 \frac{dx}{(x^2 + 1)^n}.$$

(1) Exprimons I_{n+1} en fonction de I_n pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. En effet :

(2 pts)

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^1 \frac{1}{(x^2 + 1)^n} dx = \left[\frac{x}{(x^2 + 1)^n} \right]_0^1 + 2n \int_0^1 \frac{x^2}{(x^2 + 1)^{n+1}} dx \\ &= \frac{1}{2^n} + 2n \int_0^1 \frac{x^2 + 1 - 1}{(x^2 + 1)^{n+1}} dx = \frac{1}{2^n} + 2n(I_n - I_{n+1}), \end{aligned}$$

Donc

$$I_{n+1} = \frac{2n-1}{2n} I_n + \frac{1}{n2^{n+1}}.$$

(2) Déduire la valeur de I_2 , on a :

(1 pt)

$$I_1 = \int_0^1 \frac{1}{x^2 + 1} dx = [\arctan x]_0^1 = \frac{\pi}{4}.$$

Donc

$$I_2 = \frac{1}{2} I_1 + \frac{1}{2^2} = \frac{\pi}{8} + \frac{1}{4}.$$

Exercice 3 (5 pts).

(1) Voir Exercice 4 de la Série d'Exercices TD N°1.

(2) Calcul de l'intégrale suivante :

(2 pts)

$$\int_{-1/2}^{1/2} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \frac{1}{1-x} dx.$$

On pose

$$t = \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \iff t^2 = \frac{1-x}{1+x} \iff x = \frac{1-t^2}{1+t^2},$$

$$1-x = \frac{2t^2}{1+t^2} \quad \text{et} \quad dx = \frac{-4t}{(1+t^2)^2} dt.$$

Donc

$$\begin{aligned}\int_{-1/2}^{1/2} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \frac{1}{1-x} dx &= \int_{\sqrt{3}}^{\sqrt{3}/3} t \frac{1+t^2}{2t^2} \frac{-4t}{(1+t^2)^2} dt \\ &= -2 \int_{\sqrt{3}}^{\sqrt{3}/3} \frac{1}{1+t^2} dt = 2 \int_{\sqrt{3}/3}^{\sqrt{3}} \frac{1}{1+t^2} dt \\ &= 2 [\arctan t]_{\sqrt{3}/3}^{\sqrt{3}} = 2 \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6} \right) = \frac{\pi}{3}.\end{aligned}$$

Exercice 4 (4 pts).

Voir Exercice 1 et Exercice 3 de la Série d'Exercices TD N°2

Exercice 5 (4 pts).

(1) On a $\frac{x^2-1}{x(1+x^2)} = \frac{a}{x} + \frac{bx+c}{x^2+1} = \frac{(a+b)x^2+cx+a}{x(1+x^2)}$

Par identification des constantes on a : $\begin{cases} a = -1 \\ a+b = 1 \\ c = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} a = -1 \\ b = 2 \\ c = 0 \end{cases}.$

Donc $\frac{x^2-1}{x(1+x^2)} = \frac{-1}{x} + \frac{2x}{x^2+1}$, alors

$$\int \frac{x^2-1}{x(1+x^2)} dx = \int \left(\frac{-1}{x} + \frac{2x}{x^2+1} \right) dx = \ln(x^2+1) - \ln|x| + c = -\ln\left(\frac{x}{x^2+1}\right) + c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

(2) Résoudre sur $]0, +\infty[$ l'équation différentielle : $(1+x^2)y'(x) + \frac{x^2-1}{x}y(x) = 1.$

L'équation différentielle linéaire du premier ordre (SSM) sans second membre est :

$$(1+x^2)y'(x) + \frac{x^2-1}{x}y(x) = 0 \iff y'(x) + \frac{x^2-1}{x(1+x^2)}y(x) = 0$$

— La solution y_0 de l'équation SSM est sous la forme :

$$y_0(x) = Ke^{-\int \frac{x^2-1}{x(1+x^2)} dx} = K \frac{x}{x^2+1}, \text{ avec } K \in \mathbb{R}.$$

— Trouver y_p une solution particulière de l'équation par "La variation de la constante", on a :

$$y_p(x) = K(x) \frac{x}{x^2+1} \implies K'(x) \frac{x}{x^2+1} = \frac{1}{x^2+1} \implies K(x) = \ln(x).$$

Donc

$$y_p(x) = \frac{x \ln x}{x^2+1} \text{ est une solution particulière.}$$

D'où la solution générale $y = y_0 + y_p$ de l'équation différentielle linéaire du premier ordre est :

$$y(x) = \frac{x}{x^2+1} (K + \ln x), \text{ avec } K \in \mathbb{R}.$$

— $y(1) = 1$ implique que $K = 2$, donc la solution désirée est :

$$y(x) = \frac{x}{x^2+1} (2 + \ln x).$$