





Levels of Symptoms



Comparison of symptoms



Country and Survey Year




Symptoms Rate over Year


Stunting, Overweight, Wasting and Underweight for Survey Year

	Stunting	Overweight	Wasting	Underweight
1982-83	46	3.1	5.5	22.8
1985	132.3	24.7	60.4	91.1
1985-86	70.9	0.2	17.3	66.8
1985-87	62.5	7.8	24	44.4
1985-89	37	(no value)	5.5	(no value)
1986	183.9	25.7	30	76.6
1986-88	60.9	3.5	5.2	34
1987	453.7	28.2	74.8	307
1987-88	7.7	5.8	2.7	5
1987-89	61.3	(no value)	11.1	40.7
1988	272.4	28.8	48.3	105.1
1988-89	47.7	3.6	3.1	19.7
1988-90	62.7	(no value)	20.3	55.5
1988-94	3.2	5.4	0.7	0.9
1989	240.6	27.8	50.9	137.7
1989-90	106.7	0.6	24.4	91.4
1990	253.5	24.2	50.7	110.2


Measures of different levels



Symptoms over country



Income Classification over Year and Country Regions



Year and Income Classification

Income Classification	Year
1	1983
4	1985
4	2019
13	1988
16	1986
18	1989
18	1990

symptoms over survey year

