


地理総合， 地理探究

(解答番号 ～)

第1問 食料の生産や消費は，自然環境や生活文化にかかわり，地球的課題にも結びついている。これに関する次の問い(問1～4)に答えよ。(配点 13)

問1 次の図1は，食や健康に関するある指標を示したものである。この指標として最も適当なものを，後の①～④のうちから一つ選べ。



統計年次は，2018～2020 年の平均または 2019 年のいずれか。FAOSTAT などにより作成。

図1

- ① 栄養不足人口の割合
- ② 穀物の輸入依存度
- ③ 1人1日当たりカロリー摂取量
- ④ 平均寿命

問 2 次の図 2 中の地点ア～エの周辺における自然環境と農業の特徴について述べた文として最も適当なものを，後の①～④のうちから一つ選べ。

2




図 2

- ① アの周辺は，降水量の季節変化が少ない冷涼な気候であり，肥沃な土壌をいかして小麦などが栽培されている。
- ② イの周辺は，1 年中乾燥する気候であり，オアシスや灌漑施設かんがいを利用してアブラヤシなどが栽培されている。
- ③ ウの周辺は，雨季と乾季が明瞭な高温の気候であり，焼畑によりキャッサバなどが栽培されている。
- ④ エの周辺は，冬より夏の降水量が多い温暖な気候であり，ブドウなどが栽培されている。


地理総合，地理探究

問 3 食文化には，地域の歴史的背景や自然環境が反映されている。次の図 3 は，いくつかの国におけるコーヒーと茶の 1 人 1 日当たり消費量*を示したものであり，①～④は，イギリス，イタリア，インドネシア，中国**のいずれかである。イギリスに該当するものを，①～④のうちから一つ選べ。

3

*コーヒーは 1 杯 10 g，茶は 1 杯 3 g 換算。

**台湾，ホンコン，マカオを含まない。



統計年次は 2020 年。FAOSTAT により作成。

図 3

問 4 次の表 1 は、南・東南アジアとヨーロッパについて、イモ類の生産量に占める、生産・収穫から消費までの各段階における食品ロスの割合と、最終的な消費量の割合を示したものである。表 1 に関することがらについて述べた文章中の下線部①～④のうちから、適当でないものを一つ選べ。

4

表 1

(単位：％)

	各段階における食品ロスの割合					最終的な消費量の割合	合計
	生産・収穫	貯蔵	加工	卸売・小売	消費		
南・東南アジア	6.0	17.9	7.6	7.5	1.8	59.2	100.0
ヨーロッパ	20.0	7.2	10.9	4.3	9.8	47.8	100.0

統計年次は 2008～2010 年。FAO の資料により作成。

両地域のうち、生産・収穫段階のロスの割合が高いのは、ヨーロッパである。その要因の一つには、①小売業者の定める品質基準に満たない生産物が廃棄されることがある。貯蔵段階のロスの割合は、南・東南アジアの方が高い。その要因の一つには、②高温湿潤な環境下でイモ類の収穫時期が短期に集中し、貯蔵施設が不足することがある。いずれの地域においても、卸売・小売段階のロスの要因の一つには、③小売店で過剰に仕入れた商品を廃棄する状況があげられる。消費段階のロスの割合は、ヨーロッパの方が高い。こうしたロスを削減するために、④フードバンクを通じて必要とする人に食品を提供するなどの取組みがみられる。