

Soit  $f$  une fonction définie pour tout  $x \in \mathbb{R}$  par  $f(x) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+x^2}$ .

1. Vérifier que  $f$  définit une densité de probabilité. On note  $X$  une variable aléatoire admettant  $f$  pour densité.

Il suffit de vérifier que  $f(x) \geq 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$  puis de calculer :

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+x^2} dx \\ &= \frac{1}{\pi} [\arctan(x)]_{-\infty}^{+\infty} \\ &= \frac{1}{\pi} \left( \frac{\pi}{2} - \left( -\frac{\pi}{2} \right) \right) \\ &= 1 \end{aligned}$$

2. Montrer que  $X$  n'admet pas de moment d'ordre 1.

On remarque que  $x \times \frac{1}{1+x^2} \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{x}$  donc par comparaison, la fonction  $x \mapsto xf(x)$  n'est pas intégrable au voisinage de  $+\infty$ . Donc  $X$  n'est pas intégrable et  $\mathbb{E}(X)$  n'existe pas.

3. Calculer la fonction de répartition de  $X$ .

Soit  $t \in \mathbb{R}$  :

$$\begin{aligned} F_X(t) &= P(X \leq t) \\ &= \int_{-\infty}^t f(x) dx \\ &= \frac{1}{\pi} [\arctan(x)]_{-\infty}^t \\ &= \frac{1}{\pi} \left( \arctan(t) + \frac{\pi}{2} \right) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan(t) \end{aligned}$$

4. Déterminer la fonction de répartition de  $Y = \arctan(X)$  et en déduire sa loi.

On sait que  $-\frac{\pi}{2} \leq Y < \frac{\pi}{2}$ . Donc si  $t < -\frac{\pi}{2}$  alors  $F_Y(t) = 0$  et si  $t > \frac{\pi}{2}$  alors  $F_Y(t) = 1$ . Soit  $t \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$  :

$$\begin{aligned} F_Y(t) &= P(X \leq \tan(t)) \\ &= \frac{1}{\pi} [\arctan(x)]_{-\infty}^{\tan(t)} \\ &= \frac{t}{\pi} + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

On reconnaît la fonction de répartition d'une loi uniforme  $\mathcal{U}\left(\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]\right)$ .