

Soient  $a$  et  $b$  des nombres réels. Déterminer tous les polynômes de  $\mathbb{R}[X]$  de la forme

$$P(X) = 3X^5 - 10X^3 + aX + b$$

ayant une racine d'ordre de multiplicité égal à 3. Factoriser dans  $\mathbb{R}[X]$  les polynômes obtenus.



$x_0$  est racine d'ordre de multiplicité 3 ssi  $P(x_0) = P'(x_0) = P''(x_0) = 0$  et  $P^{(3)}(x_0) \neq 0$ .

$$P(x_0) = 3 \cdot x_0^5 - 10 \cdot x_0^3 + a \cdot x_0 + b$$

$$P'(x_0) = 15 \cdot x_0^4 - 30 \cdot x_0^2 + a = 0$$

$$P''(x_0) = 60 \cdot x_0^3 - 60x_0 = 60 \cdot x_0(x_0^2 - 1) = 0$$

$$P^{(3)}(x_0) = 180 \cdot x_0^2 - 60 = 60(3 \cdot x_0^2 - 1)$$

$$(3) \Leftrightarrow x_0 \cdot (x_0^2 - 1) = 0 \Leftrightarrow x_0 = 0 \text{ ou } x_0 = 1 \text{ ou } x_0 = -1.$$

1<sup>er</sup> cas :  $x_0 = 0$

$$P^{(3)}(x_0) \neq 0$$

$$(2) \Rightarrow a = 0$$

$$(1) \Rightarrow b = 0$$

$$P(X) = 3 \cdot X^5 - 10 \cdot X^3 = X^3 \cdot (3X^2 - 10) = 3 \cdot X^3 \cdot \left( X - \sqrt{\frac{10}{3}} \right) \left( X + \sqrt{\frac{10}{3}} \right)$$

2<sup>ème</sup> cas :  $x_0 = 1$

$$P^{(3)}(x_0) \neq 0$$

$$(2) \Rightarrow 15 - 30 + a = 0 \Rightarrow a = 15$$

$$(1) \Rightarrow 3 - 10 + 15 + b = 0 \Rightarrow b = -8$$

$$P(X) = 3 \cdot X^5 - 10 \cdot X^3 + 15 \cdot X - 8 = (X - 1)^3 \cdot (3X^2 + 9X + 8)$$

3<sup>ème</sup> cas :  $x_0 = -1$

$$P^{(3)}(x_0) \neq 0$$

$$(2) \Rightarrow 15 - 30 + a = 0 \Rightarrow a = 15$$

$$(1) \Rightarrow -3 + 10 - 15 + b = 0 \Rightarrow b = 8$$

$$P(X) = 3 \cdot X^5 - 10 \cdot X^3 + 15 \cdot X + 8 = (X + 1)^3 \cdot (3X^2 - 9X + 8)$$