

Equations aux dérivées partielles

El Bouzekraoui Younes — MDAA Saad

Département Sciences du Numérique - Deuxième année
2020-2021

Contents

1	Equations aux dérivées partielles elliptiques	3
1.1	Partie théorique	3

1 Equations aux dérivées partielles elliptiques

1.1 Partie théorique

- On suppose que $u \in H^1(\Omega)$
pour $w \in H_0^1(\Omega)$ on a :

$$-\int_{\Omega} \Delta u \cdot w \, dx = \int_{\Omega} f \cdot w \, dx$$

d'après la formule de green :

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla w \, dx - \int_{\partial\Omega} \gamma_1(u) \gamma_0(w) \, dx = \int_{\Omega} f \cdot w \, dx$$

on pose $v = u - u_d \in H_0^1(\Omega)$ on a :

$$\int_{\Omega} \nabla(v + u_d) \cdot \nabla w \, dx = \int_{\Omega} f w \, dx + \int_{\partial\Omega_d} \gamma_1(u) \gamma_0(w) \, dx + \int_{\partial\Omega_n} \gamma_1(u) \gamma_0(w) \, dx$$

or

$$\gamma_1(u) = \frac{\partial u}{\partial n} = g \text{ sur } \partial\Omega_n$$

et

$$\gamma_0(w) = w = 0 \text{ sur } \partial\Omega_d \text{ car } w \in H_0^1(\Omega)$$

donc

$$\boxed{\int_{\Omega} \nabla v \cdot \nabla w \, dx = \int_{\Omega} f w \, dx + \int_{\partial\Omega_n} g \gamma_0(w) \, dx - \int_{\Omega} \nabla u_d \cdot \nabla w \, dx}$$

- Soit la **forme bilinéaire** sur $H_0^1(\Omega) \times H_0^1(\Omega)$ définie par

$$a : (u, v) \rightarrow \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx$$

soit la **forme** sur $H_0^1(\Omega)$ définie par

$$l : w \rightarrow \int_{\Omega} f w \, dx + \int_{\partial\Omega_n} g \gamma_0(w) \, dx - \int_{\Omega} \nabla u_d \cdot \nabla w \, dx$$

en appliquant le théoreme de Lax-Milgram sur a et l on a

$$\boxed{\exists! u \in H_0^1(\Omega) \quad \forall v \in H_0^1(\Omega) \quad a(u, v) = l(v)}$$

pour cela il faut vérifier que

→ **l est linéaire** :

soient $w_1, w_2 \in H_0^1(\Omega)$, $\lambda \in \mathbb{R}$ on a

$$\begin{aligned} l(w_1 + \lambda w_2) &= \int_{\Omega} f(w_1 + \lambda w_2) \, dx + \int_{\partial\Omega_n} g \gamma_0(w_1 + \lambda w_2) \, dx - \int_{\Omega} \nabla u_d \cdot \nabla(w_1 + \lambda w_2) \, dx \\ &= \int_{\Omega} f w_1 \, dx + \int_{\partial\Omega_n} g \gamma_0(w_1) \, dx - \int_{\Omega} \nabla u_d \cdot \nabla w_1 \, dx + \lambda \left(\int_{\Omega} f w_2 \, dx + \int_{\partial\Omega_n} g \gamma_0(w_2) \, dx - \int_{\Omega} \nabla u_d \cdot \nabla w_2 \, dx \right) \\ &= l(w_1) + \lambda l(w_2) \end{aligned}$$

→ **l est continue** :

soit $w \in H_0^1(\Omega)$ on a

$$\begin{aligned} |l(w)| &= \left| \int_{\Omega} f w \, dx + \int_{\partial\Omega_n} g \gamma_0(w) \, dx - \int_{\Omega} \nabla u_d \cdot \nabla w \, dx \right| \\ &\leq \left| \int_{\Omega} f w \, dx \right| + \left| \int_{\partial\Omega_n} g \gamma_0(w) \, dx \right| + \left| \int_{\Omega} \nabla u_d \cdot \nabla w \, dx \right| \end{aligned}$$

par inégalité de cauchy schwarz car $f \in L^2(\Omega)$ et $w \in H_0^1(\Omega) \subset L^2(\Omega)$ on a

$$\left| \int_{\Omega} f w \, dx \right| \leq \|f\|_{L^2(\Omega)} \|w\|_{L^2(\Omega)}$$

par inégalité de Poincaré on a $\exists C_1 \geq 0$ tq

$$| \int_{\Omega} f w \, dx | \leq C_1 \|f\|_{L^2(\Omega)} |w|_{1,\Omega}$$

$g \in L^2(\partial\Omega_n)$ et $\gamma_0(w) \in L^2(\partial\Omega_n)$ donc par inégalité de cauchy schwarz on a

$$| \int_{\partial\Omega_n} g \gamma_0(w) \, dx | \leq \|g\|_{L^2(\partial\Omega_n)} \|\gamma_0(w)\|_{L^2(\partial\Omega_n)}$$

par inégalité de Poincaré on a $\exists C_2 \geq 0$ tq

$$| \int_{\partial\Omega_n} g \gamma_0(w) \, dx | \leq C_2 \|g\|_{L^2(\partial\Omega_n)} |w|_{1,\Omega}$$

$w \in H_0^1(\Omega)$ et $u_d \in H_0^1(\Omega)$ donc par inégalité de cauchy schwarz on a (car Ω est un ouvert borné)

$$| \int_{\Omega} \nabla u_d \cdot \nabla w \, dx | \leq |u_d|_{1,\Omega} |w|_{1,\Omega}$$

donc

$$|l(w)| \leq C |w|_{1,\Omega}$$

d'où la continuité

→ **a est continue :**

par continuité du produit scalaire

→ **a est coercive :**

soit $u \in H_0^1(\Omega)$ on a par inégalité de cauchy schwarz

$$|a(u, u)| = | \langle u, u \rangle_{1,\Omega} | \leq |u|_{1,\Omega}^2$$