

# Analysis I - D-INFK

Miles Strässle

3. August 2020

## Inhaltsverzeichnis

### I Zusammenfassung Cheat Sheet

#### 1 Mengen

- 1.1 Definitionen
- 1.2 Identitäten

#### 2 Komplexe Zahlen

#### 3 Grenzwert

- 3.1 Dominanz
- 3.2 Fundamentallimes
- 3.3 Wurzeltrick
- 3.4  $e^{\log(x)}$ -Trick
- 3.5 Substitution
- 3.6 Satz von Bernoulli-de l'Hôpital
- 3.7 Wichtige Grenzwerte

#### 4 Folgen

- 4.1 Definitionen
- 4.2 Rechnen mit Eigenschaften
- 4.3 Rechnen mit Grenzwerten
- 4.4 Hilfsmittel
- 4.5 Konvergenzkriterien
- 4.6 Tipps & Beispiele
- 4.7 Cauchy-Folgen

#### 5 Reihen

- 5.1 Definitionen
- 5.2 Rechenregeln Reihen
- 5.3 Konvergenzkriterien
- 5.4 Potenzreihe

#### 6 Stetigkeit

- 6.1 Lipschitz-Stetigkeit
- 6.2 Weierstrass-Kriterium
- 6.3 Gleichmässige Stetigkeit
- 6.4 Punktweise Konvergenz

6.5	Gleichmässige Konvergenz	8
7	Differenzialrechnung	9
7.1	Umkehrsatz	9
7.2	Mittelwertsatz	9
7.3	Taylorpolynom	9
7.4	Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung	10
8	Integration	10
8.1	Elementare Integrale	10
8.2	Regeln	11
8.3	Tipps	11
8.4	Uneigentliche Integrale	11
8.5	Beweis bijektiver Funktionen	11
9	Differentialgleichungen	11
9.1	Grundbegriffe	11
9.2	Methoden	12
10	Vollständige Induktion	14
10.1	Beispiel	14
11	Zwischenwertsatz	15
11.1	Beispiel (Fixpunkt)	15
II	Trigonometrie	16
12	Definitionen & Sätze	16
12.1	Definitionen	16
12.2	Sinussatz	16
12.3	Cosinussatz	16
13	Standardintegrale	16
14	Euler Formel	17
15	Ableitungen, Integrale	17
15.1	Ableitungen	17
16	Rechenregeln	17
16.1	Additionstheoreme	17
16.2	Doppelwinkel	17
16.3	Produkt-zu-Summen-Formel	18
16.4	Hyperbolische Funktionen	18
16.5	Additionstheoreme	18
16.6	Ableitungen	18
17	Koordinatensysteme mit Funktionaldeterminante	18
17.1	Polarkoordinaten	18

17.2	Zylinderkoordinaten	19
17.3	Kugelkoordinaten	19
18	Rotationsmatrix, Drehmatrix	19
18.1	Drehmatrix der Ebene	19
18.2	Drehmatrix in 3-Dimensionen	20
19	Plots Trigonometrischer Funktionen	21
20	Nützliches	22

### Teil I

## Zusammenfassung Cheat Sheet

### 1 Mengen

#### 1.1 Definitionen

<b>Obere/Untere Schranke:</b>	$\exists b \in \mathbb{R} \forall a \in A : a \leq b, \exists c \in \mathbb{R} \forall a \in A : a \geq c$
<b>Supremum:</b>	kleinste obere Schranke $\sup A$
<b>Infimum:</b>	grösste untere Schranke $\inf A$
<b>Maximum/Minimum:</b>	$\sup A \in A, \inf A \in A$
<b>kompakt:</b>	abgeschlossen und beschränkt
<b>abgeschlossen:</b>	z.B. $[0, 1]$


#### 1.1.1 Vorgehen zur Bestimmung von Maximum/Minimum

1. Zeigen, dass  $f(x)$  stetig ist
2. Zeigen, dass Definitionsmenge kompakt ist
3. Nach **Satz von Weierstrass** wird Maximum/Minimum angenommen
4. Maximum/Minimum bestimmen

#### 1.2 Identitäten

$$A + B := \{a + b | a \in A, b \in B\}$$
$$\sup(A + B) = \sup A + \sup B, \inf(A + B) = \inf A + \inf B$$
$$\sup(A \cup B) = \max\{\sup A, \sup B\}, \inf(A \cup B) = \min\{\inf A, \inf B\}$$

## 2 Komplexe Zahlen



$$z = x + iy = r(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$$
$$r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$
$$\arg(z) = \varphi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \quad (\text{je nach Quadranten})$$
$$x = r \cos(\varphi)$$
$$y = r \sin(\varphi)$$
$$zw = (re^{i\varphi}) \cdot (se^{i\psi}) = rse^{i(\varphi+\psi)}$$
$$\sqrt[q]{z} = \sqrt[q]{r}e^{i\varphi/q}, \text{ wobei } \varphi = \frac{\varphi}{q} \mod \frac{2\pi}{q}$$
$$e^{i(\frac{\pi}{2}+2\pi k)} = i, e^{i\pi} = -1, e^{-i\pi} = -1$$

$$(a,b)\cdot (c,d)=(ac-bd,ad+bc)$$

$$\overline{z}=x-iy$$

$$z^{-1}=\frac{\overline{z}}{|z|^2}$$

$$i=\sqrt{-1}$$

$$i^2=-1$$

$$|z|^2=z\overline{z}$$

$$|zw|^2=(zw)\cdot \overline{(zw)}=|z|^2|w|^2$$

### 3.7 Wichtige Grenzwerte

$$\lim_{n\rightarrow\infty}\left(1+\frac{x}{n}\right)^n=e^x$$

$$\lim_{x\rightarrow 0}\frac{a^x-1}{x}=\ln a$$

$$\lim_{x\rightarrow 0}\frac{1-\cos(x)}{x}=0$$

$$\lim_{x\rightarrow 0}\frac{\tan(x)}{x}=1$$

$$\lim_{n\rightarrow\infty}\frac{n!}{n^n}=0$$

$$\lim_{n\rightarrow\infty}\sqrt[n]{n!}=\infty$$

$$\lim_{n\rightarrow\infty}\ln(n)=\infty$$

$$\lim_{n\rightarrow\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=e$$

$$\lim_{x\rightarrow 0}\frac{\log_a(1+x)}{x}=\frac{1}{\ln a}$$

$$\lim_{x\rightarrow 0}\frac{1-\cos(x)}{x^2}=\frac{1}{2}$$

$$\lim_{x\rightarrow 0}\frac{\sin(x)}{x}=1$$

$$\lim_{n\rightarrow 0}\frac{e^n-1}{n}=1$$

$$\lim_{n\rightarrow\infty}\sqrt[n]{n}=1$$

$$\lim_{x\rightarrow 0}\frac{\log_a(1+x)}{x}=\frac{1}{\ln a}$$

## 4 Folgen

### 4.1 Definitionen

**konvergent**  $\lim_{x\rightarrow\infty}a_n$  existiert

**divergent**  $\lim_{x\rightarrow\infty}a_n$  existiert nicht

**Nullfolge**  $\lim_{x\rightarrow\infty}a_n=0$  gilt

**beschränkt** Es gibt  $C_1,C_2$ , so dass gilt  $C_1\leq a_n\leq C_2$  bzw.  $C$  gibt, so dass  $|a_n|\leq C$

**unbeschränkt** falls  $(a_n)$  nicht beschränkt ist. Unbeschränkte folgen sind stets divergent

**monoton wachsend**  $a_n\leq a_{n+1}\quad\forall n\in\mathbb{N}$

**streng monoton wachsend**  $a_n< a_{n+1}\quad\forall n\in\mathbb{N}$

**monoton fallend**  $a_n\geq a_{n+1}\quad\forall n\in\mathbb{N}$

**streng monoton fallend**  $a_n> a_{n+1}\quad\forall n\in\mathbb{N}$

**alternierend** die Vorzeichen der Folgenglieder wechseln sich ab

**bestimmt divergent** / **uneigentlich konvergent** es gilt  $\lim_{n\rightarrow\infty}a_n=\pm\infty$

**Def. 4.1** (Grenzwert).

$$\lim_{n\rightarrow\infty}a_n=a\Leftrightarrow a_n\rightarrow a$$

$$\Leftrightarrow\forall\varepsilon>0\exists n_0\in\mathbb{N}\forall n\geq n_0:|a_n-a|<\varepsilon$$

**Def. 4.2** (Teilfolge). Werden von einer Folge beliebig viele Glieder weggelassen, aber nur so viele, dass noch unendlich viele übrigbleiben, so erhält man eine Teilfolge.

**Def. 4.3** (Häufungspunkt).  $a$  ist Häufungspunkt der Folge  $(a_n)$ , wenn in jeder Umgebung von  $a$  unendlich viele Folgeglieder liegen. Das ist äquivalent damit, dass  $a$  der Limes einer Teilfolge von  $(a_n)$  ist.

**Def. 4.4** (Limes superior / Limes inferior). Ist  $(a_n)$  eine beschränkte Folge, so heisst der grösste Häufungspunkt Limes superior ( $\limsup_{n\rightarrow\infty}a_n$  oder  $\overline{\lim}_{n\rightarrow\infty}a_n$ ). Der kleinste Häufungspunkt ist der Limes inferior ( $\liminf_{n\rightarrow\infty}a_n$  oder  $\underline{\lim}_{n\rightarrow\infty}a_n$ )

### 4.2 Rechnen mit Eigenschaften

Addition:

•  $(a_n),(b_n)$  konvergiert  $\Rightarrow (a_n+b_n)$  konvergiert

•  $(a_n)$  konvergiert,  $(b_n)$  divergent  $\Rightarrow (a_n+b_n)$  divergent

•  $(a_n)$  beschränkt,  $(b_n)$  beschränkt  $\Rightarrow (a_n+b_n)$  beschränkt

•  $(a_n)$  beschränkt,  $(b_n)$  unbeschränkt  $\Rightarrow (a_n+b_n)$  unbeschränkt

•  $(a_n)$  beschränkt,  $(b_n)\rightarrow\pm\infty\Rightarrow (a_n+b_n)\rightarrow\pm\infty$

•  $(a_n)\rightarrow\infty,(b_n)\rightarrow\infty\Rightarrow (a_n+b_n)\rightarrow\infty$

•  $(a_n)\rightarrow-\infty,(b_n)\rightarrow-\infty\Rightarrow (a_n+b_n)\rightarrow-\infty$

Produkt:

•  $(a_n)$  Nullfolge,  $(b_n)$  beschränkt  $\Rightarrow (a_nb_n)$  Nullfolge

•  $(a_n)$  konvergent,  $(b_n)$  beschränkt  $\Rightarrow (a_nb_n)$  beschränkt

•  $(a_n)$  konvergent,  $(b_n)$  konvergent  $\Rightarrow (a_nb_n)$  konvergent

•  $(a_n)$  konvergent gegen  $a\neq 0$ ,  $(b_n)$  divergent  $\Rightarrow (a_nb_n)$  divergent

### 4.3 Rechnen mit Grenzwerten

$\lim_{n\rightarrow\infty}a_n=a,\lim_{n\rightarrow\infty}b_n=b$

***Achtung!** Untenstehendes gilt nur wenn die Grenzwerte von  $a_n$  und  $b_n$  existieren. (Nicht 0 oder inf sind.)*

•  $\lim_{n\rightarrow\infty}(a_n\pm b_n)=a\pm b$

•  $\lim_{n\rightarrow\infty}(c\cdot a_n)=c\cdot a$

•  $\lim_{n\rightarrow\infty}(a_nb_n)=ab$

• **Achtung:**  $\lim_{n\rightarrow\infty}(a_n)^c=(\lim_{n\rightarrow\infty}a_n)^c$ , nur wenn  $c\neq n$

•  $\lim_{n\rightarrow\infty}\frac{a_n}{b_n}=\frac{a}{b},\quad(b_n)$  keine Nullfolge

### 4.4 Hilfsmittel

**Bernoullische Ungleichung:** Für  $x\geq-1$  und  $n\in\mathbb{N}$

$$(1+x)^n\geq 1+nx$$

**Vergleich von Folgen:** weiter rechts stehende Werte gehen schneller nach  $\infty$

$$1,\quad\ln n,\quad n^\alpha\ (\alpha>0),\quad q^n\ (q>1),\quad n!,\quad n^n$$

**Stirlingformel:**

$$n!\approx\sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n\Rightarrow\left(\frac{n}{e}\right)^n\sqrt{2\pi n}\leq n!\leq\left(\frac{n}{e}\right)^n\sqrt{2\pi n}\cdot e^{\frac{12}{n}}$$

## 3 Grenzwert

### 3.1 Dominanz

Für  $x\rightarrow+\infty$ :  $\dots<\log(\log(x))<\log(x)<x^\alpha<\alpha^x<x!<x^x$

Für  $x\rightarrow 0$ :  $\dots<\log(\log(x))<\log(x)<\left(\frac{1}{x}\right)^\alpha$

## 3.2 Fundamentallimes

$$\lim_{x\rightarrow a}\frac{\sin\odot}{\odot}=\lim_{x\rightarrow a}\frac{\tan\odot}{\odot}=1\text{ mit }\odot\overset{x\rightarrow a}{\longrightarrow}0$$

$$\lim_{x\rightarrow a}\left(1+\frac{1}{\odot}\right)^\odot=e\text{ mit }\odot\overset{x\rightarrow a}{\longrightarrow}\infty$$

$$\lim_{x\rightarrow a}\left(1+\odot\right)^{\frac{1}{\odot}}=e\text{ mit }\odot\overset{x\rightarrow a}{\longrightarrow}0$$

## 3.3 Wurzeltrick

$$\lim_{x\rightarrow\infty}\sqrt{\alpha}+\beta=\lim_{x\rightarrow\infty}(\sqrt{\alpha}+\beta)\frac{\sqrt{\alpha}-\beta}{\sqrt{\alpha}-\beta}$$

### 3.4 e<sup>log(x)</sup>-Trick

#### 3.4.0.1 Anforderung:

Term der Form  $f(x)^{g(x)}$  mit Grenzwert "0<sup>0</sup>", "∞<sup>0</sup>öder "1<sup>∞</sup>für  $x\rightarrow 0$

$$\textbf{Grundsatz:}\quad\lim_{x\rightarrow a}f(x)^{g(x)}=\lim_{x\rightarrow a}e^{g(x)\cdot\log(f(x))}$$

*Tipp:* Danach den Limes des Exponenten berechnen. Oft ist Bernoulli-de l'Hôpital dazu nützlich.

### 3.5 Substitution

$$\lim_{x\rightarrow\infty}x^2\left(1-\cos\left(\frac{1}{x}\right)\right)\Rightarrow u=\frac{1}{x}\Rightarrow\lim_{x\rightarrow 0}\frac{1-\cos(u)}{u^2}$$

### 3.6 Satz von Bernoulli-de l'Hôpital

#### 3.6.0.1 Anforderung:

Term der Form  $\frac{f(x)}{g(x)}$  mit Grenzwert entweder "0<sup>0</sup>öder "∞mit  $g'(x)\neq 0$ .

$$\textbf{Grundsatz:}\quad\lim_{x\rightarrow a}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\rightarrow a}\frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Term	Anforderung	Umformung
$f(x)g(x)$	"0 · ∞"	$\frac{g(x)}{\frac{1}{f(x)}}$
$\frac{f(x)}{g(x)}-\frac{h(x)}{i(x)}$	"∞ − ∞"	$\frac{f(x)i(x)-h(x)g(x)}{g(x)i(x)}$

4.5 Konvergenzkriterien

$$a_n \rightarrow a \Leftrightarrow a_n - a \rightarrow 0 \Leftrightarrow |a_n - a| \rightarrow 0$$

- Ist  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ , so ist der Limes  $a$  einziger Häufungspunkt der Folge  $(a_n)$  und jede Teilfolge konvergiert auch gegen  $a$ .

**Beispiel:** Wegen  $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow e$ , so gilt auch  $\left(1 + \frac{1}{2n}\right)^{2n} \rightarrow e$

- Hat die Folge zwei verschiedene Häufungspunkte, so ist die Folge sicher divergent.

- Ist die Folge monoton steigend und nach oben beschränkt, dann existiert  $\lim_{n \rightarrow \infty} a$  nun verwenden wir den Tipp für Brüche und kürzen das  $n$  heraus  
Ist die Folge monoton fallend und nach unten beschränkt, dann existiert  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_l$

- Konvergiert  $\sum_{n=0}^\infty a_n$ , so ist  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$   
Damit kann die Regeln für Reihen verwenden. Siehe Grenzwerte von Reihen.

- Gibt es eine Funktion  $f$  mit  $f(n) = a_n$  und  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a$ , so gilt auch  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ .  
Damit kann man zum Beispiel die Regel von l'Hospital und die restlichen Methoden anwenden. Siehe Grenzwerte von Funktionen.  
Achtung: Es kann sein, dass  $f$  keinen Grenzwert besitzt, aber  $(a_n)$  schon.

- Einschliessungskriterium:** Sind  $(a_n), (b_n), (c_n)$  Folgen mit  $a_n \leq b_n \leq c_n$  und haben  $(a_n), (c_n)$  den gleichen Grenzwert  $a$ , so konvergiert auch  $(b_n)$  nach  $a$ .

4.6 Tipps & Beispiele

4.6.1 Brüche

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + \ln n}{\sqrt{n^4 - n^3}}$$

Bei Brüchen empfiehlt es sich den am stärksten wachsenden Teil (das am schnellsten wachsende  $n$ ) zu kürzen. In diesem Fall ist es das  $n^4$  in der Wurzel, also  $n^2$ .

$$\begin{aligned} \dots &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + \ln n}{\sqrt{n^4 - n^3}} \cdot \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + \ln n}{n^2 \sqrt{1 - \frac{1}{n}}} \cdot \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n^2}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{\ln n}{n^2}}{\sqrt{1 - \frac{1}{n}}} = \frac{1 + 0}{\sqrt{1 - 0}} = 0 \end{aligned}$$

4.6.2 l'Hospital für Folgen (Folge als Funktion)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^2}$$

Die Funktion  $f(x) = \frac{\ln x}{x^2}$  entspricht unseren Folgegliedern ( $f(n) = a_n = \frac{\ln n}{n^2}$ ). Für  $n \rightarrow \infty$  hat der Nenner und der Zähler den Grenzwert  $\infty$ , also wenden wir die Regel von l'Hospital an.

$$\dots = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\ln x)'}{(x^2)'} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2} = 0$$

Somit geht auch die Folge gegen 0.

4.6.3 Wurzeln

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + an + 1} - \sqrt{n^2 + 1})$$

Hier wendet man die dritte binomische Formel an, um den Grenzwert zu berechnen. Die einzelnen Terme streben jeweils gegen  $\infty$  und  $\infty - \infty$  kann nicht berechnet werden.

Achtung auf die Vorzeichen beim Anwenden der Regel!

$$\begin{aligned} &= \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + an + 1} - \sqrt{n^2 + 1}) \cdot \left( \frac{\sqrt{n^2 + an + 1} + \sqrt{n^2 + 1}}{\sqrt{n^2 + an + 1} + \sqrt{n^2 + 1}} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n^2 + an + 1) - (n^2 + 1)}{\sqrt{n^2 + an + 1} + \sqrt{n^2 + 1}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{an}{\sqrt{n^2 + an + 1} + \sqrt{n^2 + 1}} \end{aligned}$$

$$\dots = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{\sqrt{1 + \frac{a}{n} + \frac{1}{n^2}} + \sqrt{1 + \frac{1}{n^2}}} = \frac{a}{1 + 1} = \frac{a}{2}$$

4.7 Cauchy-Folgen

**Def. 4.5** (Cauchy-Folge). Sei  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  eine Folge in  $\mathbb{R}$ .  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  heisst **Cauchy-Folge**, falls gilt

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N} \forall n, l \geq n_0 : |a_n - a_l| < \varepsilon$$

Die Definition sagt grundsätzlich aus, dass ab einem  $n_0(\varepsilon)$  (also einem Anfang  $n_0$ , der abhängig von  $\varepsilon$  ist) die Folgeglieder nur noch  $\varepsilon$  Abstand zu einander haben. Also der Abstand beliebig klein wird zwischen Folgegliedern.

**Satz 4.1** (Cauchy-Kriterium). Für  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$  sind äquivalent:

- $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  ist konvergent
- $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  ist Cauchy-Folge

5 Reihen

5.1 Definitionen

Eine Reihe  $\sum_{n=1}^\infty a_n$  ist konvergent mit Grenzwert  $s$ , wenn die Folge der Partialsummen  $(S_m)$ ,  $S_m := \sum_{n=1}^m a_n$  gegen  $s$  konvergiert. Also wenn gilt:  $S_m \rightarrow s$ .

**Def. 5.1** ( $\varepsilon$ -Kriterium).  $\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall m \geq n_0 : |\sum_{n=1}^m a_n - s| < \varepsilon$

**Def. 5.2** (Absolute Konvergenz). Wenn auch die Reihe der Absolutbeträge  $\sum_{n=1}^\infty |a_n|$  konvergiert, so heisst die Reihe absolut konvergent. Aus der absoluten Konvergenz folgt Konvergenz. Der Umkehrschluss ist nicht möglich.

5.2 Rechenregeln Reihen

Für konvergente Reihen gilt:

$$\sum_{n=1}^\infty a_n = A, \sum_{n=1}^\infty b_n = B \Rightarrow \sum_{n=1}^\infty (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha A + \beta B$$

5.3 Konvergenzkriterien

Konvergiert  $\sum_{n=1}^\infty a_n$ , so ist  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ .  
Wenn also  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ , so konvergiert die Reihe nicht

	Eignung	Bemerkung
Limes des allgemeinen Glieds		zeigt nur Divergenz
Majoranten- und Minorantenkriterium		ersten Glieder spielen keine Rolle
Quotientenkriterium	$a_n$ mit Faktoren wie $n!$ , $a^n$ , oder Polynome	gleiche Folgerung wie Wurzelkriterium
Wurzelkriterium	$a_n = (b_n)^n$	gleiche Folgerung wie Quotientenkriterium
Leibnitz-Kriterium	$\sin, \cos, \tan, (-1)^n$	
Absolute Konvergenz	$\sin, \cos, \tan, (-1)^n$	
Sandwich-Theorem	$\sin, \cos, \tan, (-1)^n$	

5.3.1 Reihen Kriterien

Achtung. Die nachfolgenden Kriterien sagen nur aus, ob die Reihen konvergiert oder nicht. Sie sagen nicht aus, gegen was sie konvergieren!

5.3.1.1 Quotientenkriterium

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \rightarrow q. \quad \text{Dann gilt} \begin{cases} q < 1 & \Rightarrow \sum_{n=1}^\infty a_n \text{ konvergiert absolut} \\ q = 1 & \Rightarrow \text{keine Aussage} \\ q > 1 & \Rightarrow \sum_{n=1}^\infty a_n \text{ divergiert} \end{cases}$$

5.3.1.2 Wurzelkriterium

$$\sqrt[n]{|a_n|} \rightarrow q. \quad \text{Dann gilt} \begin{cases} q < 1 & \Rightarrow \sum_{n=1}^\infty a_n \text{ konvergiert absolut} \\ q = 1 & \Rightarrow \text{keine Aussage} \\ q > 1 & \Rightarrow \sum_{n=1}^\infty a_n \text{ divergiert} \end{cases}$$

5.3.1.3 Leibnizkriterium

Wenn gilt:

- $(a_n)$  ist alternierende Folge, d.h die Vorzeichen wechseln jedes Mal
- $a_n \rightarrow 0$  oder  $|a_n| \rightarrow 0$
- $(|a_n|)$  ist monoton fallend

$\dots$  dann konvergiert  $\sum_{n=1}^\infty a_n$

5.3.1.4 Majorantenkriterium

Ist  $|a_n| \leq b_n$  und  $\sum_{n=1}^\infty b_n$  konvergent, so konvergiert  $\sum_{n=1}^\infty a_n$  absolut.

5.3.1.5 Minorantenkriterium

Ist  $a_n \geq b_n \geq 0$  und  $\sum_{n=1}^\infty b_n$  divergent, so divergiert  $\sum_{n=1}^\infty a_n$

5.4 Potenzreihe

Die Potenzreihe hat die allgemeine Form

$$\sum_{n=0}^\infty a_n (x - x_0)^n$$

$x_0$  ist der Entwicklungspunkt der Potenzreihe und  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  eine beliebige Folge.

5.4.1 Konvergenzradius

Die Berechnung des Konvergenzradius ist für solche Reihen einfacher, da der Faktor  $(x - x_0)$  nicht analysiert werden muss. Entsprechend gilt für den Konvergenzradius  $r$ :  $r = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\|a_n\|}}$  (Wurzelkriterium) bzw.  $r = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$  (Quotientenkriterium).

6 Stetigkeit

6.1 Lipschitz-Stetigkeit

Es existiert eine Konstante  $L \in \mathbb{R}$ , sodass:

$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y| \quad \forall x, y \in \Omega$

*Bemerkung:* Ist  $f'$  **auf  $\Omega$  beschränkt**, so ist  $f$  Lipschitz-stetig. Lipschitz-Stetigkeit impliziert gleichmässige Stetigkeit.

6.2 Weierstrass-Kriterium

Für alle  $\varepsilon > 0$  gibt es ein  $\delta(\varepsilon, a) > 0$ , sodass für alle  $|x - a| < \delta$  gilt:

$|f(x) - f(a)| < \varepsilon$

6.3 Gleichmässige Stetigkeit

Für alle  $\varepsilon > 0$  gibt es ein  $\delta(\varepsilon) > 0$ , sodass für alle  $|x - y| < \delta$  gilt:

$|f(x) - f(y)| < \varepsilon$

*Bemerkung:* Ist  $f$  **stetig und kompakt**, dann ist sie auch gleichmässig stetig.

6.4 Punktweise Konvergenz

$f_n(x)$  konvergiert punktweise falls:

$\forall x \in \Omega \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$

6.5 Gleichmässige Konvergenz

6.5.0.1 Grundsatz:

Falls eine Folge stetiger Funktionen  $f_n$  gleichmässig gegen  $f$  konvergiert, muss  $f$  stetig sein.

$f_n(x)$  konvergiert gleichmässig falls:

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup |f_n(x) - f(x)| = 0$

*Bemerkung:* Gleichmässige Konvergenz impliziert punktweise Konvergenz.  
Rezept für gleichmässige Konvergenz

(i) Punktwaiser Limes berechnen

$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x) \quad = \text{Grenzfunktion}$

(ii) Supremum bestimmen  
(Ableitung von  $f_n(x)$  oder Abschätzung benutzen)

$\sup |f_n(x) - f(x)|$

(iii) Limes  $n \rightarrow \infty$  bestimmen (vgl. Limesn glm. Konvergenz)

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup |f_n(x) - f(x)|$

Limes  $= 0 \rightarrow$  Glm. konvergent mit Grenzfunktion  $f(x)$

(iv) Indirekte Methode

- $f(x)$  unstetig auf  $\Omega \Rightarrow$  keine glm. Konvergenz
- $f(x)$  stetig,  $f_n(x) \leq f_{n+1}(x) \forall x \in \Omega$  und  $\Omega$  kompakt  $\Rightarrow$  Glm. Konvergenz

gegeben:  $f_n : [0, 1] \mapsto \mathbb{R}, f_n(x) = (1 - x^2)x^n$

**punktweisen Limes berechnen:**  $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - x^2)x^n = 0 \equiv f(x)$   
 $\Rightarrow$  konvergiert gegen 0

Supremum berechnen:  $\sup_{x \in [0,1]} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in [0,1]} |f_n(x)| = \sup_{x \in [0,1]} x^n$

Maximum finden:  $\frac{d}{dx} f_n(x) n x^{n-1} (1 - x^2) - 2 x x^n = x^{n-1} (n - (n + 2) x^2)$   
 $\Rightarrow x_1 = 0, x_2 = \sqrt{\frac{n}{n + 2}} \Rightarrow x_2$  ist Maximum

**Limes berechnen:**  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [0,1]} |f_n(x) - f(x)| = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_2) = 0$

**Folgerung:**  $f_n$  konvergiert auf  $[0, 1]$  glm. gegen  $f$

7 Differenzialrechnung

Eine stetige Funktion ist differenzierbar, falls der Grenzwert  $f'(x_0)$  existiert:

$f'(x_0) := \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$

Tangente

Sei  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  an der Stelle  $x_0 \in \Omega$  diffbar. Dann ist die Tangente im Punkt  $x_0$

$t(x; x_0) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$

7.1 Umkehrsatz

$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$

7.2 Mittelwertsatz

$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

7.3 Taylorpolynom

Das Taylorpolynom  $m$ -ter Ordnung von  $f(x)$  an der Stelle  $x = a$

$P_m^a(x) := f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{1}{2} f''(a)(x - a)^2 + \dots + \frac{1}{m!} f^{(m)}(a)(x - a)^m$

mit dem Fehlerterm  $R_m^a(x)$ , wobei  $\xi$  zwischen  $a$  und  $b$  liegt:

$R_m^a(x) = \frac{f^{(m+1)}(\xi)}{(m + 1)!} (x + a)^{m+1}$ , wobei  $f(x) = P_m^a(x) + R_m^a(x)$

7.4 Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung

$f(x) = \int_l^{m(x)} g(t) dt$

$f'(x) = g(m(x)) \cdot \frac{d}{dx} m(x)$

wobei  $m(x)$  der Form  $ax^b$  ist mit  $l \in \mathbb{R}$

Differenzial / Jaccobi-Matrix

$df = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}$

$\rightarrow$  enthält die  $n$  part. Ableit. aller  $m$  Komponenten von  $f$

Taylorentwicklung mit mehreren Variabeln

$f(x, y) = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial f}{\partial y} \Delta y + \frac{1}{2!} \left( \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} (\Delta x)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \Delta x \Delta y + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} (\Delta y)^2 \right) + \frac{1}{3!} \left( \frac{\partial^3 f}{\partial x^3} (\Delta x)^3 + 3 \frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y} (\Delta x)^2 \Delta y + 3 \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2} \Delta x (\Delta y)^2 + \frac{\partial^3 f}{\partial y^3} (\Delta y)^3 \right) + \dots$

8 Integration

8.1 Elementare Integrale

$f'(x)$	$f(x)$	$F(x)$
$\frac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{g(x)^2}$	$\frac{f(x)}{g(x)}$	
0	$c$	$cx$
$r \cdot x^{r-1}$	$x^r$	$\frac{x^{r+1}}{r+1}$
$-\frac{1}{x^2} = -x^{-2}$	$\frac{1}{x} = x^{-1}$	$\ln x $
$\frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}$	$\sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$	$\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}$
$\cos(x)$	$\sin(x)$	$-\cos(x)$
$-\sin(x)$	$\cos(x)$	$\sin(x)$
$1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$	$\tan(x)$	$-\ln \cos(x) $
$e^x$	$e^x$	$e^x$
$c \cdot e^{cx}$	$e^{cx}$	$\frac{1}{c} \cdot e^{cx}$
$\ln(c) \cdot c^x$	$c^x$	$\frac{c^x}{\ln(c)}$
$\frac{1}{x}$	$\ln x $	$x(\ln x  - 1)$
$\frac{1}{\ln(a) \cdot x}$	$\log_a x $	$\frac{x}{\ln(a)}(\ln x  - 1)$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin(x)$	$x \cdot \arcsin(x) + \sqrt{1-x^2}$
$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arccos(x)$	$x \cdot \arccos(x) - \sqrt{1-x^2}$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan(x)$	$x \cdot \arctan(x) - \frac{1}{2} \ln(1+x^2)$
$\cosh(x)$	$\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$	$\cosh(x)$
$\sinh(x)$	$\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$	$\sinh(x)$
$\frac{1}{\cosh^2(x)}$	$\tanh(x)$	$\log(\cosh(x))$

8.2 Regeln

Direkter Integral	$\int f(g(x))g'(x) \, dx = F(g(x))$
Partielle Integration	$\int f' \cdot g \, dx = f \cdot g - \int f \cdot g' \, dx$
mit Polynomen	$\int \frac{p(x)}{q(x)} \, dx \Rightarrow$ Partialbruchzerlegung
Substitution	$\int_a^b f(\varphi(t))\varphi'(t) \, dt = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x) \, dx$ mit $x = \varphi(t)$

8.3 Tipps

$$\begin{aligned}\int \tan x \, dx &= \int \frac{\sin x}{\cos x} \, dx = -\log |\cos(x)| \\ \int \frac{1}{x-\alpha} \, dx &= \log(x-\alpha) \\ \int \frac{\frac{1}{\alpha}}{1+(\frac{x}{\alpha})^2} \, dx &= \arctan(x) \\ \int \sin^2(x) \, dx &= \frac{1}{2}(x - \sin(x)\cos(x)) + C \\ \int \cos^2(x) \, dx &= \frac{1}{2}(x + \sin(x)\cos(x)) + C \\ \int \sqrt{x^2+1} \, dx &= \sinh(x) + C\end{aligned}$$

8.4 Uneigentliche Integrale

$$\begin{aligned}\int_0^\infty f(x) \, dx &= \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R f(x) \, dx \\ \int_{-\infty}^\infty f(x) \, dx &= \lim_{R \rightarrow -\infty} \int_R^k f(x) \, dx + \lim_{R \rightarrow \infty} \int_k^R f(x) \, dx\end{aligned}$$

Gibt es eine Unstetigkeitsstelle  $c$  in dem Integrationsgebiet, so geht man wie folgt vor:

$$\int_a^b f(x) \, dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_a^{c-\varepsilon} f(x) \, dx + \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{c+\varepsilon}^b f(x) \, dx$$

8.5 Beweis bijektiver Funktionen

Zu beweisen sind folgende Eigenschaften:

- injektiv:** Zeig, dass  $f$  **strikt monoton wächst oder fällt** und **stetig** ist
- surjektiv:** Zeig, dass alle Werte im Bildbereich angenommen werden (vl. mit Zwischenwertsatz)

Daraus folgt dann, dass  $f$  bijektiv ist.

9 Differentialgleichungen

9.1 Grundbegriffe

- Ordnung:** höchste vorkommende Ableitung
- linear:** alle  $y$ -abhängigen Terme kommen linear vor (keine Terme wie zum Beispiel  $y^2$ ,  $(y'')^3$ ,  $\sin(y)$ ,  $e^{y'}$ )
- homogen:** Gleichung ohne Störfunktionen
- Störfunktion:** Term, der rein von den Funktionsvariablen  $x$  abhängt

9.2 Methoden

	Problem	Anforderungen
Trennung der Variablen	$y' = \frac{dy}{dx} = h(x) \cdot g(y)$	1. Ordnung
Variation der Konstanten	$y' = \frac{dy}{dx} = h(x)y + b(x)$	1. Ordnung inhomogen
Euler-Ansatz	$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_0 y = 0$	n. Ordnung linear homogen
Direkter Ansatz	$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_0 y = b(x)$	n. Ordnung linear inhomogen

9.2.1 Trennung der Variable

- $y' + x \tan y = 0, \quad y(0) = \frac{\pi}{2}$   
umformen  $\frac{dy}{dx} = -x \tan y$   
**konstante Lösungen**  $y(x) \equiv 0$  erfüllt jedoch  $y(0) \equiv \frac{\pi}{2}$  nicht  
Trennung  $\frac{dy}{\tan y} = -x dx$   
integrieren  $\int \frac{\cos y}{\sin y} dy = - \int x dx \Rightarrow \log |\sin y| = -\frac{x^2}{2} + C$   
 $\Rightarrow |\sin y| = e^C e^{-\frac{x^2}{2}} \Rightarrow \sin y = \pm e^C e^{-\frac{x^2}{2}} = C e^{-\frac{x^2}{2}}$   
Anfangsbedingung gebrauchen  $\sin(y(0)) = \sin(\frac{\pi}{2}) = 1 \Rightarrow C = 1$   
**Lösung**  $y(x) = \arcsin(e^{-\frac{x^2}{2}})$

9.2.2 Variation der Konstanten

- Grundsatz:**  $y(x) = y_h(x) + y_p(x)$   
 $y'(x+1) + y = x^3, \quad y(0) = \sqrt{5}$   
Trennung  $\frac{y'}{y} = \frac{-1}{x+1}$   
**konstante Lösungen**  $y(x) \equiv 0$  erfüllt jedoch  $y(0) \equiv \sqrt{5}$  nicht  
integrieren  $\int \frac{dy}{y} = - \int \frac{dx}{x+1}$   
 $\Rightarrow \ln |y| = -\ln |x+1| + C$   
**Homogene Lösung**  $y_h(x) = \frac{C}{x+1}$ , mit  $C = \pm e^C \in \mathbb{R} \setminus 0$   
partikulärer Ansatz  $y_p(x) = \frac{C(x)}{x+1}$   
einsetzen  $(\frac{C'(x)}{x+1} - \frac{C(x)}{(x+1)^2})(x+1) + \frac{C(x)}{x+1} = x^3$   
 $C'(x) = x^3$   
 $C(x) = \frac{x^4}{4}$   
**partikuläre Lösung**  $y_p(x) = \frac{x^4}{4(x+1)}$   
allgemeine Lösung  $y(x) = y_h(x) + y_p(x) = \frac{C}{x+1} + \frac{x^4}{4(x+1)}$   
Anfangsbedingung benutzen  $y(0) = \sqrt{5} \Rightarrow C = \sqrt{5}$   
**Lösung**  $y(x) = \frac{\sqrt{5}}{x+1} + \frac{x^4}{4(x+1)}$

9.2.3 Euler-Ansatz

- $y'' - 2y' - 8y = 0, \quad y(1) = 1, y'(1) = 0$   
Euler-Ansatz  $y(x) = e^{\lambda x}$   
einsetzen  $\lambda^2 e^{\lambda x} - 2\lambda e^{\lambda x} - 8e^{\lambda x} = 0$   
**charakt. Polynom**  $\lambda^2 - 2\lambda - 8 = (\lambda - 4)(\lambda + 2) = 0$   
Nullstellen  $4, -2$   
**allgemeine Lösung**  $y(x) = Ae^{4x} + Be^{-2x}$   
Anfangsbedingung gebrauchen  $y(1) = Ae^4 + Be^{-2} = 1$ ,  
 $y'(1) = 4Ae^4 - 2Be^{-2} = 0$   
 $\Rightarrow A = \frac{1}{3}e^{-4}, B = \frac{2}{3}e^2$   
**Lösung**  $y(x) = \frac{1}{3}e^{4x-4} + \frac{2}{3}e^{2-2x}$

*Bemerkung:* Zu einer  $m$ -fachen Nullstelle  $\lambda$  gehören die  $m$  linear unabhängigen Lösungen  $e^{\lambda x}, x \cdot e^{\lambda x}, \dots, x^{m-1} \cdot e^{\lambda x}$ . Zur  $m$ -fachen Nullstelle  $\lambda = 0$  gehören die Lösungen  $1, x, \dots, x^{m-1}$ .

*Komplexe Nullstellen:*

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Ein komplexes Nullstellenpaar der Form  $\alpha \pm \beta i$  liefert folgende homogene Lösung:

$$y(x) = e^{\alpha x} (C_1 \cos(\beta x) + C_2 \sin(\beta x))$$

## 9.2.4 Direkter Ansatz

**Grundsatz:**  $y(x) = y_{\text{homo}}(x) + y_p(x)$

Inhomogener Term $b(x)$	Ansatz für $y_p(x)$	zu bestimmen
Polynom	$Ax^2 + Bx + C$	$A, B, C$
$ce^{kx}$	$Ae^{kx}$	$A$
$c \sin(kx)$ oder $c \cos(kx)$	$A \sin(kx) + B \cos(kx)$	$A, B$

*Bemerkung:* Kommt der gewählte Ansatz schon in der homogenen Lösung vor, so multipliziert man den Ansatz einfach mit  $x$ .

$$y'' - y' + \frac{1}{4}y = \cos(x)$$

homogener Ansatz  $y'' + y' + \frac{1}{4}y = 0$

Euler-Ansatz anwenden  $\lambda^2 + \lambda + \frac{1}{4} = (\lambda + \frac{1}{2})^2 = 0$

**homogene Lösung**  $\Rightarrow y_{\text{homo}}(x) = Ae^{-\frac{x}{2}} + Bx \cdot e^{-\frac{x}{2}}$

partikulärer Ansatz wählen  $y_p(x) = a \cos(x) + b \sin(x)$   
 $\Rightarrow y'_p(x) = -a \sin(x) + b \cos(x), y''_p(x) = -a \cos(x) - b \sin(x)$

Einsetzen  $(-a + b + \frac{a}{4}) \cos(x) + (-b - a + \frac{1}{4}b) \sin(x) = \cos(x)$

Koeffizientenvergleich  $-\frac{3}{4}a + b = 1, -a - \frac{3}{4}b = 0$

**partikuläre Lösung**  $y_p(x) = -\frac{12}{25} \cos(x) + \frac{16}{25} \sin(x)$

**Lösung**  $y(x) = Ae^{-\frac{x}{2}} + Bx \cdot e^{-\frac{x}{2}} - \frac{12}{25} \cos(x) + \frac{16}{25} \sin(x)$

## 10 Vollständige Induktion

Grundlegende Struktur um die Aussage  $A(n)$  zu beweisen:

- 1. Induktionsanfang/Verankerung:** Die Aussage wird für  $n = A$  bewiesen.  $A$  ist dabei meistens der erste Wert für die gegebene Eingabemenge. Der Beweis wird meist durch direktes ausrechnen gemacht.
- 2. Annahme/Induktionsvoraussetzung:** Hier schreibt man, dass man davon ausgeht die Aussage sei gültig (damit man sie im nächsten Schritt) einsetzen kann. Man kopiert also im Grunde, was man zu beweisen hat mit einigen Zierwörter.
- 3. Induktionsschritt:** Für jedes  $n \geq A$  wird unter Benutzung der Aussage  $A(n)$  die Aussage  $A(n+1)$  bewiesen. Dazu wird die Induktionsannahme verwendet.

### 10.1 Beispiel

Es ist zu beweisen, dass für jedes  $n \in \mathbb{N}$  folgendes gilt:  $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

Lemma:  $\forall n \in \mathbb{N}. 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

Beweis:

Sei  $P(n) \equiv 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ .

Wir zeigen  $\forall n \in \mathbb{N}. P(n)$  mit vollständiger Induktion.

Induktionsanfang: Zeige  $P(0)$ .

$$0 = \frac{0(0+1)}{2}$$

Induktionsschritt:

Sei  $n \in \mathbb{N}$  beliebig und nehmen wir  $P(n)$  an (Induktionsvoraussetzung).

Zeige  $P(n+1)$  (Induktionsbehauptung).

$$\begin{aligned} 1 + 2 + 3 + \dots + n + (n+1) &= \\ &= \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) \text{--- P(n) Induktionsvor.} \\ &= \frac{n(n+1)}{2} + \frac{2(n+1)}{2} \text{---arith} \\ &= \frac{(n+1) * ((n+1) + 1)}{2} \text{---arith} \end{aligned}$$

qed.

## 11 Zwischenwertsatz

Sei  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  eine stetige reelle Funktion, die auf einem Intervall definiert ist. Dann existiert zu jedem  $u \in [f(a), f(b)]$  (falls  $f(a) \leq f(b)$ , sonst  $u \in [f(b), f(a)]$ ) ein  $c \in [a, b]$ , sodass gilt:  $f(c) = u$ .

### 11.1 Beispiel (Fixpunkt)

Sei  $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ . Zeige:  $f$  hat einen Fixpunkt, d.h. es gibt ein  $x \in [0, 1]$  derart, dass  $f(x) = x$ .

Man erzeugt die Funktion  $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, g(x) := f(x) - x$ . Es gilt:  $f(x) = x \Leftrightarrow g(x) = 0$ , d.h. ein Punkt  $x$  ist genau dann ein Fixpunkt von  $f$  wenn er eine Nullstelle von  $g$  ist. Es ist zu zeigen, dass  $g$  immer eine Nullstelle auf  $[0, 1]$  hat. Als Differenz von zwei stetigen Funktionen ist  $g$  stetig. Weil ausserdem  $f(x) \in [0, 1] \forall x \in [0, 1]$  gilt, ist  $g(0) \geq 0 \geq g(1)$ . Da  $g$  stetig ist, gibt es daher nach dem Zwischenwertsatz ein  $x \in [0, 1]$  mit  $g(x) = 0$  und somit gibt es  $f(x) = x$ .

## Teil II

# Trigonometrie

## 12 Definitionen & Sätze

### 12.1 Definitionen

(1)  $\sin(x) := \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \frac{x}{1!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} \mp \dots$

(2)  $\cos(x) := \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} = \frac{x^0}{0!} - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} \mp \dots$

(3)  $\exp(x) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{x}{n})^n$

(4)  $\arctan(x) := \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = \frac{x}{1} - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} \mp \dots$

Hinweis: Für einfache Approximation genügt es die ersten paar Glieder der  $\arctan(x)$  Reihe zu berechnen.

Falls:  $x \notin [0, 1]$ , gibt es eine Vereinfachung:  $\arctan(x) = \frac{\text{sgn}(x) * \pi}{2} - \arctan(\frac{1}{x})$

### 12.1.1 Definition Taylorreihe

Eine Funktion  $f(x)$  wird an einer Stelle  $x_0$  angenähert durch  $Tf(x; x_0) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n = f(x_0)$

### 12.1.2 Definitionen csc(x), sec(x), cot(x)

$$\csc(x) := \frac{1}{\sin(x)}$$

$$\sec(x) := \frac{1}{\cos(x)}$$

$$\cot(x) := \frac{1}{\tan(x)} = \frac{\cos(x)}{\sin(x)}$$

### 12.2 Sinussatz




Abbildung 1: Quelle: <https://de.wikipedia.org/>

### 12.3 Cosinussatz

$$a^2 + b^2 - 2ab * \cos(\gamma) = c^2$$

## 13 Standardintegrale

$$\frac{d}{dx} \arcsin(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\frac{d}{dx} \arccos(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\frac{d}{dx} \arctan(x) = \frac{1}{x^2+1}$$

$$\frac{d}{dx}ar\sinh(x)=\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$$

$$\frac{d}{dx}arcosh(x)=\frac{1}{\sqrt{x^2-1}},\text{wenn }x>1$$

$$\frac{d}{dx}artanh(x)=\frac{1}{1-x^2},\text{wenn }|x|<1$$

## 14 Euler Formel

$$\begin{aligned}exp(i\varphi) &= \cos(\varphi) + i\sin(\varphi) \\exp(-i\varphi) &= \cos(-\varphi) + i\sin(-\varphi) \iff exp(-i\varphi) = \cos(\varphi) - i\sin(\varphi)\end{aligned}$$

Daraus kann nun sin, sinh, cos und cosh in Termen von exp(x) ausgedrückt werden.

$$\begin{aligned}\frac{exp(i\varphi)+exp(-i\varphi)}{2} &= \cos(\varphi) \\ \frac{exp(i\varphi)-exp(-i\varphi)}{2i} &= \sin(\varphi)\end{aligned}$$

Ignoriere alle i, dann folgt...

$$\begin{aligned}\frac{exp(\varphi)+exp(-\varphi)}{2} &= \cosh(\varphi) \\ \frac{exp(\varphi)-exp(-\varphi)}{2} &= \sinh(\varphi)\end{aligned}$$

## 15 Ableitungen, Integrale

### 15.1 Ableitungen

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\sin(x) &= \cos(x) \\ \frac{d}{dx}\cos(x) &= -\sin(x) \\ \frac{d}{dx}\tan(x) &= \frac{d}{dx}\frac{\sin(x)}{\cos(x)} = \frac{\cos(x)\cos(x)-\sin(x)\sin(x)}{\cos^2(x)} = 1 - \frac{\sin^2(x)}{\cos^2(x)} = 1 - \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)} \\ \frac{d}{dx}\frac{1}{\sin(x)} &= \frac{0*\sin(x)-1*\cos(x)}{\sin^2(x)} = \frac{-\cos(x)}{\sin^2(x)} \\ \frac{d}{dx}\frac{1}{\cos(x)} &= \frac{0*\cos(x)-1*(-\sin(x))}{\cos^2(x)} = \frac{\sin(x)}{\cos^2(x)} \\ \frac{d}{dx}\sin^2(x) &= \sin(x)*\cos(x) + \cos(x)*\sin(x) = 2*\sin(x)*\cos(x) \\ \frac{d}{dx}\cos^2(x) &= \cos(x)*(-\sin(x)) + (-\sin(x))*\cos(x) = -2*\sin(x)*\cos(x)\end{aligned}$$

## 16 Rechenregeln

### 16.1 Additionstheoreme

$$\begin{aligned}\sin^2(x) + \cos^2(x) &= 1 \\ \sin(x \pm y) &= \sin(x)\cos(y) \pm \cos(x)\sin(y) \quad (\text{\#umgekehrteAbleitungsregel}) \\ \cos(x \pm y) &= \cos(x)\cos(y) \mp \sin(x)\sin(y) \\ \tan(x \pm y) &= \frac{\tan(x) \pm \tan(y)}{1 \mp \tan(x)\tan(y)} = \frac{\sin(x \pm y)}{\cos(x \pm y)}\end{aligned}$$

### 16.2 Doppelwinkel

$$\begin{aligned}\sin(2x) &= 2\sin(x)\cos(x) = \frac{2\tan(x)}{1+\tan^2(x)} \\ \cos(2x) &= \cos^2(x) - \sin^2(x) = 1 - 2\sin^2(x) = 2\cos^2(x) - 1 = \frac{1-\tan^2(x)}{1+\tan^2(x)} \\ \tan(2x) &= \frac{2\tan(x)}{1-\tan^2(x)} = \frac{2}{\cot(x)-\tan(x)} \\ \cot(2x) &= \frac{\cot^2(x)-1}{2\cot(x)} = \frac{\cot(x)-\tan(x)}{2}\end{aligned}$$

Beweis mit Additionstheorem

### 16.3 Produkt-zu-Summen-Formel

$$\begin{aligned}\sin(x)*\sin(y) &= \frac{1}{2}(\cos(x-y) - \cos(x+y)) \\ \cos(x)*\cos(y) &= \frac{1}{2}(\cos(x-y) + \cos(x+y)) \\ \sin(x)*\cos(y) &= \frac{1}{2}(\sin(x-y) + \sin(x+y))\end{aligned}$$

### 16.4 Hyperbolische Funktionen

$$\begin{aligned}\sinh(z) &:= \frac{e^z - e^{-z}}{2} = z + \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} + \frac{z^7}{7!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} \\ \cosh(z) &:= \frac{e^z + e^{-z}}{2} = 1 + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} + \frac{z^6}{6!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n}}{(2n)!}\end{aligned}$$

### 16.5 Additionstheoreme

$$\begin{aligned}\sinh(z_1 \pm z_2) &= \sinh(z_1) \cdot \cosh(z_2) \pm \sinh(z_2) \cdot \cosh(z_1) \\ \cosh(z_1 \pm z_2) &= \cosh(z_1) \cdot \cosh(z_2) \pm \sinh(z_1) \cdot \sinh(z_2) \\ \tanh(z_1 \pm z_2) &= \frac{\tanh(z_1) \pm \tanh(z_2)}{1 \pm \tanh(z_1) \cdot \tanh(z_2)}\end{aligned}$$

#### 16.5.1 Zusammenhänge

$$\begin{aligned}\cosh^2(z) - \sinh^2(z) &= 1 \\ \cosh(z) + \sinh(z) &= e^z \\ \cosh(z) - \sinh(z) &= e^{-z}\end{aligned}$$

### 16.6 Ableitungen

$$\begin{aligned}\frac{d}{dz}\sinh(z) &= \cosh(z) \\ \frac{d}{dz}\cosh(z) &= \sinh(z) \\ \frac{d}{dz}\tanh(z) &= 1 - \tanh^2(z) = \frac{1}{\cosh^2(z)}\end{aligned}$$

## 17 Koordinatensysteme mit Funktionaldeterminante

### 17.1 Polarkoordinaten




Abbildung 2: Quelle: <https://de.wikipedia.org/>

Umrechnung erfolgt durch:

$$\begin{aligned}x &= r \cos \varphi \\ y &= r \sin \varphi\end{aligned}$$

Aus den Umrechnungsformeln von Polarkoordinaten in kartesische Koordinaten erhält man für die Funktionaldeterminante als Determinante der Jacobi-Matrix:

$$\det J = \det \frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\varphi)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \varphi} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \varphi & -r \sin \varphi \\ \sin \varphi & r \cos \varphi \end{vmatrix} = r \cos^2 \varphi + r \sin^2 \varphi = r$$

### 17.2 Zylinderkoordinaten




Abbildung 3: Quelle: <https://de.wikipedia.org/>

Umrechnung erfolgt durch:

$$\begin{aligned}x &= \rho \cos \varphi \\ y &= \rho \sin \varphi \\ z &= z\end{aligned}$$

$$\text{Mit Funktionaldeterminante: } \det \frac{\partial(x,y,z)}{\partial(\rho,\varphi,z)} = \begin{vmatrix} \cos \varphi & -\rho \sin \varphi & 0 \\ \sin \varphi & \rho \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \rho$$

### 17.3 Kugelkoordinaten




Abbildung 4: Quelle: <https://de.wikipedia.org/>

Umrechnung erfolgt durch:

$$\begin{aligned}x &= r \cdot \sin \theta \cdot \cos \varphi \\ y &= r \cdot \sin \theta \cdot \sin \varphi \\ z &= r \cdot \cos \theta\end{aligned}$$

Jacobi-Matrix:

$$J = \frac{\partial(x,y,z)}{\partial(r,\theta,\varphi)} = \begin{pmatrix} \sin \theta \cos \varphi & r \cos \theta \cos \varphi & -r \sin \theta \sin \varphi \\ \sin \theta \sin \varphi & r \cos \theta \sin \varphi & r \sin \theta \cos \varphi \\ \cos \theta & -r \sin \theta & 0 \end{pmatrix}$$

mit Funktionaldeterminante:  $\det J = r^2 \sin \theta$

## 18 Rotationsmatrix, Drehmatrix

### 18.1 Drehmatrix der Ebene

Jede Rotation um den Ursprung ist eine lineare Abbildung. Wie bei jeder linearen Abbildung genügt daher zur Festlegung der Gesamtabbildung die Festlegung der Bilder der Elemente einer beliebigen Basis. Wird die Standardbasis gewählt, sind die Bilder der Basisvektoren gerade die Spalten der dazugehörigen Abbildungsmatrix.

Wir haben unter  $R_\alpha$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$$

Die Drehmatrix für eine Drehung um  $\alpha$  ist also:


$$R_\alpha = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

### 18.1.1 Herleitung

Herleitung Drehmatrix

Gesucht: Matrix welche Vektoren, Basen um Winkel  $\alpha$  dreht.



$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix} \quad \rightsquigarrow \quad \begin{matrix} \cos(\alpha) = \frac{x}{r} \\ \sin(\alpha) = \frac{y}{r} \end{matrix}$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix} \quad \rightsquigarrow \quad \begin{matrix} -\sin(\alpha) \\ \cos(\alpha) \end{matrix} \rightarrow \text{C) kommt von } \sin \alpha = \frac{y}{r} \text{ mit } \sin(\alpha) = -x/r \text{ und } r = 1 \text{ (Einheitskreis)}$$

Daraus ergibt sich Drehmatrix  $R_\alpha$ .

$$R_\alpha = \begin{pmatrix} \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) \\ \sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{pmatrix} \quad \text{spalten entspr. neuer Basisvektoren}$$

Die Menge aller Drehmatrizen eines Raumes bildet eine Drehgruppe, die "special orthogonal group":

$$SO(n) = \{ \text{lin. Abb. } R: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \mid R^T R = I, \det R = 1 \}$$

Abbildung 5: Quelle: Miles Strässle, 20.11.2019

### 18.2 Drehmatrix in 3-Dimensionen

In der Physik werden häufig Drehungen des Koordinatensystems benutzt, dann müssen bei den untenstehenden Matrizen die Vorzeichen aller Sinus-Einträge vertauscht werden. Die Drehung eines Vektors um einen bestimmten Winkel in einem Koordinatensystem ist äquivalent zur Drehung des Koordinatensystems um den gleichen Winkel in umgekehrter Richtung (Drehung um negativen Winkel). „Der

Drehsinn ergibt sich, wenn man entgegen der positiven Drehachse auf den Ursprung sieht.“

#### 18.2.1 Drehung um die x-Achse:

$$R_x(\alpha) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$$

#### 18.2.2 Drehung um die y-Achse:






$$R_y(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos \alpha & 0 & \sin \alpha \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \alpha & 0 & \cos \alpha \end{pmatrix}$$

#### 18.2.3 Drehung um die z-Achse:

$$R_z(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

## 19 Plots Trigonometrischer Funktionen

Alle Plots in diesem Kapitel von [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)!



## 20 Nützliches




Abbildung 6: Quelle: youtube, 3blue1brown






Abbildung 7: Quelle: <https://www.pinterest.com/pin/68735321805/>