

特应性皮炎临床试验设计比较

设计图谱 · 人群入排 · 干预终点 · 访视统计 · 多路径

适应症：特应性皮炎

数据截止：2026年7月31日

目录

按阅读顺序列出本报告各章节。

总览

- 封面
- 目录
- 首页摘要

试验设计

- 设计图谱

人群与标准

- 人群与疾病定义
- 入选标准
- 排除标准

干预与终点

- 分组、干预与对照
- 终点、定义与时间点
- 访视、疗程与随访

分析与判断

- 样本量、分析集与统计设计
- 逐试验详情
- 设计模式、权衡与可选路径
- 资料版本与局限

首页摘要

以下仅汇总本锁定快照中已披露、对比较解读最关键的观察；缺失项在正文完整保留为“未公开”。

- 主要终点评估时间点集中在第16周，跨试验比较时需同时阅读各自终点定义与量表。
- 纳入试验均为随机平行分组设计；盲法安排存在三盲与四盲差异，完整表保留原文。
- 分析人群在登记中未单独披露，正文完整表保留“未公开”，不按常规做法推断。
- 差异：目标人群上，NCT03985943为成人与青少年；年龄≥12岁；NCT05149313为青少年与成人；年龄≥12岁。
- 异常点：NCT02260986在目标人群上为成人入组；慢性病程至少3年，此为事实差异标记，不表示优劣判断。
- 模式：随机与盲法在NCT03985943、NCT04178967、NCT05149313呈现相近安排——四盲、平行分组。
- 候选设计路径并列：以 EASI 改善作为主要终点路径；以 IGA 达到清除或几乎清除作为主要终点路径。不作排名或唯一推荐。

关键已披露结果一览

产品	登记号	主要终点/量表	评估时间点	样本量	分析人群
度普利尤单抗	NCT02260986	IGA	第16周	740 例	未公开
Lebrikizumab	NCT04178967	IGA	第16周	445 例	未公开
奈莫利珠单抗	NCT03985943	IGA	第16周	941 例	未公开
Lebrikizumab	NCT05149313	EASI	第16周	331 例	未公开

设计图谱

展示试验角色、阶段、地区、随机与盲法、组别、疗程和随访全景；不截断证据稀疏试验。

设计关系覆盖图									
	人群与标准	分组设计	干预与对照	给药与疗程	终点定义	评估时间点	访视与随访	样本量	统计分析
NCT02260986	有	有	有	有	有	有	有	有	未
NCT04178967	有	有	有	有	有	有	有	有	未
NCT03985943	有	有	有	有	有	有	有	有	未
NCT05149313	有	有	有	有	有	有	有	有	未

设计图谱完整表

产品	登记号	试验	设计要素	内容	时间点	量表	披露
度普利尤单抗	NCT02260986	CHRONOS	主要终点定义	第16周IGA评分达到0或1分且较基线下降≥2分的受试者比例	第16周	IGA	已报告数值
度普利尤单抗	NCT02260986	CHRONOS	随机与盲法	三盲、平行分组	未公开	不适用	已报告数值
度普利尤单抗	NCT02260986	CHRONOS	访视与随访	度普利尤单抗联合外用糖皮质激素治疗至第16周，并进行长期安全性随访	第16周；长期安全性随访	不适用	已报告数值
度普利尤单抗	NCT02260986	CHRONOS	目标人群	成人入组；慢性病程至少3年	筛选期	不适用	已报告数值
度普利尤单抗	NCT02260986	CHRONOS	计划或实际样本量	740 例	未公开	不适用	已报告数值
度普利尤单抗	NCT02260986	CHRONOS	主要终点时间点	基线至第16周	第16周	不适用	已报告数值
度普利尤单抗	NCT02260986	CHRONOS	对照干预	安慰剂，每周1次	未公开	不适用	已报告数值

续表 · 设计图谱完整表

产品	登记号	试验	设计要素	内容	时间点	量表	披露
度普利尤单抗	NCT02260986	CHRONOS	给药方案	每2周给药；治疗期至第51周	第1周至第51周	不适用	已报告数值
度普利尤单抗	NCT02260986	CHRONOS	试验组干预	度普利尤单抗300 mg，每2周1次	未公开	不适用	已报告数值
Lebrikizumab	NCT04178967	ADvocate2	主要终点定义	第16周IGA评分达到0或1分且较基线下降≥2分的受试者比例	第16周	IGA	已报告数值
Lebrikizumab	NCT04178967	ADvocate2	随机与盲法	四盲、平行分组	未公开	不适用	已报告数值
Lebrikizumab	NCT04178967	ADvocate2	访视与随访	随机、双盲、安慰剂对照、平行分组；诱导期16周，维持期36周，总疗程52周	诱导期第16周；维持期第52周	不适用	已报告数值
Lebrikizumab	NCT04178967	ADvocate2	目标人群	成人与青少年；年龄≥12岁且体重≥40 kg	筛选期	不适用	已报告数值
Lebrikizumab	NCT04178967	ADvocate2	计划或实际样本量	445 例	未公开	不适用	已报告数值
Lebrikizumab	NCT04178967	ADvocate2	主要终点时间点	基线至第16周	第16周	不适用	已报告数值
Lebrikizumab	NCT04178967	ADvocate2	对照干预	安慰剂	未公开	不适用	已报告数值
Lebrikizumab	NCT04178967	ADvocate2	给药方案	诱导期每2周给药；维持期至第52周	基线至第52周	不适用	已报告数值

续表 · 设计图谱完整表

产品	登记号	试验	设计要素	内容	时间点	量表	披露
Lebrikizumab	NCT04178967	ADvocate2	试验组干预	Lebrikizumab，每2周1次	未公开	不适用	已报告数值
Lebrikizumab	NCT05149313	ADvantage	主要终点定义	双盲诱导期第16周达到EASI-75应答的受试者比例	第16周	EASI	已报告数值
Lebrikizumab	NCT05149313	ADvantage	随机与盲法	四盲、平行分组	未公开	不适用	已报告数值
Lebrikizumab	NCT05149313	ADvantage	访视与随访	诱导期接受Lebrikizumab 250 mg每2周1次者，维持期继续同剂量给药	诱导期第16周；维持期第52周	不适用	已报告数值
Lebrikizumab	NCT05149313	ADvantage	目标人群	青少年与成人；年龄≥12岁	知情同意时	不适用	已报告数值
Lebrikizumab	NCT05149313	ADvantage	计划或实际样本量	331 例	未公开	不适用	已报告数值
Lebrikizumab	NCT05149313	ADvantage	主要终点时间点	第16周	第16周	不适用	已报告数值
Lebrikizumab	NCT05149313	ADvantage	对照干预	Lebrikizumab匹配安慰剂	未公开	不适用	已报告数值
Lebrikizumab	NCT05149313	ADvantage	给药方案	诱导期每周2周给药；主要治疗期至第16周	基线至第16周	不适用	已报告数值
Lebrikizumab	NCT05149313	ADvantage	试验组干预	Lebrikizumab	未公开	不适用	已报告数值

续表 · 设计图谱完整表

产品	登记号	试验	设计要素	内容	时间点	量表	披露
奈莫利珠单抗	NCT03985943	奈莫利珠单抗疗效与安全性研究	主要终点定义	ITT人群中IGA达到0或1分且较基线下降≥2分的受试者比例	第16周	IGA	已报告数值
奈莫利珠单抗	NCT03985943	奈莫利珠单抗疗效与安全性研究	随机与盲法	四盲、平行分组	未公开	不适用	已报告数值
奈莫利珠单抗	NCT03985943	奈莫利珠单抗疗效与安全性研究	访视与随访	第16周	第16周	不适用	已报告数值
奈莫利珠单抗	NCT03985943	奈莫利珠单抗疗效与安全性研究	目标人群	成人与青少年；年龄≥12岁	筛选期	不适用	已报告数值
奈莫利珠单抗	NCT03985943	奈莫利珠单抗疗效与安全性研究	计划或实际样本量	941 例	未公开	不适用	已报告数值
奈莫利珠单抗	NCT03985943	奈莫利珠单抗疗效与安全性研究	主要终点时间点	第16周	第16周	不适用	已报告数值
奈莫利珠单抗	NCT03985943	奈莫利珠单抗疗效与安全性研究	对照干预	安慰剂	未公开	不适用	已报告数值
奈莫利珠单抗	NCT03985943	奈莫利珠单抗疗效与安全性研究	给药方案	主要终点评估至第16周	第16周	不适用	已报告数值
奈莫利珠单抗	NCT03985943	奈莫利珠单抗疗效与安全性研究	试验组干预	奈莫利珠单抗	未公开	不适用	已报告数值

人群与疾病定义

比较目标人群、疾病诊断、病程、严重度、既往与背景治疗、年龄和重要合并症规则。

人群与疾病定义完整表

产品	登记号	试验	设计要素	内容	时间点	量表	披露
度普利尤单抗	NCT02260986	CHRONOS	目标人群	成人入组；慢性病程至少3年	筛选期	不适用	已报告数值
Lebrikizumab	NCT04178967	ADvocate2	目标人群	成人与青少年；年龄≥12岁且体重≥40 kg	筛选期	不适用	已报告数值
Lebrikizumab	NCT05149313	ADvantage	目标人群	青少年与成人；年龄≥12岁	知情同意时	不适用	已报告数值
奈莫利珠单抗	NCT03985943	奈莫利珠单抗疗效与安全性研究	目标人群	成人与青少年；年龄≥12岁	筛选期	不适用	已报告数值

入选与排除标准

按试验并列原文、评估时点、量表、运算符、阈值和单位，便于直接定位同一设计要素的差异。

入选标准完整表 · 排除标准完整表

产品	登记号	试验	入选原文	入选条件	排除原文	排除条件
度普利尤单抗	NCT02260986	CHRONOS	筛选访视前特应性皮炎病程至少3年	筛选期；不适用；不适用	既往参加过度普利尤单抗临床试验	筛选期；不适用；不适用
Lebrikizumab	NCT04178967	ADvocate2	基线访视EASI评分≥16分	基线；EASI；≥ 16分	既往接受过度普利尤单抗或曲罗芦单抗治疗	基线前；不适用；不适用
奈莫利珠单抗	NCT03985943	奈莫利珠单抗疗效与安全性研究	筛选及基线访视EASI评分均≥16分	筛选期与基线；EASI；>= 16分	体重<30 kg	筛选期；不适用；< 30 kg
Lebrikizumab	NCT05149313	ADvantage	基线访视EASI评分≥16分	基线；EASI；>= 16分	基线访视前1周内使用外用糖皮质激素	基线前1周；不适用；不适用

分组、干预与对照

比较随机与盲法、治疗组、对照、背景和救援治疗、剂量、给药、疗程与延伸设计。

分组、干预与对照完整表

产品	登记号	试验	设计要素	内容	时间点	量表	披露
度普利尤单抗	NCT02260986	CHRONOS	随机与盲法	三盲、平行分组	未公开	不适用	已报告数值
度普利尤单抗	NCT02260986	CHRONOS	对照干预	安慰剂，每周1次	未公开	不适用	已报告数值
度普利尤单抗	NCT02260986	CHRONOS	给药方案	每2周给药；治疗期至第51周	第1周至第51周	不适用	已报告数值
度普利尤单抗	NCT02260986	CHRONOS	试验组干预	度普利尤单抗300 mg，每2周1次	未公开	不适用	已报告数值
Lebrikizumab	NCT04178967	ADvocate2	随机与盲法	四盲、平行分组	未公开	不适用	已报告数值
Lebrikizumab	NCT04178967	ADvocate2	对照干预	安慰剂	未公开	不适用	已报告数值
Lebrikizumab	NCT04178967	ADvocate2	给药方案	诱导期每2周给药；维持期至第52周	基线至第52周	不适用	已报告数值
Lebrikizumab	NCT04178967	ADvocate2	试验组干预	Lebrikizumab，每2周1次	未公开	不适用	已报告数值

续表 · 分组、干预与对照完整表

产品	登记号	试验	设计要素	内容	时间点	量表	披露
Lebrikizumab	NCT05149313	ADvantage	随机与盲法	四盲、平行分组	未公开	不适用	已报告数值
Lebrikizumab	NCT05149313	ADvantage	对照干预	Lebrikizumab匹配安慰剂	未公开	不适用	已报告数值
Lebrikizumab	NCT05149313	ADvantage	给药方案	诱导期每2周给药；主要治疗期至第16周	基线至第16周	不适用	已报告数值
Lebrikizumab	NCT05149313	ADvantage	试验组干预	Lebrikizumab	未公开	不适用	已报告数值
奈莫利珠单抗	NCT03985943	奈莫利珠单抗疗效与安全性研究	随机与盲法	四盲、平行分组	未公开	不适用	已报告数值
奈莫利珠单抗	NCT03985943	奈莫利珠单抗疗效与安全性研究	对照干预	安慰剂	未公开	不适用	已报告数值
奈莫利珠单抗	NCT03985943	奈莫利珠单抗疗效与安全性研究	给药方案	主要终点评估至第16周	第16周	不适用	已报告数值
奈莫利珠单抗	NCT03985943	奈莫利珠单抗疗效与安全性研究	试验组干预	奈莫利珠单抗	未公开	不适用	已报告数值

终点、定义与时间点

逐试验比较主要和重要次要终点、原始定义、角色、量表、评估时间与分析人群。


度普利尤单抗 NCT02260986 • CHRONOS 主要终点 量表 IGA 评估 第16周 第16周IGA评分达到0或1分且较基线下降≥2分的受试者比例	Lebrikizumab NCT04178967 • ADvocate2 主要终点 量表 IGA 评估 第16周 第16周IGA评分达到0或1分且较基线下降≥2分的受试者比例
Lebrikizumab NCT05149313 • ADvantage 主要终点 量表 EASI 评估 第16周 双盲诱导期第16周达到EASI-75应答的受试者比例	奈莫利珠单抗 NCT03985943 • 奈莫利珠单抗疗效与安全性研究 主要终点 量表 IGA 评估 第16周 ITT人群中IGA达到0或1分且较基线下降≥2分的受试者比例

终点、定义与时间点完整表

产品	登记号	试验	终点	完整定义	评估时间点	量表	终点披露	时间披露
度普利尤单抗	NCT02260986	CHRONOS	主要终点（IGA）	第16周IGA评分达到0或1分且较基线下降≥2分的受试者比例	第16周	IGA	已报告数值	已报告数值
Lebrikizumab	NCT04178967	ADvocate2	主要终点（IGA）	第16周IGA评分达到0或1分且较基线下降≥2分的受试者比例	第16周	IGA	已报告数值	已报告数值
Lebrikizumab	NCT05149313	ADvantage	主要终点（EASI）	双盲诱导期第16周达到EASI-75应答的受试者比例	第16周	EASI	已报告数值	已报告数值
奈莫利珠单抗	NCT03985943	奈莫利珠单抗疗效与安全性研究	主要终点（IGA）	ITT人群中IGA达到0或1分且较基线下降≥2分的受试者比例	第16周	IGA	已报告数值	已报告数值

访视、疗程与随访

比较访视、治疗期、随访和延伸安排；未登记不解释成未实施。



访视、疗程与随访完整表

产品	登记号	试验	设计要素	内容	时间点	量表	披露
度普利尤单抗	NCT02260986	CHRONOS	访视与随访	度普利尤单抗联合外用糖皮质激素治疗至第16周，并进行长期安全性随访	第16周；长期安全性随访	不适用	已报告数值
度普利尤单抗	NCT02260986	CHRONOS	主要终点时间点	基线至第16周	第16周	不适用	已报告数值
度普利尤单抗	NCT02260986	CHRONOS	给药方案	每2周给药；治疗期至第51周	第1周至第51周	不适用	已报告数值
Lebrikizumab	NCT04178967	ADvocate2	访视与随访	随机、双盲、安慰剂对照、平行分组；诱导期16周，维持期36周，总疗程52周	诱导期第16周；维持期第52周	不适用	已报告数值
Lebrikizumab	NCT04178967	ADvocate2	主要终点时间点	基线至第16周	第16周	不适用	已报告数值

续表 · 访视、疗程与随访完整表


产品	登记号	试验	设计要素	内容	时间点	量表	披露
Lebrikizumab	NCT04178967	ADvocate2	给药方案	诱导期每2周给药；维持期至第52周	基线至第52周	不适用	已报告数值
Lebrikizumab	NCT05149313	ADvantage	访视与随访	诱导期接受Lebrikizumab 250 mg每2周1次者，维持期继续同剂量给药	诱导期第16周；维持期第52周	不适用	已报告数值
Lebrikizumab	NCT05149313	ADvantage	主要终点时间点	第16周	第16周	不适用	已报告数值
Lebrikizumab	NCT05149313	ADvantage	给药方案	诱导期每2周给药；主要治疗期至第16周	基线至第16周	不适用	已报告数值
奈莫利珠单抗	NCT03985943	奈莫利珠单抗疗效与安全性研究	访视与随访	第16周	第16周	不适用	已报告数值
奈莫利珠单抗	NCT03985943	奈莫利珠单抗疗效与安全性研究	主要终点时间点	第16周	第16周	不适用	已报告数值
奈莫利珠单抗	NCT03985943	奈莫利珠单抗疗效与安全性研究	给药方案	主要终点评估至第16周	第16周	不适用	已报告数值

样本量、分析集与统计设计

呈现计划或实际样本量以及公开的分析集、主要比较、模型、效应量、多重性和缺失数据处理；未公开不推断。

样本量气泡图

位置仅用于分开展示；不编码疗效、安全性或优劣



图例
A NCT02260986
B NCT04178967
C NCT05149313
D NCT03985943

气泡面积反映计划或实际样本量；分析人群未公开时表内写未公开。

样本量、分析集与统计设计完整表

产品	登记号	试验	设计要素	内容	时间点	量表	披露
度普利尤单抗	NCT02260986	CHRONOS	计划或实际样本量	740 例	未公开	不适用	已报告数值
度普利尤单抗	NCT02260986	CHRONOS	分析人群	未公开	未公开	不适用	未公开
Lebrikizumab	NCT04178967	ADvocate2	计划或实际样本量	445 例	未公开	不适用	已报告数值
Lebrikizumab	NCT04178967	ADvocate2	分析人群	未公开	未公开	不适用	未公开
Lebrikizumab	NCT05149313	ADvantage	计划或实际样本量	331 例	未公开	不适用	已报告数值
Lebrikizumab	NCT05149313	ADvantage	分析人群	未公开	未公开	不适用	未公开
奈莫利珠单抗	NCT03985943	奈莫利珠单抗疗效与安全性研究	计划或实际样本量	941 例	未公开	不适用	已报告数值
奈莫利珠单抗	NCT03985943	奈莫利珠单抗疗效与安全性研究	分析人群	未公开	未公开	不适用	未公开

逐试验详情

逐试验呈现可定位到队列、组别、原始字段和来源版本的完整设计事实。

NCT02260986（CHRONOS） · 度普利尤单抗 · III期 · 国际

NCT02260986试验档案完整表

角色：关键确证试验；状态：已完成

设计要素	内容	时间点	量表	披露
主要终点定义	第16周IGA评分达到0或1分且较基线下降≥2分的受试者比例	第16周	IGA	已报告数值
随机与盲法	三盲、平行分组	未公开	不适用	已报告数值
访视与随访	度普利尤单抗联合外用糖皮质激素治疗至第16周，并进行长期安全性随访	第16周；长期安全性随访	不适用	已报告数值
排除标准	既往参加过度普利尤单抗临床试验	筛选期	不适用	已报告数值
入选标准	筛选访视前特应性皮炎病程至少3年	筛选期	不适用	已报告数值
目标人群	成人入组；慢性病程至少3年	筛选期	不适用	已报告数值
计划或实际样本量	740 例	未公开	不适用	已报告数值
分析人群	未公开	未公开	不适用	未公开
主要终点时间点	基线至第16周	第16周	不适用	已报告数值
对照干预	安慰剂，每周1次	未公开	不适用	已报告数值
给药方案	每2周给药；治疗期至第51周	第1周至第51周	不适用	已报告数值
试验组干预	度普利尤单抗300 mg，每2周1次	未公开	不适用	已报告数值

设计要素	内容	时间点	量表	披露
主要终点定义	第16周IGA评分达到0或1分且较基线下降≥2分的受试者比例	第16周	IGA	已报告数值
随机与盲法	四盲、平行分组	未公开	不适用	已报告数值
访视与随访	随机、双盲、安慰剂对照、平行分组；诱导期16周，维持期36周，总疗程52周	诱导期第16周； 维持期第52周	不适用	已报告数值
排除标准	既往接受过度普利尤单抗或曲罗芦单抗治疗	基线前	不适用	已报告数值
入选标准	基线访视EASI评分≥16分	基线	EASI	已报告数值
目标人群	成人与青少年；年龄≥12岁且体重≥40 kg	筛选期	不适用	已报告数值
计划或实际样本量	445 例	未公开	不适用	已报告数值
分析人群	未公开	未公开	不适用	未公开
主要终点时间点	基线至第16周	第16周	不适用	已报告数值
对照干预	安慰剂	未公开	不适用	已报告数值
给药方案	诱导期每2周给药；维持期至第52周	基线至第52周	不适用	已报告数值
试验组干预	Lebrikizumab，每2周1次	未公开	不适用	已报告数值

设计要素	内容	时间点	量表	披露
主要终点定义	ITT人群中IGA达到0或1分且较基线下降≥2分的受试者比例	第16周	IGA	已报告数值
随机与盲法	四盲、平行分组	未公开	不适用	已报告数值
访视与随访	第16周	第16周	不适用	已报告数值
排除标准	体重<30 kg	筛选期	不适用	已报告数值
入选标准	筛选及基线访视EASI评分均≥16分	筛选期与基线	EASI	已报告数值
目标人群	成人与青少年；年龄≥12岁	筛选期	不适用	已报告数值
计划或实际样本量	941 例	未公开	不适用	已报告数值
分析人群	未公开	未公开	不适用	未公开
主要终点时间点	第16周	第16周	不适用	已报告数值
对照干预	安慰剂	未公开	不适用	已报告数值
给药方案	主要终点评估至第16周	第16周	不适用	已报告数值
试验组干预	奈莫利珠单抗	未公开	不适用	已报告数值

设计要素	内容	时间点	量表	披露
主要终点定义	双盲诱导期第16周达到EASI-75应答的受试者比例	第16周	EASI	已报告数值
随机与盲法	四盲、平行分组	未公开	不适用	已报告数值
访视与随访	诱导期接受Lebrikizumab 250 mg每2周1次者，维持期继续同剂量给药	诱导期第16周； 维持期第52周	不适用	已报告数值
排除标准	基线访视前1周内使用外用糖皮质激素	基线前1周	不适用	已报告数值
入选标准	基线访视EASI评分≥16分	基线	EASI	已报告数值
目标人群	青少年与成人；年龄≥12岁	知情同意时	不适用	已报告数值
计划或实际样本量	331 例	未公开	不适用	已报告数值
分析人群	未公开	未公开	不适用	未公开
主要终点时间点	第16周	第16周	不适用	已报告数值
对照干预	Lebrikizumab匹配安慰剂	未公开	不适用	已报告数值
给药方案	诱导期每2周给药；主要治疗期至第16周	基线至第16周	不适用	已报告数值
试验组干预	Lebrikizumab	未公开	不适用	已报告数值

设计模式、权衡与可选路径

在有来源的设计事实之上并列呈现模式、异常点、权衡和至少两条候选路径，不作排名或唯一最佳方案。

- 差异：目标人群上，NCT03985943为成人与青少年；年龄≥12岁；NCT05149313为青少年与成人；年龄≥12岁。
- 异常点：NCT02260986在目标人群上为成人入组；慢性病程至少3年，此为事实差异标记，不表示优劣判断。
- 模式：随机与盲法在NCT03985943、NCT04178967、NCT05149313呈现相近安排——四盲、平行分组。
- 差异：随机与盲法上，NCT02260986为三盲、平行分组；NCT04178967为四盲、平行分组。
- 异常点：NCT02260986在随机与盲法上为三盲、平行分组，此为事实差异标记，不表示优劣判断。
- 差异：给药方案上，NCT03985943为主要终点评估至第16周；NCT04178967为诱导期每2周给药；维持期至第52周。
- 异常点：NCT02260986在给药方案上为每2周给药；治疗期至第51周，此为事实差异标记，不表示优劣判断。
- 模式：主要终点定义在NCT02260986、NCT04178967呈现相近安排——第16周IGA评分达到0或1分且较基线下降≥2分的受试者比例。
- 差异：主要终点定义上，NCT03985943为ITT人群中IGA达到0或1分且较基线下降≥2分的受试者比例；NCT02260986为第16周IGA评分达到0或1分且较基线下降≥2分的受试者比例。
- 异常点：NCT03985943在主要终点定义上为ITT人群中IGA达到0或1分且较基线下降≥2分的受试者比例，此为事实差异标记，不表示优劣判断。
- 模式：主要终点时间点NCT02260986、NCT04178967呈现相近安排——基线至第16周。
- 差异：主要终点时间点上，NCT02260986为基线至第16周；NCT03985943为第16周。

候选设计路径（并列，不排名）

多路径综合完整表

路径	摘要	前提	权衡	支撑试验
路径1	以 EASI 改善作为主要终点路径	登记披露了 EASI 相关主要终点定义与评估时间。	强调皮损面积与严重度综合改善，可能与仅看总体评估的路径不同。	NCT05149313（ADvantage）
路径2	以 IGA 达到清除或几乎清除作为主要终点路径	登记披露了 IGA 相关主要终点定义与评估时间。	强调总体评估阈值达标，可能与面积严重度综合评分路径不同。	NCT02260986（CHRONOS） NCT04178967（ADvocate2） NCT03985943（奈莫利珠单抗疗效与安全性研究）

资料版本与局限

呈现登记版本、设计事实来源范围和影响解释的局限。

资料版本与局限完整表

产品	登记号	试验	登记更新日期	披露成熟度	来源范围
度普利尤单抗	NCT02260986	CHRONOS	2017-10-17	登记结果或主要报告	仅有注册登记信息
Lebrikizumab	NCT04178967	ADvocate2	2023-05-24	登记结果或主要报告	仅有注册登记信息
奈莫利珠单抗	NCT03985943	奈莫利珠单抗疗效与安全性研究	2023-08-29	登记结果或主要报告	仅有注册登记信息
Lebrikizumab	NCT05149313	ADvantage	2023-04-26	登记结果或主要报告	仅有注册登记信息

分析人群等统计细节若未在登记中单独披露，表内保留“未公开”，不按常规做法推断。