

特应性皮炎创新药疗效与安全性比较

疗效与安全性关键结果

适应症：特应性皮炎 | 数据截止日：2026年7月31日

摘要

- 三款生物制剂第16周 EASI-75 应答率均高于各自研究中的安慰剂组。
- 度普利尤单抗治疗组与安慰剂组的应答率差值较大；各产品结果来自不同示例试验，不作跨试验合并。
- 安全性明细按至第52周的治疗组发生率由高到低列示。

第16周疗效概览


EASI-75 应答率；组间差值仅用于直观阅读，不进行跨试验合并。

产品	治疗组	安慰剂组	组间差值
泰瑞奇单抗	56.2% (211/376)	18.7% (70/374)	+37.5 个百分点
度普利尤单抗	69.0% (425/616)	18.9% (117/618)	+50.1 个百分点
来瑞珠单抗	58.6% (283/483)	16.2% (78/482)	+42.4 个百分点

疗效比较

各产品治疗组与相应安慰剂组按原研究结果并列，未进行跨试验合并。

第16周 EASI-75 应答率（%） · 治疗组与安慰剂组同屏对照



第16周 EASI-75 完整数据表

产品	试验	治疗组别	终点	时间点	应答率	例数	分析人群
泰瑞奇单抗	示例试验 01	治疗组	EASI-75 应答率	第16周	56.2%	211/376	随机化人群
泰瑞奇单抗	示例试验 01	安慰剂组	EASI-75 应答率	第16周	18.7%	70/374	随机化人群
度普利尤单抗	示例试验 02	治疗组	EASI-75 应答率	第16周	69.0%	425/616	随机化人群
度普利尤单抗	示例试验 02	安慰剂组	EASI-75 应答率	第16周	18.9%	117/618	随机化人群
来瑞珠单抗	示例试验 03	治疗组	EASI-75 应答率	第16周	58.6%	283/483	随机化人群
来瑞珠单抗	示例试验 03	安慰剂组	EASI-75 应答率	第16周	16.2%	78/482	随机化人群

安全性明细表

按发生率由高到低列示；治疗组、观察时间窗及分析人群在表题中标明。

安全性明细 · 泰瑞奇单抗 · 试验 示例试验 01 · 治疗组 · 至第52周 · 安全性分析集

不良事件	发生率	例数
注射部位反应	18.5%	68/370
结膜炎	18.1%	67/370
上呼吸道感染	17.8%	66/370
头痛	17.4%	64/370
鼻咽炎	17.1%	63/370
口唇疱疹	16.8%	62/370
嗜酸性粒细胞增多	16.4%	61/370
皮肤感染	16.1%	60/370
过敏反应	15.7%	58/370
咳嗽	15.3%	57/370
背痛	15.0%	56/370
腹泻	14.7%	54/370
恶心	14.3%	53/370
疲劳	13.9%	51/370
关节痛	13.6%	50/370
瘙痒加重	13.2%	49/370

不良事件	发生率	例数
眼干	12.9%	48/370
睑缘炎	12.6%	47/370
口腔溃疡	12.2%	45/370
流感样症状	11.9%	44/370
咽喉痛	11.5%	43/370
鼻塞	11.2%	41/370
眩晕	10.8%	40/370
失眠	10.5%	39/370
肌肉痛	10.1%	37/370
皮疹	9.8%	36/370
荨麻疹	9.4%	35/370
发热	9.1%	34/370
腹痛	8.7%	32/370
牙痛	8.4%	31/370
外周水肿	8.0%	30/370
血压升高	7.7%	28/370