387人AIA：追加20組で比較

同じ7案を固定して追加評価。表のAIAは「各組の12攻撃最大」を20組で要約。低いほど良い。

・ 追加20組の平均が最小：Zhang11-HCv2-1（0.089843）。ただしZhang04候補との差は約0.000334と小さい。

・ 追加20組の最悪値が最小：Zhang04-HCv2-3（0.141450）。

・ Zhang04候補とZhang11候補の2案を残す判断。平均だけで一方の優位を断定しない。

案	有用性U ↑	平均 ↓	中央値	最大 ↓	悪化組数 元案比 / 20
Zhang04（元案）	0.921999	0.118804	0.127699	0.176651	基準
Zhang04-HCv2-3	0.921999	0.090177	0.089476	0.141450	1 / 20
Zhang11（元案）	0.921999	0.102013	0.101143	0.165844	基準
Zhang11-HCv2-1	0.921999	0.089843	0.091512	0.152816	1 / 20
zhang11_seo	0.934430	0.120503	0.116770	0.178970	17 / 20
Seo03（元案）	0.924519	0.135032	0.127842	0.178727	基準
Seo03･血圧1回交換	0.924519	0.125691	0.122392	0.165772	2 / 20

以前の3組での改善は、追加20組でも続くか

候補	以前3組の 平均の元案差	追加20組の 平均の元案差	追加20組 改善 / 同点 / 悪化
Zhang04-HCv2-3	-0.04311	-0.02863	19 / 0 / 1
Zhang11-HCv2-1	-0.01405	-0.01217	18 / 1 / 1
zhang11_seo	+0.00895	+0.01849	0 / 3 / 17
Seo03･血圧1回交換	-0.00980	-0.00934	18 / 0 / 2

・ 差がマイナスなら改善。各候補はZhang04･Zhang11･Seo03の自分の元案と比較。

・ Uは7案とも前回と一致。今回、Cの交換や希少行の再加工は行っていない。

・ 以前3組と追加20組の最大値は、組数が違うため単純に増減を評価しない。比較の中心は追加20組内でそろえる。

163人AIA・全体MIAも20組追加

こちらも同じ7案・同じ攻撃で比較。いずれも低いほど良い。

163人AIA：標的と対照を毎回選び直す

案	平均 ↓	最小	中央値	最大 ↓	悪化 / 20組
Zhang04（元案）	0.153179	0.000000	0.163978	0.461538	基準
Zhang04-HCv2-3	0.148199	0.000000	0.150697	0.441176	5 / 20
Zhang11（元案）	0.153092	0.000000	0.155952	0.447368	基準
Zhang11-HCv2-1	0.139680	0.000000	0.122222	0.441176	3 / 20
zhang11_seo	0.164821	0.000000	0.173238	0.447368	9 / 20
Seo03（元案）	0.186062	0.026667	0.196774	0.441176	基準
Seo03・血圧1回交換	0.182642	0.013333	0.196774	0.441176	1 / 20

各組の12攻撃最大を20組で要約。元案からの悪化を数えるため、元案の欄は「基準」。

全体MIA：4攻撃 × 20組

案	組別最大の平均 ↓	全体の最大 ↓	組別最大の悪化 / 20組	個別攻撃の悪化 / 80比較
Zhang04（元案）	0.148077	0.307692	基準	基準
Zhang04-HCv2-3	0.148077	0.307692	0 / 20	4 / 80
Zhang11（元案）	0.148077	0.307692	基準	基準
Zhang11-HCv2-1	0.148077	0.307692	1 / 20	3 / 80
zhang11_seo	0.150000	0.307692	1 / 20	12 / 80
Seo03（元案）	0.401923	0.692308	基準	基準
Seo03・血圧1回交換	0.392750	0.615385	2 / 20	2 / 80

・ MIAは各組、標的26人 + 対照1,023人。誤判定率1%で標的を見つける率（TPR）を公式コードで計算。

・ 「組別最大」は4攻撃の最大値。「個別攻撃の悪化」は4攻撃をそれぞれ自分の元案と比較した数。

・ 163人AIAではZhang11候補の平均が低く、元案からの悪化は3組。Zhang04候補は5組。今回の全体MIAの平均・最悪値は両候補で同じ。

・ 今回増やしたMIAは全体MIA。別資料の希少MIA診断とは区別する。本番のMIA得点は確定しない。

定数の影響と、今回言える範囲

パネルを増やす目的は、対照や標的の選び方で結果がどれくらい変わるかを見ること。

追加20組の基準値も確認

対象	基準	平均	最小	最大
387人	全員にtime = 10	0.071841	0.005610	0.137602
387人	背景だけの1近傍	0.015523	0.000000	0.095353
163人	全員にtime = 10	0.117772	0.000000	0.441176
163人	背景だけの1近傍	0.029936	0.000000	0.196078

387人：定数以上に当てられる分の平均

案	追加20組の平均	計算の意味
Zhang04（元案）	0.046964	max（12攻撃最大, 定数）− 定数
Zhang04-HCv2-3	0.019104	同上
Zhang11（元案）	0.030173	同上
Zhang11-HCv2-1	0.018753	同上
zhang11_seo	0.048663	同上
Seo03（元案）	0.063191	同上
Seo03・血圧1回交換	0.053850	同上

・上の値は、定数攻撃も含めた最大AIAが、定数をどれだけ上回るか。符号付きの「AIA最大−定数」も詳細CSVに掲載。

・163人・組4では定数だけで0.441176。両候補の最悪値も同じ値だった。高い絶対値のすべてがCから得た情報によるものではない。

・定数差・背景差は診断指標。φ = 0.089047や公式の匿名性得点そのものではない。

条件と限界

・387人方式：本戦Bの同じ387人と、毎回選び直した387対照を、各側163人分に重み付け。163人方式：標的も163人を選び直す。

・対照の選び方は前回と同じ。性別・県・年代・発症をそろえ、公開の希少判定も近づける。本番の選び方を再現できたと保証するものではない。

・同じ有限のデータから繰り返し選ぶため、人は重複する。本番での勝率や、未知の集団への保証として解釈しない。

・追加組だけでの比較を主表にした。詳細表には以前の組も含む合計（387人23組、163人29組、全体MIA29組）を別掲。