

$$A \xrightarrow{\text{İSEF}} \begin{cases} \xrightarrow{E_1, E_2, \dots, E_n} I_n \rightarrow \det = 1 \quad (A \text{ terslenebilir}) \\ \xrightarrow{I_n \text{ 'e ulaşmıyor}} \det = 0 \quad (A \text{ terslenebilir değil}) \end{cases}$$

A terslenebilir değilse

$$E_n \dots E_2 E_1 A = B$$

$$\det(A) = 0$$

$$\underbrace{\det(E_n)}_{\neq 0} \dots \underbrace{\det(E_2)}_{\neq 0} \underbrace{\det(E_1)}_{\neq 0} \det(A) = \det(B) \rightarrow 0$$

Adjoint Matris (EK-matris)

$\text{adj}(A)$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}_{n \times n}$$

$$\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \dots & A_{nn} \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{bmatrix}$$

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} |M_{ji}|$$

$$A \cdot \text{adj}(A) = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \det(A) & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \det(A) & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \det(A) \end{bmatrix}_{n \times n}$$

$$\rightarrow a_{11} A_{11} + a_{12} A_{21} + \dots + a_{1n} A_{n1} \rightarrow 1. \text{ satır kofaktör açılımı}$$

$$\rightarrow a_{21} A_{11} + a_{22} A_{21} + \dots + a_{2n} A_{n1} = 0$$

$$= \det(A) \cdot I_n$$

$$\Rightarrow A \cdot \text{adj}(A) = \det(A) \cdot I_n \Rightarrow \frac{1}{\det(A)} \cdot A \cdot \text{adj}(A) = I_n$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{adj}(A) = A^{-1}$$

Örnek

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = ?$$

$$\text{adj}(A) = ?$$

$$\det(A) = ?$$

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 2$$

$$A_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = -1$$

$$A_{31} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = -2$$

$$\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{bmatrix}$$

$$A_{11} = \frac{(-1)^{1+1}}{+} \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 2 \quad A_{21} = \frac{(-1)^{2+1}}{-} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 1 \quad A_{31} = \frac{(-1)^{3+1}}{+} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = -2$$

$$\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{bmatrix}$$

$$A_{12} = \frac{(-1)^{1+2}}{-} \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = -7 \quad A_{22} = \frac{(-1)^{2+2}}{+} \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 4 \quad A_{32} = \frac{(-1)^{3+2}}{-} \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 2$$

$$\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -2 \\ -7 & 4 & 2 \\ 4 & -3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_{13} = \frac{(-1)^{1+3}}{+} \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 4 \quad A_{23} = \frac{(-1)^{2+3}}{-} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -3 \quad A_{33} = \frac{(-1)^{3+3}}{+} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 1$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 2/5 & 1/5 & -2/5 \\ -7/5 & 4/5 & 2/5 \\ 4/5 & -3/5 & 1/5 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} = 4 - 7 + 8 = 5$$

$$2 \cdot 2 + 1 \cdot (-7) + 2 \cdot 4$$

Cramer Kuralı

$AX = b \rightarrow$ sonuc sütunu
 katsayılar matrisi (kare matris)
 değişkenler sütunu

A singüler olmayan bir matris (A^{-1} var)

A_i : A matrisinin i. sütununun b sütunu ile değiştirilmiş hali

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$$

Öm

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + x_3 &= 5 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 &= 6 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 &= 9 \end{aligned}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = 1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 4 - 10 + 2 = -4 \neq 0$$

$$A_1 = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 6 & 2 & 1 \\ 9 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\det(A_1) = 5 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} 6 & 1 \\ 9 & 3 \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 6 & 2 \\ 9 & 2 \end{vmatrix} = 20 - 18 - 6 = -4$$

$$x_1 = \frac{\det(A_1)}{\det(A)} = \frac{-4}{-4} = 1$$

$$A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 1 \\ 2 & 6 & 1 \\ 1 & 9 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\det(A_2) = 1 \cdot \begin{vmatrix} 6 & 1 \\ 9 & 3 \end{vmatrix} - 5 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 9 \end{vmatrix} = 9 - 25 + 12 = -4$$

$$x_2 = \frac{\det(A_2)}{\det(A)} = \frac{-4}{-4} = 1$$

$$A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 2 & 2 & 6 \\ 1 & 2 & 9 \end{bmatrix}$$

$$\det(A_3) = 1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 6 \\ 2 & 9 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 9 \end{vmatrix} + 5 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 6 - 24 + 10 = -8$$

$$x_3 = \frac{\det(A_3)}{\det(A)} = \frac{-8}{-4} = 2$$