

肩关节周围的六大滑囊 积液的MRI影像表现

MRI Imaging of the Six Major Bursae Around the Shoulder Joint

来源: jxradiology · 影像学园

2024年11月17日

目录

01

六大滑囊概述

滑囊定义与六大滑囊列表

02

图1 肩峰下-三角肌下滑囊

Subacromial-Subdeltoid Bursa

03

图2 肩胛下肌上隐窝 & 喙突下滑囊

SSR & Subcoracoid Bursa 解剖与MRI

04

图3 喙锁滑囊 & 六大滑囊关系

Coracoclavicular Bursa 空间分布总览

05

图4 肩峰下-三角肌下滑囊内侧延伸

Medial Extension & Rotator Cuff Tear

06

喙突下方解剖结构详解

矢/冠状/横轴面解剖与MRI对照

07

鉴别诊断要点与总结

SSR vs 喙突下滑囊积液鉴别

六大滑囊概述

滑囊是关节囊外的囊性结构，可与关节囊相通，其作用是减少肌腱、骨和皮肤之间的摩擦。一些慢性磨损、损伤或急性滑膜炎可导致滑膜积液。

1

肩峰下-三角肌下滑囊

Subacromial-Subdeltoid Bursa

2

肩胛下肌上隐窝（滑囊）

Superior Subscapularis Recess

3

喙突下滑囊

Subcoracoid Bursa

4

喙锁滑囊

Coracoclavicular Bursa

5

肩峰上滑囊

Supra-acromial Bursa

6

肩峰下-三角肌下滑囊内侧延伸

Medial Extension

图1 肩峰下-三角肌下滑囊

Subacromial-Subdeltoid Bursa (SbA/SD)








图2 肩胛下肌上隐窝 & 喙突下滑囊（上）


Superior Subscapularis Recess (SSR) & Subcoracoid Bursa (SC)



SSR: 肩胛下肌上隐窝 | SC: 喙突下滑囊 | SSc: 肩胛下肌腱

图2 肩胛下肌上隐窝 & 喙突下滑囊（下）


Superior Subscapularis Recess (SSR) (SSR) & Subcoracoid Bursa (SC) (SC)



- ★ SSR (星号)：位于肩胛下肌后方/上方
- SC (箭头)：位于肩胛下肌前方
- 小箭：盂肱中韧带 (MGHL)
- CB：喙肱肌和肌腱
- B图：喙突下滑囊积液 + 肱二头肌长头腱退变/内侧脱位

图3 喙锁滑囊 & 六大滑囊分布总览

Coracoclavicular Bursa (CC) — 六大滑囊空间关系示意图




喙锁滑囊解剖示意图

红箭： 肩峰下-三角肌下滑囊内侧延伸 | **蓝箭头：** 冈上肌肌腱撕裂 | **白箭：** 肩峰下-三角肌下滑囊

图4 肩峰下-三角肌下滑囊内侧延伸


Medial Extension of Subacromial-Subdeltoid Bursa

六大滑囊空间关系



喙突下方解剖结构

Coracoid Process Anatomy — SSR vs Subcoracoid Bursa 鉴别基础



解剖层次

从前向后依次为：

喙肱肌 → 喙突下滑囊 → 肩胛下肌 → 肩胛下肌滑囊（上隐窝）

关键解剖关系


- 联合腱（肱二头肌短头+喙肱肌）共同起自喙突
- 联合腱与肩胛下肌之间 = 喙突下滑囊
- 肩胛下肌与肩前关节囊之间 = 肩胛下肌滑囊（上隐窝）

病理生理

喙突下撞击 → 挤压中间滑囊 → 炎性渗出

矢状面：解剖图 vs MRI 抑脂像

Sagittal View — Anatomy Diagram & Fat-suppressed MRI



解剖示意图




MRI 抑脂像


肩胛下肌滑囊积液（高信号）位于肩胛下肌后方和上方 | **喙突下滑囊积液**位于肩胛下肌前方

横轴面：解剖图 vs MRI 抑脂像

Axial View — Anatomy Diagram & Fat-suppressed MRI



解剖示意图



MRI 抑脂像

肩胛下肌滑囊积液位于肩胛下肌后方（包绕上方） | **喙突下滑囊积液**位于肩胛下肌前方

鉴别诊断要点

肩胛下肌上隐窝 (SSR)

位置

肩胛下肌后方和上方；肩胛下肌与肩前关节囊之间

性质

解剖性隐窝，可与肩关节囊相通；少量积液可无临床意义

临床意义

生理性积液可能较大，不一定是病理改变

喙突下滑囊 (SC)

位置

肩胛下肌前方；喙突与联合腱后方


性质

真正的滑囊结构（非隐窝）；正常时不与关节腔相通


临床意义

积液更可能反映潜在病理意义 △□


鉴别对比：SSR vs 喙突下滑囊积液



肩胛下肌上隐窝积液



喙突下滑囊积液



喙突下滑囊+SSR积液

感谢阅读

本文内容整理自 jxradiology

影像学园公众号文章

肩关节周围的六大滑囊积液的MRI影像表现

— E N D —