



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Ubaye

Rédigé le lundi 3 juin 2024 à 16h

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr




Estimation des risques

mardi 04 juin







Tendance pour le mercredi 05 juin



risque limité

Risque en hausse avec une reprise de l'humidification associée à des températures plus élevées.

Risque faible.

Départs spontanés : en neige humide

Déclenchements skieurs : rares plaques en haute montagne

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses


Stabilité du manteau neigeux jusqu'au mardi 4 juin 2024 au soir





FAIBLE ACTIVITÉ EN NEIGE DE PRINTEMPS, RARES PLAQUES EN ALTITUDE

DÉPARTS SPONTANÉS : peu probables au lever du jour suite au bon regel nocturne, puis quelques départs en neige humide sont possibles en pentes raides ensoleillées, voire sous une averse ponctuellement plus intense l'après-midi. Avalanches généralement de petite taille, rarement moyenne.

DÉCLENCHEMENTS PROVOQUÉS: De rares plaques temporaires peuvent subsister en versants nord au dessus de 3000 m, formées par les averses de neige légèrement ventées de ces derniers jours. Ces instabilités sont peu étendues et peu épaisses, et deviennent moins faciles à déclencher. Par ailleurs, un skieur évoluant tardivement en pente ensoleillée peut favoriser un départ de neige humidifiée en cours de journée.







Qualité de la neige

Enneigement excédentaire pour un début juin, très excédentaire à haute altitude. On relève encore 95 cm de neige à la nivôse de Restefond à 2550 m.

Limites skiables à partir de 2200/2500 m selon les orientations.

Qualité de la neige: manteau neigeux très dense et printanier, avec un regel nocturne efficace. L'humidification reprend rapidement en cours de journée au fil de l'ensoleillement, avant l'arrivée d'averses l'après-midi, apportant localement quelques cm de neige au dessus de 3000 m. Les crêtes de haute altitude sont occupées par des corniches encore très volumineuses.





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Ubaye

Rédigé le lundi 3 juin 2024 à 16h



Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	mar. 28/05				mer. 29/05				jeu. 30/05				ven. 31/05				sam. 01/06				dim. 02/06				lun. 03/06			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	$\frac{\omega}{4}$	Ģ J	Ģ J	4	N	4	1	W	4	4		4	J.	0	4	U	Ÿ	4	*	4	4	şĮ	*	4	4			1
Vent (km/h)	30	15	10	15	20	25	45	40	25	35	35	40	50	50	45	30	20	15	15	15	10	25	30	30	25	15	10	10
à 3000m	Ľ	Z	7	K	\	Ľ	7	K	Z	7	*	7	7	+	7	7	4	+	K	K	1	4	K	7	2	K	7	K
Vent (km/h)	20	10	10	10	5	10	20	15	15	15	20	20	20	15	15	5	10	5	5	5	5	10	15	15	10	5	15	5
à 2000m	4	4	4	7	+	*	>	2	4	4	→	4	→	4	4	2	Ľ	K	•	K	K	7	K	K	•	K	2	M

