




Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya Del 19/02/2024 al 20/02/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)








Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 19/02/2024 al 20/02/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

El martes el manto se presentará bien ligado a consecuencia de un leve rehielo superficial en muchos puntos. Sin embargo, con el ambiente soleado y el incremento de temperaturas se podrán desencadenar de forma natural algunas purgas de nieve húmeda. En conjunto serán de tamaño 1, insuficiente para enterrar a una persona, y más frecuentes por la tarde y en vertientes orientadas al oeste. También son posibles deslizamientos basales de tamaños 1 y 2.

Por otro lado, en terreno umbrío de la Franja Norte Pallaresa, por encima de unos 2300 m podríamos desencadenar algún alud accidental por la presencia local de niveles facetados enterrados. Al paso de una persona se podrían desencadenar aludes de placa, que involucrarán muy poco grosor y con poca capacidad para propagar. Los posibles aludes serán en general de tamaño 1. También podríamos encontrar alguna placa de viento residual en sotaventos orientados a sur por encima de 2200 m.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve a partir de 1700 m en umbrías, con muy poco grosor en las solanas. Los grosores oscilan entre los 40 y los 60 cm a 2200 m. El grosor total sigue estando por debajo de lo que tocaría en esta época del año, sobre todo en la Franja Norte de la Pallaresa.

Tendencia para las próximas 48-72h

Las condiciones del manto nivoso serán muy similares. Peligro ESTACIONARIO.

| - | | | | | |
|---|--------------|----------|-----------|------------|---------|
| | 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |








Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 19/02/2024 al 20/02/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

En buena parte del terreno encontramos un manto encostrado y bien atado, con baja probabilidad de aludes. Es en terreno umbrío, de encima de unos 2300 m donde podríamos desencadenar algún alud accidental por la presencia local de niveles facetados enterrados. Al paso de una persona se podrían desencadenar aludes de placa, que involucrarán muy poco grosor y con poca capacidad para propagar. Los posibles aludes serán por lo general de tamaño 1, insuficiente para enterrar a una persona.

De forma muy residual, por encima de 2400 m hay placas de viento en sotaventos orientados a sur con manto preexistente, que podrían desprenderse al paso de personas y dar lugar a aludes, en general de tamaño 1, localmente mayores en sectores umbríos en cotas altas. Tampoco se descartan purgas de nieve húmeda naturales las cotas más elevadas orientadas al oeste y por la tarde.

Distribución del manto nivoso

Actualmente, hay nieve por encima de 1700-1800 m en umbrías subiendo la cota, con poco grosor. Sin embargo, el manto sólo es esquiable por encima de 2200 m en umbrías poco afectadas por el viento como cubetas, torrenteras y canales, así como terreno herboso y liso. Los espesores a 2500 m rondan los 30-40 cm y son muy deficitarios para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

No se esperan cambios importantes en el estado del manto. Peligro ESTACIONARIO.








Boletín de peligro de aludes Pallaresa Del 19/02/2024 al 20/02/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

En buena parte del terreno encontramos un manto encostrado y bien atado, con baja probabilidad de aludes. Es en terreno umbrío, de encima de unos 2300 m donde podríamos desencadenar algún alud accidental por la presencia local de niveles facetados enterrados. Al paso de una persona se podrían desencadenar aludes de placa, que involucrarán muy poco grosor y con poca capacidad para propagar. Los posibles aludes serán por lo general de tamaño 1, insuficiente para enterrar a una persona.

De forma muy residual, por encima de 2400 m hay placas de viento en sotaventos orientados a sur con manto preexistente, que podrían desprenderse al paso de personas y dar lugar a aludes, en general de tamaño 1, localmente mayores en sectores umbríos en cotas altas. Tampoco se descartan purgas de nieve húmeda naturales las cotas más elevadas orientadas al oeste y por la tarde.

Distribución del manto nivoso

Actualmente, hay nieve por encima de 1600-1700 m en umbrías subiendo la cota, con poco grosor. Sin embargo, el manto sólo es esquiable por encima de 2200 m en umbrías poco afectadas por el viento como cubetas, torrenteras y canales, así como terreno herboso y liso. Los espesores a 2500 m rondan los 30-50 cm y son muy deficitarios para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

No se esperan cambios importantes en el estado del manto. Peligro ESTACIONARIO.










Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 19/02/2024 al 20/02/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

En buena parte de terreno la nieve se encuentra encostrada por las lloviznas del viernes y posteriores días de rehielo, lo que estabiliza el manto. De manera muy local, a umbrías por encima de 2400 m, donde las costras no sean tan resistentes, donde haya fuerte pendiente y por sobrecarga fuerte, no se descarta el desencadenamiento de algún alud de placa por la presencia de niveles antiguos de nieve facetada. Los posibles aludes serán de tamaño 1, insuficiente para enterrar a una persona pero con capacidad para producir caídas y lesiones.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo a partir de unos 2000 m en umbrías y unos 2300 m en solanas. El manto, en general, no es esquiable y la nieve sólo presenta cierta continuidad a umbrías por encima de 2300 m. Los espesores a 2200 m son inferiores a 15 cm, muy por debajo de lo normal por estas fechas.

Tendencia para las próximas 48-72h

No se esperan cambios importantes en el estado del manto. Evolución: PELIGRO SIN CAMBIOS.









Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 19/02/2024 al 20/02/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

5 MUY FUERTE

4 FUERTE

3 NOTABLE

2 LIMITADO

1 DÉBIL

La nieve ha retrocedido de cotas bajas en el sector debido a las lluvias y nieblas del pasado viernes. Hay unos 5 cm de nieve reciente en las cimas más altas. Por debajo de 2000 m la presencia de nieve es testimonial. En Canals del Cadí hay cierta continuidad, pero el manto no es esquiable. Los grosores a 2200 m se encuentran entre 10-20 cm y son muy inferiores a los habituales para la época del año. El manto se presenta rehelado en buena parte del terreno, con cierto humedecimiento superficial a lo largo de la jornada.

Esta nota se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.







Boletín de peligro de aludes Prepirineu Del 19/02/2024 al 20/02/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

El pasado viernes cayeron unos 3-5 cm en cotas altas. Podemos encontrar una fina capa de nieve por encima de unos 2000-2200 m en orientaciones umbrías. En ningún caso el manto es esquiable. En umbrías a 2200 m los espesores son inferiores a 10-20 cm, por debajo de los habituales en esta época del año. El manto se presenta rehelado en buena parte del terreno, con cierto humedecimiento superficial a lo largo de la jornada.

Esta nota se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.



| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|





Boletín de peligro de aludes Ter-Freser Del 19/02/2024 al 20/02/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

5 MUY FUERTE

4 FUERTE

3 NOTABLE

2 LIMITADO

1 DÉBIL

Por encima de 2300 m ha quedado enharinado por la nevada del viernes, con unos 5 cm de nieve reciente como máximo. Actualmente, el manto no es esquiable en ninguna cota ni orientación. Los espesores a 2200 m son por lo general inferiores a 10-20 cm, muy por debajo de lo habitual para la época del año. A partir de 2300 m, a umbrías, hay algunos congestos de poco grosor. El manto se presenta rehelado en buena parte del terreno, con cierto humedecimiento superficial a lo largo de la jornada.

Esta nota se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

