




Estimation des risques pour le :

JEUDI 03 AVRIL

RISQUE ACCIDENTEL RÉSIDUEL EN HAUTE MONTAGNE, UN PEU D'ACTIVITÉ AVALANCHEUSE EN NEIGE HUMIDE



Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses

Au-dessus de 2300m indice de risque limité, plus bas indice faible.

**Départs spontanés :** petites coulées en dessous de 2400 m, éventuellement une avalanche de fond très ponctuelle sur une surface lisse.

**Déclenchements provoqués :** risque limité, au-dessus de 2300 m dans les versants nord les plus raides.

Stabilité du manteau neigeux

Situation avalancheuse typique :



couche fragile persistante



avalanches de fond

**Déclenchements provoqués :** Au-dessus de 2300m, sur les versants nord les plus raides, maintien d'un risque accidentel en neige froide peu évoluée, comportant encore des couches fragiles, sur lesquelles peuvent se former de rares accumulations avec le vent de sud. Ces plaques sont difficilement déclenchables au passage d'un seul skieur mais peuvent être de taille moyenne (taille 2, cassure de 40 cm d'épaisseur).

**Départs spontanés :** Maintien d'une situation de foehn. Quelques rares coulées sont encore possibles en journée en pentes très raides à la suite des rares moments de soleil attendus dans l'après-midi et d'un isotherme 0°C qui remonte. Elles sont moins nombreuses que les jours précédents, témoins de coulées assez généralisées sous 2400m. Le risque d'une avalanche de fond de taille moyenne (taille 2) demeure dans les pentes raides encore très bien enneigées (dalles rocheuses, prairies).

Qualité de la neige

Enneigement :





L'enneigement continu débute vers 1700 m à l'ombre, 1900 m en sud. Cet enneigement augmente vite au-delà de 2000 à 2200m avec des accumulations de 2 à 3 m de neige vers 2500m.

Qualité de la neige :


Sur la crête frontalière, au-dessus de 2000 m, une petite pellicule de neige en surface repose sur un ancien manteau neigeux regelé plus ou moins profondément en surface.

Sous les nuages et avec un foehn bien installé, le regel est moins marqué que la veille. En versants sud et jusqu'aux sommets les plus hauts, la neige est bien ramollie et printanière dès le début matinée. Sur les versants nord les plus raides, on trouve encore de la neige froide au-dessus de 2500-2600m.


Aperçu météo pour le jeudi 03 avril

	nuit	matin	après-midi	soir
				
situation de foehn				
Pluie-Neige				
Iso 0 °C	2 900 m	3 200 m	3 000 m	3 300 m
Vent 2000 m	↑ 70 km/h	↑ 60 km/h	↑ 50 km/h	↑ 55 km/h
Vent 3000 m	↗ 80 km/h	↑ 75 km/h	↑ 75 km/h	↑ 90 km/h

Épaisseur de neige hors-piste



Précipitations à 1800 m



Tendance du vendredi 04 avril



Indice de risque limité



status quo du risque, poursuite de l'humidification printanière

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site <https://vigilance.meteofrance.fr/fr>





Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	jeu. 27/03				ven. 28/03				sam. 29/03				dim. 30/03				lun. 31/03				mar. 01/04				mer. 02/04			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo																												
Vent (km/h)	25	20	25	25	30	40	55	70	95	110	105	85	90	45	45	35	35	35	35	40	35	30	30	40	60	80	85	85
à 3000m	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑
Vent (km/h)	10	10	15	15	15	25	35	50	45	70	65	55	45	20	20	10	15	15	15	10	10	10	10	15	40	60	70	70
à 2000m	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↺	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	↑



Risque d'avalanche							
	jeu. 27/03	ven. 28/03	sam. 29/03	dim. 30/03	lun. 31/03	mar. 01/04	mer. 02/04



Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site <https://vigilance.meteofrance.fr/fr>