



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Couserans

Rédigé le vendredi 31 mai 2024 à 16h

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr




Estimation des risques

samedi 01 juin







Tendance pour le dimanche 02 juin



risque limité

Baisse du risque avec le regel nocturne plus marqué

Risque faible évoluant en risque limité.

Départs spontanés : Avalanches de neige humide à la faveur de la douceur et de l'ensoleillement

Déclenchements skieurs : Peu probable

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses

Stabilité du manteau neigeux jusqu'au samedi 1 juin 2024 au soir




Quelques départ de neige humide dans les pentes encore bien enneigées.


DÉPARTS SPONTANÉS : Avec la baisse des températures, un bon regel est attendu au lever du jour, limitant le risque de départ spontané. Dans les pentes encore bien enneigées le risque de départ spontané de neige humide de surface voire une avalanche de fond reste possible.

En effet, malgré le retour d'un peu de froid en surface, l'humidification en profondeur se poursuit par inertie et pourra favoriser le départ d'une avalanche de fond emportant l'ensemble du manteau neigeux. L'ouverture de fissures doit alerter le randonneur. Dans ce cas une grande avalanche peut survenir dans les pentes raides Est à Nord où les cumuls de neige restent importants au dessus de 2500m d'altitude. Dans certaines configurations (pentes très raides, couloirs, etc.), ces avalanches pourront finir leur course en dessous de la limite d'enneigement.

DÉCLENCHEMENTS PROVOQUÉS: La présence de plaques de neige froide est peu probable même à haute altitude. Par contre, un skieur ou un randonneur traversant une pente en neige très humide voire pourrie pourra déclencher une coulée de surface.







Qualité de la neige

Quelques belles accumulations subsistent cependant dans les thalwegs ou dans les vallons orientés Nord à Est. On peut chausser les skis dès 2100 à 2200m voire un peu plus bas dans les vallons traditionnellement froids et encaissés. A partir de 2300/2400m, l'enneigement augmente rapidement. En surface, on trouve généralement une neige de type printanière. Le regel sera en général efficace à la faveur du ciel clair de la nuit, puis la neige de surface redeviendra rapidement très humide. Cependant quelques plaques de glace ou de neige très dure pourraient subsister au niveau des cols et des sommets requérant une certaine prudence. Attention aussi à la rupture de pont de neige au dessus de torrents ou à proximité de rochers affleurants.





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Couserans

Rédigé le vendredi 31 mai 2024 à 16h



Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	sam. 25/05				dim. 26/05				lun. 27/05				mar. 28/05				mer. 29/05				jeu. 30/05				ven. 31/05			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	4		-	No.	¥	-			7	2	S	4	*	<u></u>	42	-11_		42	4		2	4	1	Á	<u> </u>	Ģ J	√	2
Vent (km/h)	35	40	35	35	50	50	45	40	35	40	35	30	30	35	40	35	40	45	40	40	50	60	60	50	40	30	30	30
à 3000m	→	*	→	→	7	7	7	7	→	→	→	2	24	2	24	24	7	4	3	24	7	2	4	2	24	24	>	→
Vent (km/h)	25	30	25	10	35	35	30	25	25	25	25	20	20	20	25	25	30	35	30	30	35	40	40	35	30	20	20	20
à 2000m	→	→	>	1	7	7	7	7	>	>	→	2	4	7	4	4	1	1	7	4	2	4	4	4	4	7	→	→

