



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Champsaur

Rédigé le vendredi 24 mai 2024 à 16h


Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr




Estimation des risques

samedi 25 mai







Tendance pour le dimanche 26 mai



Bon regel nocturne, mais bien plus chaud en journée. Grandes avalanches de neige humide plus nombreuses en versant nord, risque marqué.

Au-dessus de 2800m risque limité, plus bas risque faible évoluant en risque limité.

Départs spontanés : en neige humide sous 2700 m, en neige fraîche au dessus

Déclenchements skieurs : rares minces plaques en altitude

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible — En noir : les pentes les plus dangereuses


Stabilité du manteau neigeux jusqu'au samedi 25 mai 2024 au soir



UN PEU D'ACTIVITÉ NATURELLE, PETITES INSTABILITÉS POSSIBLES EN ALTITUDE


DÉPARTS SPONTANÉS: Peu probables au petit matin avec le bon regel nocturne. Petites avalanches de neige fraîche humidifiée au soleil, au-dessus de 2400 m. Activité brève, aux premiers rayons de soleil samedi, dont l'ampleur est fonction des quantités de neige fraîche tombée vendredi soir: avalanches de taille moyenne possibles. Plus tard en journée, des avalanches de neige humide de grande taille avec cassure parfois linéaire, ne sont pas exclues en nord raide dans la tranche d'altitude 2600/2800 m, ou en de plus larges orientations jusqu'à 3000 m. L'humidification du manteau neigeux en profondeur se poursuit et peut encore atteindre des sous-couches fragiles enfouies formées en début de saison.

DÉCLENCHEMENTS PROVOQUÉS: Instabilités au-dessus de 2800 m, plus durables et facilement déclenchables en versant nord. Les récentes chutes notamment vendredi soir ont pu former des instabilités. En tout début de journée elles sont encore facilement déclenchables dans la neige sèche, mais très temporaires. Ensuite elles se présentent sous formes de plaques de neige humides, plus difficiles à déclencher mais parfois volumineuses dans les orientations où le manteau neigeux n'est pas entièrement transformé, soit plutôt en versants nord sous 2800 m et en de plus larges orientations plus haut.





5 km/h



Qualité de la neige

Enneigement excédentaire pour une fin mai, très excédentaire à haute altitude. On relève encore 1m11 à la nivôse d'Orcières à 2280 m.

20 km/h

Limites skiables à partir de 2100/2500 m selon les orientations.

Vent 3000 m

Qualité de la neige: Manteau neigeux très dense et printanier avec regel nocturne limité mais généralement portant au-dessus de 2500 m. Quelques cm tombés sous averses vendredi soir à partir de 2300 m, inégalement répartis à l'échelle du massif, localement 15/20 cm à haute altitude, rapidement fondus au soleil. Humidification un peu plus marquée en journée avec la remontée de l'isotherme 0°C. La limite de coloration de la neige liée au dépôt de poussières désertiques du 30 mars réapparaît progressivement en surface remontant avec la fonte. Les crêtes de haute altitude sont encore occupées par des corniches parfois énormes.

10 km/h

10 km/h





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Champsaur

Rédigé le vendredi 24 mai 2024 à 16h



Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	sam. 18/05				dim. 19/05				lun. 20/05				mar. 21/05				mer. 22/05				jeu. 23/05				ven. 24/05			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	4	<u> </u>	4	4		~]		**	*	4	*	- Tre	<u></u>	4			7	4	√			*			-11_	4		
Vent (km/h)	20	25	30	20	20	15	10	15	20	15	15	15	5	10	10	10	10	10	10	5	5	20	20	15	10	20	20	15
à 3000m	↑	7	7	→	71	→	1	1	↑	K	K	Ľ	→	→	→	も	→	7	→	K	>	7	>	>	→	7	7	→
Vent (km/h)	5	10	10	0	5	5	7	0	10	5	10	5	5	15	15	10	10	15	15	10	5	10	10	0	0	10	10	5
à 2000m	2	1	↑	K	•	1	1	4	7	K	7	→	4	2	4	4	4	4	4	•	K	7	K	K	Ψ	1	1	K

