



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Thabor

Rédigé le lundi 12 février 2024 à 16h


Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr



Estimation des risques

mardi 13 février







Tendance pour le mercredi 14 février



risque limité

Risque limité stable. Poursuite de l'humidification avec la remontée de l'isotherme 0 degré.

Au-dessus de 1800m risque limité, plus bas risque faible.

Départs spontanés: neige humide dans les pentes raides ensoleillées

Déclenchements skieurs : plaques localisées en altitude, surtout dans la neige ventée

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible — En noir : les pentes les plus dangereuses


Stabilité du manteau neigeux jusqu'au mardi 13 février 2024 au soir





PLAQUES RÉSIDUELLES EN ALTITUDE, HUMIDIFICATION DANS LES PENTES RAIDES ENSOLEILLÉES

DÉPARTS SPONTANÉS : peu probables le matin puis quelques avalanches de neige humide au fil de l'ensoleillement dans les pentes raides, généralement de petite taille. Départ ponctuel, près des rochers.

DÉCLENCHEMENTS PROVOQUÉS: rares plaques en altitude, formées lors des récentes chutes de neige et par le vent modéré de nord-ouest dimanche. Celles formées dans la neige récente sont surtout présentes dans les versants froids d'altitude (au-dessus de 2000/2200 m), mais deviennent moins sensibles et résiduelles. Généralement peu épaisses, elles restent néanmoins déclenchables par le passage d'un seul skieur. Celles formées par le vent modéré sont facilement détectables, localisées dans les zones d'accumulations en altitude et peu épaisses, mais restent facilement déclenchables par le passage d'un skieur. Plus bas que 1800/2000 m, le risque est faible, la neige récente est tombée humide et a bien regelé.







Qualité de la neige

Enneigement contrasté, très déficitaire pour une mi-février en vallée, et jusqu'à 2200 m en adrets. Plus haut, il devient excédentaire, notamment dans les combes de haute altitude.

Enneigement skiable à partir de 1500 m en ubacs grâce à la sous-couche antérieure, plutôt vers 1800/2000 m en adrets où l'épaisseur reste modeste jusque 2200 m.

Couche de neige récente peu épaisse et humide / regelée sous 1800/2000 m, un peu plus conséquente (20/30 cm) et restée sèche au-dessus, mais souvent travaillée par le vent.





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Thabor

Rédigé le lundi 12 février 2024 à 16h



Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	mar. 06/02				mer. 07/02				jeu. 08/02				ven. 09/02				sam. 10/02				dim. 11/02				lun. 12/02			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	0		p	-	Ģ ³	4	Ģ J	-	şĴ	4	4				3						4	4		4	4	p	4	
Vent (km/h)	30	30	30	25	25	35	40	40	35	30	30	45	50	60	50	50	45	40	35	25	20	50	40	20	25	15	20	20
à 3000m	2	→	2	24	2	2	2	→	→	→	→	7	1	1	1	1	7	K	K	K	2	2	2	2	2	•	7	1
Vent (km/h)	20	15	10	10	10	15	15	15	10	5	10	20	25	40	40	30	20	30	15	10	15	30	25	20	20	10	15	15
à 2000m	K	7	K	*	7	7	7	K	K		K	K	K	+	4	+	+	4	+	*	7	7	7	7	7	7	2	3

