



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Champsaur

Rédigé le samedi 1 juin 2024 à 16h


Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr




Estimation des risques

dimanche 02 juin







Tendance pour le lundi 03 juin



risque limité

Regel correct le matin puis risque de nouveau en hausse mais restant limité avec de nouvelles averses de pluie jusqu'à 3000 m l'après-midi.

Au-dessus de 3000m risque limité, plus bas risque faible évoluant en risque limité.

Départs spontanés: en neige récente sous 3000 m, puis dans la neige fraiche sous averses

Déclenchements skieurs : rares plaques en très haute montagne

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible — En noir : les pentes les plus dangereuses

Stabilité du manteau neigeux jusqu'au dimanche 2 juin 2024 au soir




RARES PLAQUES EN ALTITUDE - ACTIVITÉ LIMITÉ EN NEIGE FRAICHE OU RÉCENTES L'APRÈS-MIDI DANS LES SECTEURS TOUCHÉS PAR LES AVERSES

DÉPARTS SPONTANÉS : peu probables au lever du jour, puis quelques départs attendus avec les éclaircies matinales qui viennent déstabiliser la neige récente. Avalanches de petite taille.


Pendant et après les averses de l'après-midi, des départs localisés et ponctuels peuvent se produire dans la neige fraiche au dessus de 2800/3000 m. Ces avalanches sont de taille petite en général, rarement moyenne mais peuvent très rarement provoquer un départ en cascade de plus grande ampleur en versants nord de haute altitude.

DÉCLENCHEMENTS PROVOQUÉS: Au dessus de 3000 m, de petites plaques sont en place dans un large secteur nord et en formation sous les averses neigeuses peu ventées. Ces instabilités temporaires restent facilement déclenchables. Au dessus de 3400 m, là où la neige est restée sèche, ces plaques sont présentes dans toutes les orientations. Plus bas que 2800/3000 m, un skieur peut favoriser un départ de neige humidifiée en cours de journée.





Pluie-Neige 2600 m Iso 0°C 2800 m 2800 m 2900 m 3000 m 5 km/h Vent 2000 m 5 km/h 10 km/h 15 km/h Vent 3000 m ← 10 km/h 10 km/h 20 km/h 30 km/h



Qualité de la neige

Enneigement excédentaire pour un début juin, très excédentaire à haute altitude. On relève encore 73 cm à la nivose d'Orcières à 2280 m.

Limites skiables à partir de 2100/2400 m selon les orientations, localement un peu plus bas en versant peu ensoleillé du cœur de massif.

Qualité de la neige: manteau neigeux très dense et printanier, avec un bon regel nocturne. L'humidification reprend en cours de journée au fil de l'ensoleillement avant l'arrivée d'averses orageuses l'après-midi venant déposer une couche de neige fraiche d'épaisseur très hétérogène (5 à 20 cm très localement) au-dessus de 2400/2500m. Cette neige devient rapidement collante une fois l'averse passée. Les crêtes de haute altitude sont occupées par des corniches encore très volumineuses.



à 2000m



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Champsaur

Rédigé le samedi 1 juin 2024 à 16h

M



Conditions nivo-météo des 7 derniers jours dim. 26/05 mar. 28/05 jeu. 30/05 sam. 01/06 lun. 27/05 mer. 29/05 ven. 31/05 03h 09h 15h 21h Météo Vent (km/h) 20 25 30 20 20 30 20 20 25 25 30 50 55 50 40 30 10 20 15 20 25 15 10 30 20 30 55 10 à 3000m M M M N M N 5 5 10 20 40 5 Vent (km/h) 10 5 5 5 15 10 15 15 5 15 10 15 15 15 15 30 40 40 25 20 5 5

