



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Thabor

Rédigé le lundi 29 avril 2024 à 16h


Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr




Estimation des risques

mardi 30 avril







Tendance pour le mercredi 01 mai



Formation de nouvelles plaques au-dessus de 2200/2400 m environ, avec les chutes de neige marquées sur le secteur frontalier.

Au-dessus de 2200m risque limité, plus bas risque faible.

Départs spontanés : quelques avalanches de neige humide.

Déclenchements skieurs : quelques plaques au-dessus de 2700/2800 m.

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible — En noir : les pentes les plus dangereuses

Stabilité du manteau neigeux jusqu'au mardi 30 avril 2024 au soir




ENCORE QUELQUES PLAQUES À HAUTE ALTITUDE - UN PEU D'ACTIVITÉ NATURELLE EN NEIGE HUMIDE, AVEC LE TEMPS DOUX SANS EXCÈS


DÉPARTS SPONTANÉS: quelques avalanches de neige humide possibles dans toutes les orientations. Probabilité de départ plus élevée en cours de journée de mardi avec le réchauffement diurne. Avalanches petites à moyennes (taille 1 à 2), notamment au-dessus de 2200/2300 m. L'humidification de la couche de neige tombée pendant le week-end se poursuit et gagne en profondeur.

DÉCLENCHEMENTS PROVOQUÉS: quelques plaques persistent au-dessus de 2700/2800 m environ, en particulier dans les pentes nord-ouest à nord-est, là où l'humidification du manteau neigeux reste encore absente ou superficielle. Ces plaques peuvent céder au passage d'un ou plusieurs skieurs et se situent dans les zones d'accumulation de neige formées par le vent. Cassures typiques de 20 à 40 cm.

À plus basse altitude, un skieur peut favoriser un départ de neige humide dans une pente raide.







Qualité de la neige

L'enneigement skiable débute entre 1800 et 2100 m selon les versants, et devient rapidement excédentaire en altitude

Mardi, après un regel nocturne généralement mauvais, l'humidification de la couche de neige récente continue de gagner en profondeur jusqu'à haute altitude, dans toutes les orientations. On peut trouver encore un peu de neige froide souvent travaillée par le vent dans les versants nord au-dessus de 2700/2900 m.





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Thabor

Rédigé le lundi 29 avril 2024 à 16h



Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	mar. 23/04				mer. 24/04				jeu. 25/04				ven. 26/04				sam. 27/04				dim. 28/04				lun. 29/04			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	4	<u> </u>	-	4	<u></u>			4	Ÿ		~]	4	<u></u>	4		1	4		1	1		(P) (B)	Se	1	- Tr	4	€	1
Vent (km/h)	20	20	40	40	35	40	45	40	30	25	20	10	15	30	30	30	30	45	60	65	60	55	50	55	55	40	40	55
à 3000m	•	+	•	•	•	•	24	24	4	24	→	1	1	K	1	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Vent (km/h)	15	15	30	30	25	25	35	25	20	10	10	5	10	15	15	15	15	30	40	30	35	30	35	25	30	15	20	20
à 2000m	4	2	4	1	4	1	4	4	4	4	7	7	7	1	K	K	+	K	+	K	+	+	K	K	K	K	K	K

