



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Thabor

Rédigé le samedi 16 mars 2024 à 16h


Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr



Estimation des risques

dimanche 17 mars







Tendance pour le lundi 18 mars



risque limité

Risque stationnaire avec poursuite de la douceur, et faibles précipitations vers la Savoie en journée.

Au-dessus de 1800m risque limité, plus bas risque faible.

Départs spontanés: en neige humide.

Déclenchements skieurs: plaques résiduelles en versants nord.

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible — En noir : les pentes les plus dangereuses


Stabilité du manteau neigeux jusqu'au dimanche 17 mars 2024 au soir




AVALANCHES DE NEIGE HUMIDE AVEC LA DOUCEUR, RARES PLAQUES RÉSIDUELLES EN ALTITUDE

DÉPARTS SPONTANÉS: possibles avalanches de neige humide, départs ponctuels en pentes raides, de taille petite à moyenne. Après un regel nocturne modéré, l'humidification reprend en journée sous un ciel souvent nuageux, et la poursuite d'un temps très doux. Elle gagne en profondeur dans les versants est, sud et ouest, mais remonte aussi progressivement en altitude en versants nord.
Par ailleurs, possibles chutes de corniches en cours de journée.

DÉCLENCHEMENTS PROVOQUÉS: Rares plaques résiduelles en versants ombragés d'un large secteur nord d'altitude, plutôt au dessus de 2300/2500 m environ. Ces instabilités deviennent généralement difficiles à solliciter, mais peuvent localement mobiliser de gros volumes de neige dans les zones d'anciennes accumulations importantes. En haute altitude, plutôt au dessus de 2500 m, d'éventuelles plaques superficielles et peu étendues ont pu se former samedi près des crêtes sous l'effet d'un vent de nord-ouest modéré. Par ailleurs, possibles départs de neige humide sous les skis en cours de journée, au dessous de 2500 m, généralement de petite taille.







Qualité de la neige

L'enneigement est excédentaire pour une mi-mars.

On peut chausser les skis vers 1500 m en ubacs, mais il y a peu de sous-couche sous 1800 m environ. Manteau neigeux en cycle printanier en versants ensoleillés, neige légèrement croûtée en début de matinée, s'humidifiant en journée, devenant lourde. En versant nord, la douceur et le ciel nuageux peuvent favoriser une humidification superficielle en journée, jusqu'à 2500 m environ. Au-dessus on peut encore trouver de la neige froide assez légère dans les secteurs abrités, plus hétérogène dans les secteurs exposés au vent, avec des zones parfois durcies. Attention aux corniches parfois grosses en altitude.





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Thabor

Rédigé le samedi 16 mars 2024 à 16h



Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	dim. 10/03				lun. 11/03				mar. 12/03				mer. 13/03				jeu. 14/03				ven. 15/03				sam. 16/03			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	2			4	¥			7	7	4	<u>~</u>]	AP)	¥			N.	¥	~]	p	¥	***	4	€			Ģ J	Ģ J	¥
Vent (km/h)	80	40	30	20	15	10	15	35	50	50	45	40	50	35	20	10	10	10	20	25	25	30	35	50	50	50	45	20
à 3000m	K	K	7	7	7	2	7	•	Ψ.	2	2	•	24	•	•	•	2	→	>	→	→	2	4	2	24	24	2	•
Vent (km/h)	35	20	20	5	5	5	5	25	25	25	20	25	15	10	5	0	5	5	5	5	10	10	15	20	20	25	20	0
à 2000m	K	4	K	7	7	7	*	7	7	7	7	7	4	4	4	7	K	K	7	*		7	7	7	7	7	2	K

