



## Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

# **MASSIF: Ubaye**

Rédigé le jeudi 25 janvier 2024 à 16h


Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr




#### Estimation des risques

#### vendredi 26 janvier







### Tendance pour le samedi 27 janvier



Maintien d'un risque limité

Au-dessus de 2200m risque limité, plus bas risque faible évoluant en risque limité.

**Départs spontanés :** de neige récente humide, taille petite à moyenne **Déclenchements skieurs :** plaques résiduelles et souvent dures en altitude

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible — En noir : les pentes les plus dangereuses


#### Stabilité du manteau neigeux jusqu'au vendredi 26 janvier 2024 au soir





PLAQUES DURES RÉSIDUELLES EN ALTITUDE, POURSUITE DE L'HUMIDIFICATION

DÉPARTS SPONTANÉS : Encore de possibles avalanches de neige humide, de taille petite à moyenne, même dans les pentes ombragées, grandes non exclues au soleil. En effet après un bon regel nocturne, d'éventuels départs de neige humide dans les pentes non encore purgées peuvent encore se produire en lien avec la douceur.

DÉCLENCHEMENTS PROVOQUÉS: Des plaques isolées persistent plutôt au-dessus de 2200/2400m, elles sont plus fréquentes dans les orientations de large secteur nord à est. Ces instabilités peuvent se situer loin des crêtes et ruptures de pente, mais sont le plus souvent d'aspect dur et plutôt difficiles à déclencher. Les volumes mobilisables peuvent être importants dans les zones d'accumulation ou par sollicitation d'une sous-couche fragile profondément enfouie.







#### Qualité de la neige

Enneigement excédentaire au-dessus de 2500 m, proche des normales entre 2000 et 2500 m, déficitaire en dessous et quasi inexistant sous 1500 m.

On peut chausser les skis à partir de 1600/1700 m.

La neige a pris souvent un aspect printanier. Croute plus ou moins portante avec le bon regel nocturne, s'humidifiant en journée. Seuls les versants peu ensoleillés au-dessus de 2000/2400m ou la très haute altitude conserve une neige froide mais sous travaillée par le vent.





## Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

# **MASSIF: Ubaye**

Rédigé le jeudi 25 janvier 2024 à 16h



### Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	ven. 19/01				sam. 20/01				dim. 21/01				lun. 22/01				mar. 23/01				mer. 24/01				jeu. 25/01			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	4	<b></b>	<del>-</del>	0	<b>~</b> ]	4				<del>-</del>	<b></b>		<del>-</del>	<del>-</del>	TO SEC	4	<b>√</b>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<b></b>	<b></b>	<b>p</b>				<b>4</b>
Vent (km/h)	50	25	30	45	45	50	35	15	15	10	15	25	10	30	60	80	80	60	45	45	65	55	60	55	55	60	65	60
à 3000m	<b>→</b>	4	K	Ľ	Ľ	Ľ	•	•	Ψ	24	4	24	<b>→</b>	<b>→</b>	<b>&gt;</b>	24	24	7	2	•	4	24	4	2	24	7	24	<b>M</b>
Vent (km/h)	5	5	5	10	20	20	15	5	5	5	5	10	10	15	20	25	50	35	30	30	20	20	20	30	15	20	20	15
à 2000m	K	<b>↑</b>	4	+	K	K	K	<b>←</b>	K	K	K	K	K	<b>→</b>	4	2	4	•	•	2	•	4	4	•	Ľ	•	4	2

