



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Couserans

Rédigé le samedi 16 mars 2024 à 16h

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr




Estimation des risques

dimanche 17 mars







Tendance pour le lundi 18 mars



risque limité

Risque accidentel limité, maintien d'une activité avalancheuse naturelle dans les pentes ensoleillées en cours de journée.

Risque limité.

Départs spontanés : Avalanches de neige humide de taille moyenne, localement grande Déclenchements skieurs : Plaques résiduelles à haute altitude en versants ombragés

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible — En noir : les pentes les plus dangereuses


Stabilité du manteau neigeux jusqu'au dimanche 17 mars 2024 au soir





avalanches de neige humide ou avalanches de glissement (reptations) Des fissures et "gueules de baleine" ont été observées.

DÉPARTS SPONTANÉS: Au lever du jour, le regel stabilise le manteau neigeux, puis l'activité avalancheuse reprend en journée, en commençant par les versants Est, puis progressivement les autres versants touchés par le soleil. Les températures seront encore un peu plus élevées que la veille, entraînant une nouvelle humidification dans des pentes non encore touchées, surtout en haute montagne dans un large secteur Sud. Seules les pentes nord au dessus de 2200/2300 m devraient échapper à cette évolution. Les versants Est ou Ouest peuvent donc eux aussi voire des coulées ou des avalanches de taille moyenne se produire ponctuellement, parfois sous forme de plaques de fond jusqu'au sol., plus probables à partir de la fin de matinée et possibles jusqu'en soirée.

DÉCLENCHEMENTS PROVOQUÉS: Quelques structures de plaques demeurent dans les pentes Est à Nord, avec ici et là quelques sous couches fragiles, notamment sur le fond de chaîne, mais du fait du tassement et de l'humidification en cours du manteau neigeux le déclenchement de ces plaques n'est possible que dans de rares configurations (bord de couloirs ou d'accumulations, ruptures de pentes marquée).







Qualité de la neige

Temps printanier. On peut néanmoins pour quelques heures encore chausser les skis à partir de 1500m dans des combes ombragées. Du fait de l'humidification observée depuis 3 jours, puis à une nuit quasiment claire, on s'attend au lever du jour à une bonne croûte de regel quasiment partout. Le grand soleil et la douceur humidifient ensuite le manteau neigeux en surface dans la plupart des versants, en profondeur dans les secteurs ensoleillés où la neige devient dès la fin de matinée lourde, localement pourrie en sud et à basse altitude, avec une fonte significative. Quelques combes au-dessus de 2500m orientées nord et suffisamment ombragées pourront garder une neige encore froide et légère.





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Couserans

Rédigé le samedi 16 mars 2024 à 16h



Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	dim. 10/03				lun. 11/03				mar. 12/03				mer. 13/03				jeu. 14/03				ven. 15/03				sam. 16/03			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	2			4	33		-	33	- Tr	-		¥	*	42		1	¥				1		4	1	1		p	*
Vent (km/h)	45	35	50	45	85	75	70	60	50	40	35	30	30	35	35	35	15	15	30	25	30	35	40	40	40	40	40	40
à 3000m	→	→	→	→	24	2	24	24	4	24	Ψ	24	4	K	7	1	7	>	7	7	>	→	→	24	4	24	2	4
Vent (km/h)	25	25	15	15	50	45	35	30	25	20	15	10	15	15	20	20	5	10	10	10	5	15	20	20	20	20	20	15
à 2000m	↑	↑	•	7	→	7	4	•	4	*	4	4	7	K	7	7	*	4	7	*	↑	*	3	*	*	*	*	→

