



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Champsaur

Rédigé le mercredi 29 mai 2024 à 16h


Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr




Estimation des risques

jeudi 30 mai







Tendance pour le vendredi 31 mai



risque limité

Risque évoluant peu ou en baisse. Humidification limitée, avec un refroidissement sensible de la masse d'air.

Au-dessus de 2800m risque limité, plus bas risque faible.

Départs spontanés : rares départs en neige humide

Déclenchements skieurs : départs ponctuels en neige humide, rares plaques en très haute montagne

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible — En noir : les pentes les plus dangereuses


Stabilité du manteau neigeux jusqu'au jeudi 30 mai 2024 au soir







DÉPARTS SPONTANÉS: Rares départs ponctuels de neige humide, possibles en pente raide près des rochers, à la faveur d'une éclaircie en versants ensoleillés, généralement de taille petite à moyenne. Rare grande possible en versant Nord entre 2700 et 3100 m environ. Très localement, une corniche ou un sérac peuvent encore céder et provoquer une cassure linéaire de grande ampleur en versants nord de haute altitude.

DÉCLENCHEMENTS PROVOQUÉS: Un skieur peut provoquer un départ de neige humidifiée en cours de journée. Possibles plaques récentes peu épaisses, au dessus de 3100/3300 m en versants nord et plutôt près des crêtes, devenant plus difficiles à déclencher par un seul skieur. Très localement, en cas de sur-avalanche, les volumes générés peuvent être importants en versants nord de haute altitude, où des cassures d'épaisseur importante sont possibles, en particulier en cas de sollicitation d'anciennes souscouches fragiles persistantes enfouies.





🔰 30 km/h



Qualité de la neige

Enneigement excédentaire pour une fin mai, très excédentaire à haute altitude.

Vent 3000 m

Limites skiables à partir de 2100/2500 m selon les orientations, localement un peu plus bas en versant peu ensoleillé du cœur de massif.

20 km/h

Qualité de la neige: manteau neigeux très dense et printanier, avec un regel nocturne limité par les nuages élevés. L'humidification reprend en cours de journée sous les éclaircies. La limite de coloration de la neige liée au dépôt de poussières désertiques du 30 mars réapparaît progressivement en surface. Les crêtes de haute altitude sont occupées par des corniches encore très volumineuses.

30 km/h

40 km/h





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Champsaur

Rédigé le mercredi 29 mai 2024 à 16h



Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	jeu. 23/05				ven. 24/05				sam. 25/05				dim. 26/05				lun. 27/05				mar. 28/05				mer. 29/05			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	1	*			1	$\overline{4}$			$\stackrel{{\rm sol}}{=}$	4	$\overline{4}$	AP)	4	4	4	4	1	4	*	*	*	<u></u>	Ģ J	4	***	4	∳	**
Vent (km/h)	5	20	20	15	10	20	20	15	20	5	10	10	15	20	20	25	30	20	20	30	20	25	20	15	10	25	30	25
à 3000m	→	7	→	→	→	7	7	→	→	24	2	24	24	24	→	→	→	7	7	2	4	7	•	24	Ψ.	24	>	4
Vent (km/h)	5	10	10	0	0	10	10	5	5	10	10	10	10	5	5	5	5	5	15	10	15	15	10	5	15	10	15	15
à 2000m	Ľ	7	K	Ľ	•	^	^	Ľ	*	*	*	4	+	Ľ	7	1	K	K	*	7	7	¥	4	Ľ	•	7	*	24

