




# Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya Del 23/01/2024 al 24/01/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)








# Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 23/01/2024 al 24/01/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



## Situación primaria



## Estado del manto nivoso

El manto se presentará endurecido y estable por la mañana, pero con el paso de las horas, debido a la insolación y el ascenso térmico previsto, irá ablandándose. Durante las horas centrales del día caerán purgas naturales húmedas, cerca de sectores rocosos, en canales y solanas inclinadas. No se descarta que, de forma residual y aislada, pueda caer algún deslizamiento basal en terreno inclinado y herboso, especialmente en vertiente sur. Los aludes serán de tamaño 1 (sin capacidad para enterrarnos), aunque en el caso de los deslizamientos podrían rozar el tamaño 2 (mediano), con capacidad para enterrar a una persona. En umbrías todavía encontraremos placas de viento, a sotaventos orientados a este y norte, por encima de 2400 m. Son placas recientes, pequeñas, que reposan sobre niveles débiles de facetas, susceptibles a caer al paso de una persona y que darían lugar a aludes de tamaño 1 (pequeño). Serán más probables en la Franja Nord de la Pallaresa y en el límite sur de Arán.

# Distribución del manto nivoso

Encontramos presencia de nieve a partir de 1500 en umbrías. El manto es esquiable a partir de unos 1600 m en umbrías y de 1800 m en solanas, con espesores de entre 35-70 cm a 2200 m. El grosor total está por debajo de lo que tocaría en ésta la época del año.

### Tendencia para las próximas 48-72h

Se mantendrá el problema la nieve húmeda y, residualmente, de deslizamientos basales. Peligro ESTACIONARIO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL








# Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 23/01/2024 al 24/01/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



## Situación primaria



## Estado del manto nivoso

Las condiciones del manto son favorables a primera hora, con costras duras. Debido al rehielo las costras serán duras y resbaladizas, sobre todo en solanas, pero con la subida de la temperatura y la radiación la nieve más superficial se ablandará y podrán caer bolas o purgas de nieve húmeda (insuficientes para enterrarnos, excepto en terreno trampa). Los lugares más favorables serán las solanas donde haya mayor acumulación, cerca de sectores rocosos o en canales, y también alguna umbría, a partir de mediodía. Aisladamente, podremos encontrar alguna plaquita de viento en lugares aislados, en cota alta. Serán placas duras y delgadas, de distribución muy local, que se podrán romper al paso de una persona y dar lugar a aludes de tamaño 1 (insuficiente para enterrar a una persona, pero sí para desequilibrarnos o derribarnos). Los lugares peligrosos serán los sotaventos orientados a norte y este del extremo norte del sector.

#### Distribución del manto nivoso

Encontramos nieve a partir de unos 1700 m en umbrías y a partir de los 2100 m en solanas. Presenta cierta continuidad por encima de 2100 m, en las umbrías. El manto no es esquiable en ninguna cota, debido al afloramiento de piedras y rocas. Los grosores a 2000 m son inferiores a 15 cm, claramente deficitarios para la época del año.

#### Tendencia para las próximas 48-72h

El manto se mantendrá estable a primera hora y se ablandará superficialmente a mediodía, con el típico ciclo fusión-rehielo. Peligro ESTACIONARIO.










# Boletín de peligro de aludes Pallaresa Del 23/01/2024 al 24/01/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



# Situación primaria



# Estado del manto nivoso

El manto se comportará como en primavera, con costras duras y resbaladizas a primera hora, sobre todo en solanas. Con la subida de la temperatura y la radiación la nieve más superficial se ablandará a mediodía y podrán caer bolas o purgas de nieve húmeda (insuficientes para enterrarnos, excepto en terreno trampa). Los lugares más favorables serán las solanas donde haya mayor acumulación, cerca de sectores rocosos o en canales, y también en alguna umbría, a partir de mediodía. Aisladamente, podremos encontrar alguna plaquita de viento en lugares aislados, en cota alta. Serán placas duras y delgadas, de distribución muy local, que se podrán romper al paso de una persona y dar lugar a aludes de tamaño 1 (insuficiente para enterrar a una persona, pero sí para desequilibrarnos o derribarnos). Los lugares peligrosos serán los sotaventos orientados a noreste y este del extremo norte del sector.

#### Distribución del manto nivoso

Podemos encontrar nieve en el suelo por encima de unos 1700 m al norte del sector. Existe escasa continuidad por encima de 2100 m, aunque no es esquiable en ninguna cota. En solanas, la nieve vieja aparece por encima de 2100-2200 m, siendo muy irregular, a menudo discontinua. Los grosores a 2000 m son inferiores a 15 cm, claramente deficitarios para la época del año.

#### Tendencia para las próximas 48-72h

El manto se mantendrá estable a primera hora y se ablandará superficialmente a mediodía, con el típico ciclo fusión-rehielo. Peligro ESTACIONARIO.










# Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 23/01/2024 al 24/01/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



## Situación primaria



# Estado del manto nivoso

El manto se mantendrá endurecido y estable a causa del rehielo y de las costras superficiales. Con la subida de la temperatura y la radiación la nieve más superficial se ablandará y podrán caer bolas o alguna purga húmeda en laderas donde haya más acumulación (insuficientes para enterrarnos, pero sí para desequilibrarnos o hacernos caer). Serán más probables a partir de mediodía y cerca de sectores rocosos, inclinados. Por otra parte, todavía encontraremos alguna plaquita dura, por encima de 2300-2400 m, en orientaciones este y sur, y en menor medida, a norte. Estas placas se pueden desencadenar al paso de una persona y dar lugar a aludes de tamaño 1, insuficiente para enterrar a una persona pero con capacidad para producir caídas y lesiones. No se descarta que sobre 2500-2600 m se mantengan niveles de capas débiles persistentes enterrados que, allá donde las costras no sean tan duras y gruesas, podrán facilitar la ruptura y desencadenamiento de aludes de placa a nuestro paso.

# Distribución del manto nivoso

La nieve presenta cierta continuidad por encima de 2300-2400 m. Existen algunas acumulaciones, así como zonas deflactadas por el viento. Los grosores a 2200 m son inferiores a 15 cm, muy deficitarios para la época del año.

#### Tendencia para las próximas 48-72h

El manto se mantendrá estable a primera hora y se ablandará a mediodía, con la dinámica diaria del ciclo fusión-rehielo. Peligro ESTACIONARIO.









# Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 23/01/2024 al 24/01/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

# Nota nivológica:

5 MUY FUERTE

4 FUERTE

3 NOTABLE

2 LIMITADO

1 DÉBIL

Las condiciones del manto son casi primaverales. Por encima de los 2000 m encontramos unos 10 cm de nieve húmeda que, en sectores de acumulación, rondan los 30 cm (en la base de las Canals). En la superficie de esta última nevada se ha formado escarcha y también algunos cristales facetados. En superficie las costras se ablandan a media mañana o mediodía y por debajo son más duras y gruesas. Con el ambiente cálido, la nieve tenderá a desaparecer en cotas bajas y en las cotas más altas no se descarta que pueda caer alguna purga de nieve húmeda. En este caso habría que prestar atención a las canales de Cadí, donde un alud pequeño o la caída de bolas nos pueden desequilibrar y hacernos caer. El manto es irregular y, en general, no es esquiable.

Esta nota se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.







# Boletín de peligro de aludes Prepirineu Del 23/01/2024 al 24/01/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

# Nota nivológica:

5 MUY FUERTE

4 FUERTE

3 NOTABLE

2 LIMITADO

1 DÉBIL

Las altas temperaturas y la radiación están haciendo desaparecer la nieve de la última nevada. En umbrías por encima de los 2000 m todavía encontramos unos 15 cm de nieve húmeda. En sectores protegidos, dentro del bosque, se ha formado escarcha superficial. En cotas bajas la nieve tenderá a desaparecer y en las cotas más altas no se descarta que pueda caer alguna purga de nieve húmeda, en lugares con desnivel, cerca de sectores rocosos y con mayor acumulación. No se descarta que pueda haber alguna placa aislada en las zonas más altas del sector, en sectores resguardados, en orientaciones E y SE, por encima de 2300 m, que sólo constituirían un peligro en lugares donde se hubiesen formado sobre manto preexistente, de forma muy aislada. El manto no es esquiable, en términos generales, salvo alguna cubeta o lugares con mayor acumulación.

Esta nota se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.







# Boletín de peligro de aludes Ter-Freser Del 23/01/2024 al 24/01/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

# Nota nivológica:

5 MUY FUERTE

4 FUERTE

3 NOTABLE

2 LIMITADO

1 DÉBIL

El manto es discontinuo y donde encontramos algunas acumulaciones se presenta endurecido, sobre todo a primera hora, con presencia de costras. Estas costras se transforman rápidamente con el paso de las horas y acaban ablandándose a causa de la radiación y las altas temperaturas. En cotas bajas la nieve irá desapareciendo a causa del ambiente primaveral y en las cotas más altas sólo se espera la caída de alguna bola en las pendientes más inclinadas, allí donde haya acumulaciones. El manto, por lo general no es esquiable en ninguna cota, y sólo presenta cierta continuidad a umbrías por encima de unos 2400 m.

Esta nota se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

