



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Champsaur


Rédigé le vendredi 16 février 2024 à 16h

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr

Estimation des risques

samedi 17 février







Tendance pour le dimanche 18 février



risque limité

Risque stable ou en baisse. Reprise de l'humidification en journée.

Au-dessus de 2200m risque limité, plus bas risque faible.

Départs spontanés: en neige humide.

Déclenchements skieurs: rares plaques en versant froid d'altitude

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses

Stabilité du manteau neigeux jusqu'au samedi 17 février 2024 au soir







POURSUITE DE L'HUMIDIFICATION. PLAQUES RÉSIDUELLES EN ALTITUDE.


DÉPARTS SPONTANÉS : des avalanches de neige humide peuvent encore se déclencher dans les pentes raides au fil de l'ensoleillement. Départs ponctuels le plus souvent près des rochers, avalanches de taille petite à parfois moyenne.

De plus, les reptations déjà présentes peuvent continuer de s'ouvrir, pouvant générer des avalanches de glissement à toute heure de la journée.

DÉCLENCHEMENTS PROVOQUÉS: rares plaques résiduelles en altitude, présentes dans les versants froids principalement au-dessus de 2200/2400 m environ dans les zones d'accumulation par le vent. Elles sont désormais généralement difficiles à déclencher au passage d'un skieur, et sont peu épaisses (avalanches petites à rarement moyenne). Très localement en versant nord de haute altitude, une cassure plus importante est possible sur de vieilles couches fragiles enfouies en profondeur, difficiles à solliciter. Par ailleurs, possibles coulées de neige humide sous les skis au fil de la journée.







Qualité de la neige

Enneigement contrasté : il est très faible pour un mois de février aux basses altitudes, plus normal en ubacs autour de 2000 m, et excédentaire en tous versants en haute montagne.

Manteau neigeux skiable à partir de 1600/1700 m en ubacs, plutôt 2000/2200 m en adrets.

En adrets, la neige s'est humidifiée en surface jusqu'à haute altitude. En versant nord, la couche des dernières chutes de neige est restée poudreuse dans les secteurs abrités en haute altitude, mais a commencé à se densifier. Elle est parfois durcie par le vent près des crêtes et sommets.

Samedi matin, après un regel nocturne modéré, on trouve parfois une petite croûte de neige regelée en surface. En cours de journée, l'humidification reprend en surface du manteau neigeux en suivant la course du soleil.





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Champsaur

Rédigé le vendredi 16 février 2024 à 16h



Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	sam. 10/02				dim. 11/02				lun. 12/02				mar. 13/02				mer. 14/02				jeu. 15/02				ven. 16/02			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	THE WAY		W. Park		2			4	<u> </u>	<u> </u>	4		-	-		0		4	p				4	4	2	4	4	2
Vent (km/h)	60	70	20	10	30	50	50	40	30	20	10	15	30	20	20	30	25	30	30	20	20	15	20	25	15	15	20	15
à 3000m	↑	←	←	1	24	•	2	•	4	24	4	K	4	•	24	2	24	24	2	24	4	→	7	7	7	7	7	ひ
Vent (km/h)	45	55	15	45	25	15	20	15	15	15	15	15	5	5	5	5	10	15	10	10	5	5	0	0	10	10	10	10
à 2000m	K	K	K	4	4	+	7	4	•	4	4	•	•	*	K	•	Ç	•	7	*	•	Z	+	Z	K	K	*	0

